

MẪU NHÃN HỒNG LINH CỐT


1. NHÃN TRÊN CHAI 20G



2. NHÃN HỘP 20G



3/ NHÃN HỘP GIẤY HỒNG LINH CỐT (CHỦA 12 HỘP NHỎ 20g)



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mỡ bôi ngoài da HỒNG LINH CỘT

ML

Thành phần:

10g thành phẩm chứa:	
Nọc rắn hổ mang khô.....	0,05 mg
Menthol(Mentholum).....	0,8 g
Tinh dầu bạc hà(Oleum menthae arvensis) 1,09 g	
Long não(Camphora).....	1,59 g
Methyl salicylat.....	2 g
Tá dược vừa đủ (Vaseline, lanolin, parafin) 10 g	

20g thành phẩm chứa:	
Nọc rắn hổ mang khô.....	0,1 mg
Menthol(Mentholum).....	1,6 g
Tinh dầu bạc hà (Oleum menthae arvensis)2,18 g	
Long não(Camphora).....	3,18 g
Methyl salicylat.....	4 g
Tá dược vừa đủ (Vaseline, lanolin, parafin) 20 g	

Tác dụng dược lý:

Nọc rắn có tác dụng khu phong, trừ thấp, tiêu viêm chi thống.

Methyl salicylat dẫn huyết lưu thông, làm giảm hoặc mất lượng acid lactic tích tụ ở cơ, khớp nên có tác dụng giảm đau trong các trường hợp đau lưng, đau nhức thần kinh tọa và những bệnh đau nhức gốc phong thấp.

Menthol, tinh dầu bạc hà làm giãn mạch, tạo cảm giác mát lạnh bằng sự kích thích đặc hiệu trên các receptor tạo cảm giác mát ở đầu tận cùng của dây thần kinh cơ và da (là bộ phận dẫn truyền cảm giác đau), nên làm giảm đau và gây tê tại chỗ.

Camphor có tác dụng giãn mạch và kích thích thần kinh ngoại biên của da, gây giảm đau nhẹ khi sử dụng tại chỗ nên được dùng trong plaster để kích thích giảm đau trong đau cơ, đau dây thần kinh và các tình trạng tương tự.

Camphor + menthol làm giảm ngứa da.

Chỉ định:

Mỡ bôi ngoài da Hồng Linh Cột dùng điều trị các bệnh thấp khớp, viêm đau khớp, viêm cơ. Các trường hợp đau mỏi cơ bắp, bong gân, bầm tím do té ngã. Các chứng đau thần kinh tọa, tê mỏi lưng vai gáy.

Chống chỉ định:

- Người mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.
- Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.
- Không bôi xoa thuốc vào niêm mạc mắt, vùng dễ kích ứng, vết thương hở.

Thận trọng:

Thuốc có thể gây kích ứng ngoài da với người mẫn cảm với các thành phần của thuốc, khi thấy các hiện tượng khác lạ phải ngừng dùng thuốc. Không nên dùng thuốc quá hạn hay có sự nghi ngờ về chất lượng của thuốc.

Dể biết thêm thông tin về thuốc, xin hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc không dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Các tác dụng phụ của thuốc thường hiếm xảy ra, nếu có thường là kích ứng hoặc dị ứng ngoài da với người mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

*Ngưng sử dụng thuốc và thông báo cho Bác sĩ những
tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

Cách dùng - liều dùng:

Dùng bôi xoa ngoài da. Mỗi ngày 3-4 lần. Làm sạch vùng da trước khi bôi xoa thuốc, lấy tay day, xoa, miết tại vị trí xoa thuốc để phát huy tối đa tác dụng của thuốc.

Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc dùng được cho người lái xe và vận hành máy móc.

Quá liều và xử trí

Những triệu chứng quá liều như mẩn ngứa, kích ứng (đau, nóng loét), sưng hoặc bong da như những mô hoại tử. Nếu xảy ra tình trạng trên, rửa kỹ với nước, ngừng dùng thuốc và thông báo cho trung tâm chống độc hoặc trung tâm cấp cứu.

Tương tác thuốc:

Xoa nóng da tại nơi đau khi bôi thuốc sẽ làm tăng khả năng hấp thu của thuốc. Làm giảm tác dụng của thuốc kháng histamin khi bị dị ứng thuốc. Có thể phối hợp với các thuốc giảm đau, chống viêm trong điều trị.

Đóng gói: Tuýp 20g, lọ 20g, hộp thiếc 10g.

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hạn dùng: 5 năm kể từ ngày sản xuất

**ĐẾ XA TẨM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
CHỈ DÙNG BÔI NGOÀI DA**

Nhà sản xuất: công ty CP dược phẩm quảng bình

46 Đường Hữu Nghị - Phường Bắc Lý - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 052.3822475

Fax: 052.3820720

Nhà phân phối: Công ty CP đầu tư Kim Long

Lô 2A, Khu Liên Cơ quan Từ Liêm, Mỹ Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 3763 4538; 0979.291.920

Fax: 04 3763 4540



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng