

ACTISÔ-DHT

Actisô (Folium Cynarae scolymi) 2g

GMP - WHO

Thảo dược từ thiên nhiên

ACTISÔ-DHT 5ml

Actisô (Folium Cynarae scolymi) 2g

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Không được tiêm
Số lô SX:
HD:



Không được tiêm

Hộp 30 ống x 5ml cao lỏng

ACTISÔ-DHT

Actisô (Folium Cynarae scolymi) 2g

GMP - WHO

Thảo dược từ thiên nhiên

THÀNH PHẦN:

Mỗi 5ml cao lỏng chứa các chất chiết từ:
Actisô (Folium Cynarae scolymi) 2g
Tã được vừa đủ 5ml

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị triệu chứng, làm giảm các rối loạn tiêu hoá như chứng khó tiêu, cảm giác no, trướng bụng và đầy hơi.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

Thuốc uống trực tiếp hoặc pha với nước
Người lớn: Uống 10ml/lần x 2 lần/ngày
Trẻ em: Uống 5ml/lần x 2 lần/ngày

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Không được tiêm

Hộp 30 ống x 5ml cao lỏng

ACTISÔ-DHT

Actisô (Folium Cynarae scolymi) 2g

GMP - WHO

Thảo dược từ thiên nhiên

ACTISÔ-DHT

Bảo quản:
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.

SDK :
Số lô SX :
NSX :
HD :

Cơ sở sản xuất: CT CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Tổ dân phố số 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

1. Tên thuốc: ACTISÔ-DHT

2. Các dấu hiệu cần lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc

“Không được tiêm”

“Đề xa tầm tay trẻ em”

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

3. Thành phần công thức thuốc: Mỗi 5ml cao lỏng chứa các chất chiết từ:

Thành phần dược chất: Actisô (*Folium Cynarae scolymi*)

2g

Thành phần tá dược: Acid benzoic, acid citric, natri citrat, natri saccharin, nước tinh khiết.

4. Dạng bào chế: Cao lỏng.

Mô tả: Chất lỏng sánh, màu nâu đen, mùi thơm vị ngọt.

5. Chỉ định

Điều trị triệu chứng, làm giảm các rối loạn tiêu hóa như chứng khó tiêu, cảm giác no, trướng bụng và đầy hơi.

6. Cách dùng, liều dùng

+ *Cách dùng*: Thuốc uống trực tiếp hoặc pha với nước.

+ *Liều dùng*:

* Người lớn: Uống 10ml/lần x 2 lần/ngày.

* Trẻ em: Uống 5ml/lần x 2 lần/ngày.

7. Chống chỉ định

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Người tỳ vị hư hàn, người tiểu đường, tiểu nhạt.

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

Chưa có báo cáo.

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

* *Thời kỳ mang thai*: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

* *Thời kỳ cho con bú*: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ đang cho con bú, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

11. Tương tác, tương kỵ của thuốc

* *Tương tác của thuốc*:

Chưa có tài liệu báo cáo.

* *Tương kỵ của thuốc*: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

12. Tác dụng không mong muốn của thuốc

Actisô không gây độc.

Lúc mới uống, có thể urê máu tăng lên do actisô làm tăng sự tạo urê trong máu.

13. Quá liều và cách xử trí

Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Cách xử trí: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

14. Quy cách đóng gói

Hộp 30 ống x 5ml. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng thuốc



- **Điều kiện bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30⁰C.
- **Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
- **Tiêu chuẩn chất lượng thuốc:** TCCS.

16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:

Tên cơ sở sản xuất : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Địa chỉ: Tổ dân phố số 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

ĐT: 024.33522203 FAX: 024.33522203

ĐT: 024.33824685 FAX: 024.33829054

Hotline: 024.33522525

