

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG  
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC**

# **Viên Nén AIR-X**

## **Hương vị cam**

Số Visa: VN-14630-12

Viên nén nhai, chữa đầy hơi và chướng bụng.

Các rối loạn tiêu hóa có xu hướng liên quan đến sự tích tụ quá nhiều hơi ở dạ dày ruột. Các triệu chứng thông thường nhất là cảm giác bị đè ép, căng và đầy thượng vị, ợ hơi, trung tiện.

AIR-X giúp điều trị sự ứ hơi bất thường trong ống tiêu hóa.

Simethicone làm giảm sức căng bề mặt của các bóng hơi trong niêm mạc ống tiêu hóa, làm xẹp các bóng khí này, trợ giúp cho sự tổng hơi của ống tiêu hóa làm giảm chướng bụng. Simethicone là một chất không có độc tính, trợ về mặt hóa học và được dung nạp tốt vì vậy tiện dụng cho điều trị, ngăn ngừa những cảm giác khó chịu vì ứ hơi trong đường tiêu hóa và chướng bụng. Simethicone còn có tác dụng làm ngắn đi thời gian di chuyển của hơi dọc theo ống tiêu hoá.

### **THÀNH PHẦN:**

Mỗi viên nén chứa :

Simethicone (USP 32) ..... 80 mg

*Tá dược:* Silicon dioxit dạng keo, Anhydrous Acid citric, Dextrose Anhydrous, Povidone (K 90), Calci stearate, Sucrose, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu cam, Sunset Yellow FCF.

**MÔ TẢ:** Viên nén hai mặt cong màu vàng cam, hương vị cam.

### **CHỈ ĐỊNH:**

Đầy hơi ở đường tiêu hóa, cảm giác bị đè ép và căng ở vùng thượng vị, chướng bụng thoáng qua thường có sau bữa ăn thịnh soạn hoặc ăn nhiều chất ngọt, chướng bụng sau phẫu thuật; chuẩn bị chụp X-quang (dạ dày, ruột, túi mật, thận) và trước khi nội soi dạ dày.

### **LIỀU DÙNG:**

Liều dùng thông thường cho người lớn là mỗi lần nhai kỹ 1-2 viên sau bữa ăn. Trong trường hợp chuẩn bị chụp X quang thì dùng 2 hoặc 3 ngày trước khi chụp. Liều dùng được điều chỉnh tùy theo tuổi và triệu chứng của bệnh nhân.

### **THẬN TRỌNG:**

Không nên sử dụng quá 12 viên/ngày trừ khi có chỉ định và theo dõi của thầy thuốc.

### **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

Các trường hợp quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

### **TÁC DỤNG PHỤ:**

AIR-X làm giảm đáng kể triệu chứng và loại bỏ khí gây chứng đầy hơi. Thành phần hoạt tính quan trọng nhất của AIR-X, dimethylpolysiloxan, không được hấp thu vào dạ dày và ruột, do đó thường không có bất kỳ tác động gây hại nào cho cơ thể.

**Thông báo cho thầy thuốc những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc**

### **QUÁ LIỀU:**

- Chưa có báo cáo nào về tác dụng gây hại của thuốc khi sử dụng quá liều, có lẽ là do tính chất trợ về mặt hóa học và không được hấp thu qua đường tiêu hóa của Simethicone.

- Tuy nhiên, nếu có triệu chứng bất thường khi dùng thuốc quá liều, hãy đến bệnh viện để được áp dụng các biện pháp giải độc thông thường và điều trị theo triệu chứng.

### **TƯƠNG TÁC THUỐC:**

Chưa có tương tác thuốc nào giữa Air-X với thuốc khác được báo cáo.

### **Ảnh hưởng đến khả năng lái xe hay vận hành máy móc:**

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe hay vận hành máy móc.

### **Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:**

Thuốc có thể dùng trong thời kỳ có thai và cho con bú. Tuy nhiên, không rõ thuốc có qua được nhau thai vào thai nhi hay bài tiết vào sữa hay không. Do đó cần thận trọng khi sử dụng thuốc.

### **TIÊU CHUẨN:**

USP 32.

### **HẠN DÙNG:**

5 năm tính từ ngày sản xuất.

### **CẢNH BÁO:**

Không dùng thuốc này khi quá hạn dùng ghi trên bao bì đựng thuốc, khi thuốc đổi màu hay có mùi lạ.

**Đề xa tầm tay của trẻ em.**

**ĐÓNG GÓI:** 10 x 10 Viên nén/ Hộp

### **BẢO QUẢN:**

Trong bao bì thật kín, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ phòng (<30°C).

Sản xuất tại

**R.X. Manufacturing Co., Ltd.**

76 Moo 10, Salaya-Bangpasi Road, Narapirom, Banglane, Nakornpathom 73130, Thailand

Tel : 660-3429-8117-21 Fax : 660-3429-8117-21 Ext.2422 , 660-2910-0969