

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 18/01/2013


Hộp 30 gói thuốc bột x gói 2g

Lactobacillus acidophilus 10⁸ CFU
Kẽm 5,0 mg

Bailuzym - Zn

Bailuzym - Zn

Lactobacillus acidophilus 10⁸ CFU
Zinc 5.0 mg



30 powder sachets x 2g

HASAN - DERMAPHARM JOINT VENTURE CO., LTD.
Lot B, Dong An Industrial Park, Binh Duong Province, Vietnam



Hạt chất và hàm lượng:
Lactobacillus acidophilus 10⁸ CFU
Kẽm gluconat 35,0 mg
(Tương đương 5,0 mg kẽm)

Chỉ định: Bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa trong các trường hợp:

- Tiêu chảy
- Viêm ruột cấp tính hay mạn tính
- Trạng thái cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột bị phá vỡ do dùng kháng sinh, rối loạn tiêu hóa...

Liều dùng, Cách dùng, Chống chỉ định, Tương tác thuốc, Tác dụng phụ:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu Chuẩn có số.


SBK - Reg. No.:

Để xa tầm tay của trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Bailuzym - Zn

Lactobacillus acidophilus 10⁸ CFU
Kẽm 5,0 mg



Hộp 30 gói thuốc bột x gói 2g

CTY TNHH LIÊN DOANH HASAN - DERMAPHARM
Lô B, Đường số 2, KCN Đồng An, Bình Dương, Việt Nam



Số lô SX - Batch No.:
NSX - Mfg. Date:
HD - Exp. Date:




TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS: Trần Đình Hương



Mẫu nhãn gói 2g : Bailuzym - Zn
Kích thước : 70 x 50 mm
Màu sắc : như mẫu



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS: Trần Đình Hưởng



140 x 200 mm



TỔNG CÁN ĐỐC
ĐC: Quận Bình Hưng

Hướng dẫn sử dụng thuốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bailuzym - Zn

Gói 2 g thuốc bột

Thành phần

Lactobacillus acidophilus.....10⁸ CFU
Kẽm gluconat.....35,0 mg
(Tương đương5,0 mg kẽm)
Tá dược.....vừa đủ 1 gói
(Lactose, Saccharose, Aerosil, Bột hương vị dâu, Magnesi stearat)

Tính chất: Thuốc bột dạng hạt nhỏ màu hồng nhạt, đồng nhất, vị ngọt, mùi thơm.

Cơ chế tác dụng

- *Lactobacillus acidophilus* là một trực khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa bằng cách cải thiện hệ vi sinh của đường ruột.
- Cơ chế tác động của *Lactobacillus acidophilus*: Sinh ra acid lactic, tạo môi trường không thuận lợi cho sự phát triển của các vi khuẩn và nấm gây bệnh, kể cả vi khuẩn thối rữa. Đồng thời còn kích thích miễn dịch không chuyên biệt của niêm mạc, tăng tổng hợp IgA làm tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể con người.
- Ngoài ra, trong Bailuzym - Zn còn bổ sung kẽm gluconat. Kẽm là yếu tố khoáng vi lượng thiết yếu cho sức khỏe, sự phát triển cơ thể, cũng như hệ miễn dịch của người lớn lẫn trẻ em.
- Tác dụng hỗ trợ của kẽm trong điều trị tiêu chảy: Cải thiện sự hấp thu nước và chất điện giải tại niêm mạc ruột, phục hồi enzym đường ruột, tăng miễn dịch tế bào và dịch thể giúp nhanh chóng phục hồi và giảm nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy cho những đợt sau.

Chỉ định

Bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa và tăng cường khả năng miễn dịch trong các trường hợp:

- Tiêu chảy do nhiễm khuẩn, do kháng sinh và hóa trị liệu...
- Viêm ruột cấp tính hay mạn tính.
- Rối loạn tiêu hóa: chướng bụng, đầy hơi, táo bón.
- Rối loạn cân bằng vi sinh ruột do rượu, stress, du lịch...
- Dự phòng các biến chứng đường tiêu hóa.

Liều dùng và cách dùng

Liều dùng:

- Liều thông thường:
 - + Người lớn, trẻ em > 15 tuổi: 1 gói/lần, 3 gói/ngày.
 - + Trẻ em 11-15 tuổi: 1 gói x 2 lần/ngày.
 - + Trẻ em 8-11 tuổi: 1/2 gói x 3 lần/ngày.
 - + Trẻ em 5-8 tuổi: 1/3 gói x 3 lần/ngày.
 - + Trẻ em 3-5 tuổi: 1/4 gói x 3 lần/ngày.
 - + Trẻ em 1-3 tuổi: 1/5 gói x 3 lần/ngày.
 - + Trẻ em 3 tháng - < 1 tuổi: 1/10 gói x 3 lần/ngày.
- Tiêu chảy: 4-8 gói/ngày.
- Táo bón: 6 gói/ngày.
- Rối loạn tiêu hóa do dùng kháng sinh:

- + Liều dự phòng: 2 gói/ngày.
- + Liều điều trị: 4-8 gói/ngày cho đến khi hết triệu chứng bệnh.

Cách dùng: Pha trong nước đun sôi để nguội hoặc sữa, nước hoa quả. Tốt nhất là uống lúc bụng đói hoặc trước bữa ăn.

Chống chỉ định

Không dùng cho người quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng

- Sau 2 ngày điều trị mà vẫn tiêu chảy, cần khám lại.
- Người sốt cao chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Tương tác thuốc

Bailuzym - Zn ngăn cản sự hấp thu của tetracyclin.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú

Chưa ghi nhận tác dụng phụ.

Tác dụng khi lái xe và vận hành máy móc

Không ảnh hưởng.

Tác dụng không mong muốn

Chưa có báo cáo về tác dụng không mong muốn xảy ra khi dùng thuốc.

Quá liều và cách xử trí

- Độc tính cấp của kẽm xảy ra sau khi uống 1 liều > 40 mg/ngày: buồn nôn, nôn mửa, sốt, suy hô hấp.
- Dùng liều lớn trong thời gian dài làm suy giảm chức năng miễn dịch và thiếu máu.
- Các triệu chứng hạ huyết áp (chóng mặt, ngất xỉu), bệnh vàng da (vàng mắt hay da), phù phổi (đau ngực hay khó thở), ăn mòn và viêm màng nhầy miệng và dạ dày, loét dạ dày cũng đã được báo cáo.
- Cần tránh dùng các chất gây nôn hoặc rửa dạ dày.
- Nên sử dụng chất làm dịu triệu chứng viêm như sữa, các chất carbonat kiềm, than hoạt và các chất tạo phức chelat.

Trình bày: Hộp 30 gói thuốc bột x gói 2 g.

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Lưu ý

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng trên bao bì.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.



CTY TNHH LIÊN DOANH HASAN - DERMAPHARM
Lô B, Đường số 2, KCN Đồng An, Bình Dương, Việt Nam

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em

