

BECOCYSTEIN

THÀNH PHẦN:

Acetylcystein 200 mg

Tá dược: Tinh bột mì, magnesi stearat vừa đủ 1 viên

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng.

CHỈ ĐỊNH:

Được dùng làm thuốc tiêu chất nhầy trong bệnh nhầy nhớt, bệnh lý hô hấp có đờm nhầy quánh như trong viêm phế quản cấp và mạn, làm sạch đường quy trong mở khí quản.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

-Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: Uống 1 viên x 3 lần/ ngày.

-Trẻ em từ 2 - 6 tuổi: Uống 1 viên x 2 lần/ ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

-Bệnh nhân có tiền sử hen (nguy cơ phản ứng co thắt phế quản với tất cả các dạng thuốc chứa acetylcystein).

-Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

-Trẻ em dưới 2 tuổi.

THẬN TRỌNG:

-Phải giám sát chặt chẽ người bệnh có nguy cơ phát hen nếu dùng acetylcystein cho người có tiền sử dị ứng.

-Bệnh nhân bị loét dạ dày-tá tràng.

TRƯỜNG HỢP PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ :

Thuốc dùng an toàn cho phụ nữ có thai và cho con bú.

TRƯỜNG HỢP LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC :

Không ảnh hưởng đáng kể.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

-Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn.

-Thần kinh: Buồn ngủ, nhức đầu, ù tai.

-Da: Phát ban, mề đay.

-Hô hấp: Viêm miệng, chảy nước mũi nhiều, co thắt phế quản.

Thông báo cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

TƯƠNG TÁC THUỐC:

-Acetylcystein là một chất khử nên không phù hợp với chất oxy - hóa.

-Không dùng đồng thời các thuốc ho khác hoặc bất cứ thuốc nào làm giảm bài tiết phế quản trong thời gian điều trị bằng acetylcystein.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

-Triệu chứng: Tương tự triệu chứng của phản vệ, đặc biệt là giảm huyết áp. Các triệu chứng khác bao gồm: Suy hô hấp, tan máu, đông máu rải rác nội mạch và suy thận.

-Xử trí: Điều trị quá liều theo triệu chứng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp chứa 10 vỉ, mỗi vỉ 10 viên nang cứng.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.



CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC

Số 6A3 quốc lộ 60 p.Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre - Việt Nam



BEPHARCO