

## BECOHISTA

Tiêu chuẩn: TCCS

### THÀNH PHẦN:

Cetirizin dihydroclorid 10 mg

Tá dược: Lactose, tinh bột mì, PVP K30, natri starch glycolat, magnesi stearat, aerosil, ponceau, amaranth, đỏ erythrosin, HPMC, PEG 6000, talc, titan dioxyd vừa đủ 1 viên.

**DANG BẢO CHẾ:** Viên nén bao phim.

### DƯỢC LỰC HỌC:

- Cetirizin có tác dụng đối kháng chọn lọc ở thụ thể H<sub>1</sub>, nhưng hầu như không có tác dụng đối kháng acetylcholin và serotonin.

- Cetirizin ức chế giai đoạn sớm của phản ứng dị ứng qua trung gian histamin và cũng làm giảm sự di dời của các tế bào viêm và giảm giải phóng các chất trung gian ở giai đoạn muộn của phản ứng dị ứng.

### DƯỢC ĐỘNG HỌC:

- Cetirizin được hấp thu nhanh qua đường uống, nồng độ đỉnh trong máu ở mức 0,3 microgam/ml sau 30 đến 60 phút khi uống 1 liều 10 mg. Nửa đời huyết tương xấp xỉ 11 giờ. Hấp thu thuốc không thay đổi giữa các cá thể. Thức ăn không làm ảnh hưởng đến mức độ hấp thu nhưng có thể làm sự hấp thu hơi chậm lại.

- Thể tích phân bố cetirizin ở người trưởng thành khỏe mạnh từ 0,39 - 0,6 L/kg. Cetirizin liên kết mạnh với protein huyết tương (khoảng 93%).

- Độ thanh thải ở thận là 30 ml/phút và nửa đời thải trừ xấp xỉ 9 giờ.

### CHỈ ĐỊNH:

Điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng quanh năm, viêm mũi theo mùa, mày đay tự phát mạn tính, hắt hơi, chảy nước mũi, viêm kết mạc dị ứng, dị ứng da, ngứa, phụ trợ trong điều trị hen.

### LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Người lớn và trẻ em từ 6 tuổi trở lên: uống liều duy nhất 1 viên/ngày.

- Người suy thận, người đang thẩm tích máu và bệnh nhân suy gan: uống 1/2 viên/lần/ngày.

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Người có tiền sử dị ứng với cetirizin, với hydroxyzin.

- Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con bú.

### THẬN TRỌNG:

Điều chỉnh liều ở người suy thận, suy gan.

### TRƯỜNG HỢP PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

- Tuy cetirizin không gây quái thai ở động vật, nhưng không có những nghiên cứu đầy đủ trên người mang thai, cho nên không nên dùng khi có thai.

- Cetirizin bài tiết qua sữa, vì vậy người cho con bú không nên dùng.

### TRƯỜNG HỢP LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Do có hiện tượng ngủ gà ở một số người khi sử dụng cetirizin, nên thận trọng khi lái xe hay vận hành máy vì dễ gây nguy hiểm.

### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

\* Thường gặp, ADR > 1/100

- Hay gặp nhất là hiện tượng ngủ gà. Tỷ lệ gây nên phụ thuộc vào liều dùng.

- Ngoài ra thuốc còn gây mệt mỏi, khô miệng, viêm họng, chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn.

\* Ít gặp, 1/1000 < ADR < 1/100

Chán ăn hoặc tăng thêm ăn, đồ bưng, tăng tiết nước bọt, rối loạn điều tiết mắt, bí tiểu.

\* Hiếm gặp, ADR < 1/1000

Thiếu máu tan máu, giảm tiểu cầu, hạ huyết áp nặng, chóng mặt, viêm gan, ứ mắt, viêm cầu thận, kích động, lú lẫn, trầm cảm, ảo giác, mất ngủ.

*Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.*

### TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Dùng đồng thời cetirizin với rượu và các thuốc ức chế thần kinh trung ương sẽ làm tăng thêm tác dụng của các thuốc này.

- Độ thanh thải cetirizin giảm nhẹ khi uống cùng theophyllin.

### QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

- Triệu chứng: ngủ gà ở người lớn, ở trẻ em có thể bị kích động.

- Điều trị: Khi quá liều nghiêm trọng cần gây nôn và rửa dạ dày cùng với các phương pháp hỗ trợ.

- Dùng những biện pháp cơ bản để loại phần thuốc chưa được hấp thu: uống viên thuốc chưa tan hoạt hay rửa dạ dày.

Cũng cần điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

**QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 10 vỉ, mỗi vỉ 10 viên nén bao phim

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

**NEU CAN THIEM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẤY THUỐC.**



**CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC**

Số 6A3 Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre - Việt Nam