

Lần đầu: 1 / 4 / 13

24

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM BIÊN HẠ 1
Ngũyễn Thị Học, Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Box of 10 blisters x 10 capsules

ON 00X/000 No.

BIOPHAN 1 PHARMACEUTICAL JAO

CÔNG TY CPDP BIDIPHAR 1
PHÓ GIÁM ĐỐC




Bánh Thi Ngọc Quỳnh

MẪU NHÃN

Nhãn ví

Mặt trên

Mặt dưới



3



MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

BIDISAMIN 250

Viên nang

Thành phần: Mỗi viên nang chứa:

D-Glucosamin sulfat, 2KCl tương đương
Glucosamin sulfat 250 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên
(Tá dược: Era-tab, Talc, Natri metabisulfat, EDTA,
Avicel, Aerosil, Acid stearic).

Dạng bào chế của thuốc: Viên nang

Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Tính chất:

Glucosamin là một chất tự nhiên có trong chitin, mucoproteins, mucopolysaccharid. Glucosamin tham gia vào việc sản xuất các glycosaminoglycan, một hình thức mô sụn trong cơ thể. Glucosamin còn có mặt ở gân và dây chằng. Glucosamin được cơ thể tổng hợp nhưng khả năng này giảm dần theo tuổi tác.

Glucosamin sulfat được sử dụng trong điều trị rối loạn thấp khớp như viêm xung khớp.

Chỉ định:

- Giảm triệu chứng của viêm khớp gối nhẹ và trung bình.

Liều lượng và cách dùng:

Dùng cho người trên 18 tuổi: Uống từ 1250 mg đến 1500 mg glucosamin/ ngày chia làm 3 lần. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 – 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

Chống chỉ định:

- Dị ứng với một thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu an toàn về hiệu quả điều trị.

Thận trọng:

- Glucosamin thuộc nhóm carbohydrat, dù không trực tiếp gây tăng đường huyết nhưng có thể ảnh hưởng lên sự bài tiết insulin. Vì thế cần theo dõi đường huyết thường xuyên trên những bệnh nhân tiểu đường.

Tương tác thuốc:

- Glucosamin có thể gây tăng đề kháng Insulin và do đó ảnh hưởng đến sự dung nạp glucose.

Tác dụng không mong muốn:

- Hiếm thấy, nếu gặp thì thấy cảm giác nôn, buồn nôn, tiêu chảy, ngứa, nổi mề đay.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Chống chỉ định cho phụ nữ có thai và cho con bú

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy:

- Thuốc không ảnh hưởng gì khi lái xe và vận hành máy.

Quá liều và cách xử trí:

- Chưa tìm thấy trong các tài liệu

Bảo quản: Kín, nơi khô mát, không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Đề xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bác sĩ.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDIPHAR 1

498 Nguyễn Thái Học, Tp. Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Tel: 056.3846040 * Fax: 056.3846846

Ngày 21 tháng 12 năm 2012

CÔNG TY CPDP BIDIPHAR 1
PHÓ GIÁM ĐỐC



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

Bà Thị Ngọc Quỳnh