

BIVICERIN
(3 blisters x 10 capsules - AL-PVC)

Rx. THUỐC KÊ ĐƠN

Reliv

Bivicerin

Cao khô *Silybum marianum*
(*Extractum Silybi mariani siccum*) 155,55 mg
(tương đương Silymarin 70 mg)

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng

SDK/Via:
Số lô SX/Lot No.:
NSX/Mfg:
HD/Exp:

THÀNH PHẦN: Cao khô *Silybum marianum* (*Extractum Silybi mariani siccum*) 155,55 mg (tương đương Silymarin 70 mg) và các tá dược vừa đủ 1 viên nang cứng.
CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.
ĐẢO QUẢ: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.
TIÊU CHUẨN: T.C.C.S.
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG.

Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV
Khu A, số 18, đường Lê Thị Sóc, ấp 2A, xã Tân Thành Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Reliv WHO-GMP

Bivicerin

Cao khô *Silybum marianum*
(*Extractum Silybi mariani siccum*) 155,55 mg
(tương đương Silymarin 70 mg)

Rx. PRESCRIPTION DRUG

Reliv

Bivicerin

Silybum marianum dry extract
(*Extractum Silybi mariani siccum*) 155.55 mg
(equivalent to Silymarin 70 mg)

Box of 3 blisters x 10 hard capsules

Cao khô *Silybum marianum*
(*Extractum Silybi mariani siccum*) 155,55 mg
(tương đương Silymarin 70 mg)

Bivicerin

COMPOSITION: *Silybum marianum* dry extract (*Extractum Silybi mariani siccum*) 155.55 mg (equivalent to Silymarin 70 mg) and excipients q.s. for 1 hard capsule.
INDICATIONS, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION: Refer to package insert.
STORAGE: Temperature not exceeding 30°C, protect from humidity.
SPECIFICATION: In-house.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.

Manufacturer: RELIV PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
Zone A, N° 18, Lê Thị Sóc street, hamlet 2A, Tân Thành Tây commune, Củ Chi district, Ho Chi Minh city, Vietnam.

Reliv

Bivicerin

Silybum marianum dry extract
(*Extractum Silybi mariani siccum*) 155.55 mg
(equivalent to Silymarin 70 mg)



DUỐC PHẨM RELIV

Bivicerin

Cao khô *Silybum marianum*
(*Extractum Silybi mariani siccum*) 155,55 mg
(tương đương Silymarin 70 mg)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV

Bivicerin

Cao khô *Silybum marianum*
(*Extractum Silybi mariani siccum*) 155,55 mg
(tương đương Silymarin 70 mg)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV

BIVICERIN
(60 capsules x 10 capsules - AL-PVC)

Rx. THUỐC KÉ ĐƠN

Reliv

Bivicerin

Cao khô *Silybum marianum*
(*Extractum Silybi mariani siccum*)
(tương đương Silymarin) 155,55 mg
70 mg

Hộp 6 vỉ x 10 viên nang cứng

SĐK/Visa:

Số lô SX/Lot No.:
NSX/Mfd:
HD/Exp:

THÀNH PHẦN: Cao khô *Silybum marianum* (*Extractum Silybi mariani siccum*) 155,55 mg (tương đương Silymarin 70 mg) và các tá dược vừa đủ 1 viên nang cứng.
CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.
BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.
TIÊU CHUẨN: TCCS.
ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Bivicerin

Cao khô *Silybum marianum*
(*Extractum Silybi mariani siccum*)
(tương đương Silymarin) 155,55 mg
70 mg

Reliv

WHO-GMP

Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV
Khu A, số 18, đường Lê Thị Sợc, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Rx. PRESCRIPTION DRUG

Reliv

Bivicerin

Silybum marianum dry extract
(*Extractum Silybi mariani siccum*)
(equivalent to Silymarin) 155,55 mg
70 mg

Box of 6 blisters x 10 hard capsules

Bivicerin

Cao khô *Silybum marianum*
(*Extractum Silybi mariani siccum*)
(tương đương Silymarin) 155,55 mg
70 mg

COMPOSITION: *Silybum marianum* dry extract (*Extractum Silybi mariani siccum*) 155,55 mg (equivalent to Silymarin 70 mg) and excipients q.s. for 1 hard capsule.
INDICATIONS, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:
Refer to package insert.
STORAGE: Temperature not exceeding 30°C, protect from humidity.
SPECIFICATION: In-house.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.

Bivicerin

Silybum marianum dry extract
(*Extractum Silybi mariani siccum*)
(equivalent to Silymarin) 155,55 mg
70 mg

Reliv

WHO-GMP

Manufacturer: RELIV PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
Zone A, N° 18, Le Thi Soc street, hamlet 2A, Tan Thanh Tay commune, Cu Chi district, Ho Chi Minh city, Vietnam.



Bivicerin

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV

Cao khô *Silybum marianum*
(*Extractum Silybi mariani siccum*)
(tương đương Silymarin) 155,55 mg
70 mg

Bivicerin

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV

Cao khô *Silybum marianum*
(*Extractum Silybi mariani siccum*)
(tương đương Silymarin) 155,55 mg
70 mg

SĐK/Visa:

Số lô SX/Lot No.:



Rx. THUỐC KÊ ĐƠN

Reliv

Bivicerin

Cao khô *Silybum marianum*
(*Extractum Silybi mariani siccum*)
(tương đương Silymarin)

155,55 mg
70 mg)

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

SĐK/Visa:
Số lô SX/Lot No.:
NSX/Mfd:
HD/Exp:

THÀNH PHẦN: Cao khô *Silybum marianum* (*Extractum Silybi mariani siccum*) 155,55 mg (tương đương Silymarin 70 mg) và các tá dược vừa đủ 1 viên nang cứng.
CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.
BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.
TIÊU CHUẨN: TCCS.
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Bivicerin

Cao khô *Silybum marianum*
(*Extractum Silybi mariani siccum*)
(tương đương Silymarin) 155,55 mg
70 mg)

Reliv WHO-GMP

Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV
Khu A, số 18, đường Lê Thị Sóc, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Rx. PRESCRIPTION DRUG

Reliv

Bivicerin

Silybum marianum dry extract
(*Extractum Silybi mariani siccum*)
(equivalent to Silymarin)

155.55 mg
70 mg)

Box of 10 blisters x 10 hard capsules

COMPOSITION: *Silybum marianum* dry extract (*Extractum Silybi mariani siccum*) 155.55 mg (equivalent to Silymarin 70 mg) and excipients q.s. for 1 hard capsule.
INDICATIONS, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:
Refer to package insert.
STORAGE: Temperature not exceeding 30°C, protect from humidity.
SPECIFICATION: In-house.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.

Bivicerin

Silybum marianum dry extract
(*Extractum Silybi mariani siccum*)
(equivalent to Silymarin) 155.55 mg
70 mg)

Reliv WHO-GMP

Manufacturer: RELIV PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
Zone A, N° 18, Le Thi Soc street, hamlet 2A, Tan Thanh Tay commune, Cu Chi district, Ho Chi Minh city, Vietnam.

Handwritten signature or mark.



BIVICERIN
 (3 blisters x 10 capsules - AL-AL)

Rx. THUỐC KÊ ĐƠN

Reliv

Bivicerin

Cao khô <i>Silybum marianum</i> (<i>Extractum Silybi mariani siccum</i>) (tương đương Silymarin)	155,55 mg 70 mg)
--	---------------------

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng

SĐK/Visa:
 Số lô SX/Lot No.:
 NSX/Mid:
 HD/Exp:

THÀNH PHẦN: Cao khô *Silybum marianum* (*Extractum Silybi mariani siccum*) 155,55 mg (tương đương Silymarin 70 mg) và các tá dược vừa đủ 1 viên nang cứng.
CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.
BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.
TIÊU CHUẨN: TCCS.
ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Bivicerin

Cao khô <i>Silybum marianum</i> (<i>Extractum Silybi mariani siccum</i>) (tương đương Silymarin)	155,55 mg 70 mg)
--	---------------------

Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV
 Khu A, số 18, đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Reliv

WHO-GMP

Rx. PRESCRIPTION DRUG

Reliv

Bivicerin

<i>Silybum marianum</i> dry extract (<i>Extractum Silybi mariani siccum</i>) (equivalent to Silymarin)	155.55 mg 70 mg)
--	---------------------

Box of 3 blisters x 10 hard capsules

COMPOSITION: *Silybum marianum* dry extract (*Extractum Silybi mariani siccum*) 155.55 mg (equivalent to Silymarin 70 mg) and excipients q.s. for 1 hard capsule.
INDICATIONS, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:
 Refer to package insert.
STORAGE: Temperature not exceeding 30°C, protect from humidity.
SPECIFICATION: In-house.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.

Bivicerin

<i>Silybum marianum</i> dry extract (<i>Extractum Silybi mariani siccum</i>) (equivalent to Silymarin)	155.55 mg 70 mg)
--	---------------------

Manufacturer: RELIV PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
 Zone A, N° 18, Le Thi Soc street, hamlet 2A, Tan Thanh Tay commune, Cu Chi district, Ho Chi Minh city, Vietnam.

Reliv



155,55 mg

70 mg)

155,55 mg

70 mg)

155,55 mg

70 mg)

155,55 mg

70 mg)

155,55 mg

70 mg)

155,55 mg

70 mg)

155,55 mg

70 mg)

BIVICERIN
(6 blisters x 10 capsules - AL-AL)

Rx. THUỐC KÊ ĐƠN

Reliv

Bivicerin

Cao khô *Silybum marianum* 155,55 mg
(*Extractum Silybi mariani siccum*)
(tương đương Silymarin 70 mg)

Hộp 6 vỉ x 10 viên nang cứng

SĐK/Visa:
Số lô SX/Lot No.:
NSX/Mfd:
HD/Exp:

THÀNH PHẦN: Cao khô *Silybum marianum* (*Extractum Silybi mariani siccum*) 155,55 mg (tương đương Silymarin 70 mg) và các tá dược vừa đủ 1 viên nang cứng.
CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.
BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.
TIÊU CHUẨN: TCCS.
ĐẺ XÀ TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Bivicerin

Cao khô *Silybum marianum* 155,55 mg
(*Extractum Silybi mariani siccum*)
(tương đương Silymarin 70 mg)

Reliv WHO-GMP

Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV
Khu A, số 18, đường Lê Thị Soc, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Rx. PRESCRIPTION DRUG

Reliv

Bivicerin

Silybum marianum dry extract 155.55 mg
(*Extractum Silybi mariani siccum*)
(equivalent to Silymarin 70 mg)

Box of 6 blisters x 10 hard capsules


COMPOSITION: *Silybum marianum* dry extract (*Extractum Silybi mariani siccum*) 155.55 mg (equivalent to Silymarin 70 mg) and excipients q.s. for 1 hard capsule.
INDICATIONS, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:
Refer to package insert.
STORAGE: Temperature not exceeding 30°C, protect from humidity.
SPECIFICATION: In-house.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.

Bivicerin

Silybum marianum dry extract 155.55 mg
(*Extractum Silybi mariani siccum*)
(equivalent to Silymarin 70 mg)

Reliv WHO-GMP

Manufacturer: RELIV PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
Zone A, N° 18, Le Thi Soc street, hamlet 2A, Tan Thanh Tay commune, Cu Chi district, Ho Chi Minh city, Vietnam.



(10 blisters x 10 capsules - At-At)

Rx. THUỐC KÊ ĐƠN

Bivicerin

155,55 mg

70 mg)

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

WHO-GMP

Khu A, số 18, đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bivicerin

Cao Shi Siyuan marianensis (Extractum Siyidi marianensis crassum)	155.52 mg
Polysaccharide Siyuanensis	78 mg

Rx. PRESCRIPTION DRUG

Bivicerin

155.55 mg

70 mg)

Box of 10 blisters x 10 hard capsules

Bivicerin

Silybum marianum dry extract (Extractum Silybi mariani siccum) Equivalent to Silybum	155.95 mg 78 mg
--	--------------------

WHO-GMP

Manufacturer: RELIV PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
Zone A, N° 18, Le Thi Soc street, hamlet 2A, Tan Thanh Tay commune, Cu Chi district, Ho Chi Minh city, Vietnam

M.S.D.N: 0314089150 -
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DUỐC PHẨM
RELIV
H. CỬU LONG
T. P. HỒ CHÍ MINH

BIVICERIN
(10 Bivicers x 10 capsules - AL-AL)

155,55 mg
70 mg)

ỐC PHẨM RELIV

Bivicerin

Cao khô *Silybum marianum*
(*Extractum Silybi mariani siccum*)
(tương đương Silymarin)

155,55 mg
70 mg)

CÔNG TY CỔ PHẦN DUỐC PHẨM RELIV

Bivicerin

Cao khô *Silybum marianum*
(*Extractum Silybi mariani siccum*)
(tương đương Silymarin)

155,55 mg
70 mg)

CÔNG TY CỔ PHẦN

HD/Exp:

Số lô SX/Lot No.:

(Handwritten signature)

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Rx. Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

BIVICERIN

Viên nang cứng

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên
Thành phần hoạt chất: Cao khô *Silybum marianum* (*Extractum Silybi mariani siccum*) 155,55 mg (tương đương Silymarin 70 mg).
Thành phần tá dược: Cellulose vi tinh thể 101, magnesi stearat, talc.

DẠNG BAO CHẾ: Viên nang cứng (viên nang cứng số 2, màu tím, bên trong chứa bột thuốc màu vàng).

CHỈ ĐỊNH

- Điều trị rối loạn tiêu hoá trong các bệnh về gan. Suy gan, bảo vệ tế bào gan chống lại các chất độc hại.
- Hỗ trợ điều trị viêm gan cấp và mạn tính, gan nhiễm mỡ, xơ gan, nhiễm siêu vi.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều dùng:

Người lớn: Thông thường từ 1 - 2 viên, mỗi ngày 2 -3 lần.
Có thể điều chỉnh liều tùy theo tình trạng bệnh.

Cách dùng:

Thuốc dùng qua đường uống, sau các bữa ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn cảm với hoạt chất bất cứ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

- Chưa có nghiên cứu liều dùng cho trẻ em dưới 18 tuổi.
- Thận trọng khi dùng thuốc cho các bệnh nhân bị dị ứng với các loại thực vật họ Cúc (*Compositae*, *Asteraceae*).
- Thận trọng khi dùng thuốc cho các bệnh nhân có rối loạn đường huyết hoặc đang dùng thuốc chống đái tháo đường.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Dùng thuốc thận trọng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Thuốc không gây ảnh hưởng gì trên khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỶ CỦA THUỐC

Tương tác

- Có thể có tương tác giữa silymarin và phenytoin nhưng không rõ nét lắm.
- Trên lý thuyết thuốc có tác dụng phần nào hạ đường huyết, có thể làm tăng tác dụng của các thuốc uống hạ đường huyết và insulin.
- Các nghiên cứu trên động vật cho thấy thuốc có ảnh hưởng khi dùng chung với các thuốc khác được chuyển hoá bởi hệ thống enzym gan cytochrom P450, đưa đến làm tăng hiệu quả cũng như tăng tác dụng phụ của các chất đó.

- Trên động vật, silymarin có tác dụng ngăn ngừa phần nào độc tính của amiodaron.

Tương kỵ

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Thuốc có nguồn gốc thực vật được dung nạp tốt, các tác dụng phụ có thể là rối loạn tiêu hóa nhẹ, đau đầu, ngứa ngáy.

Phản ứng dị ứng có thể xảy ra ở một vài trường hợp riêng lẻ.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Không có trường hợp quá liều nào được báo cáo. Nếu xảy ra quá liều thì điều trị theo triệu chứng.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC: Cao *Silybum marianum* được chiết xuất từ hạt của cây Cúc gai (Milk thistle) tên khoa học *Silybum marianum* họ *Compositae*. Hoạt chất chính là phức hợp flavonoid gọi là silymarin gồm một hỗn hợp đồng phân của silybin, silydianin và silycristin có đặc tính khử các gốc tự do nên có tác dụng bảo vệ tế bào gan, các cấu trúc xung quanh và bên trong gan, chống lại các tác nhân độc hại, giúp gan hoạt động tốt hơn và tăng thải độc gan. Có 4 cơ chế tác dụng được đề nghị như sau:

- Tác dụng như một chất chống oxy hoá, một chất điều hoà mức glutathion nội bào.
- Tác dụng như một chất ổn định màng tế bào, điều hòa tính thấm, ngăn cản các chất độc hại đi vào tế bào gan.
- Tăng cường sinh tổng hợp RNA ribô thể, kích thích tái sinh tế bào gan.
- Ức chế sự biến dạng tế bào gan hình sao thành sợi nguyên bào cơ, trong quá trình tích lại các sợi collagen đưa đến xơ gan.

Tác dụng bảo vệ tế bào gan đã được chứng minh không những đối với các chất độc hại cổ điển như tetrachlorur carbon, thioacetamid, galactosamin, acetaminophen, rượu ethylic mà còn với các thuốc hướng thần phenothiazin cùng các tổn thương gây bởi nấm độc *Amanita phalloide*, FV3 (Frog virus 3), tia bức xạ, virus viêm gan... Hiện nay còn được nghiên cứu sử dụng trong phòng chống ung thư gan, đái tháo đường, hạ cholesterol và một số bệnh ngoài da khác.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:

- Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm – nhôm hoặc nhôm – PVC).
- Hộp 1 chai 90 viên (chai nhựa HDPE).

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

CƠ SỞ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV

Địa chỉ: Khu A, số 18, đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

