

GMP-WHO

CAO ÍCH MẪU

CÔNG THỨC: Cho 1 chai 90ml.

Ích mẫu (<i>Herba Leonuri japonici</i>).....	72,0g
Hương phụ (<i>Rhizoma Cyperi</i>).....	22,5g
Ngải cứu (<i>Herba Artemisiae vulgaris</i>).....	18,0g
Tá dược (đường trắng, ethanol 96%, nước tinh khiết).....	vừa đủ 90 ml

CÔNG NĂNG:

Ích mẫu có công năng hoạt huyết khứ ứ, lợi thủy tiêu phù, sinh huyết mới. Chủ trị kinh đau, kinh bế, huyết hôi ra không hết, phù thũng, đái không lợi.

Hương phụ có công năng hành khí chỉ thống, giải uất điều kinh, kiện vị tiêu thực. Chủ trị: Giảm đau trong các trường hợp: Đau dạ dày, tiêu hóa kém, đau dây thần kinh ngoại biên, đau đầu, đau bụng kinh, rối loạn kinh nguyệt.

Ngải cứu công năng chỉ huyết, trừ hàn thấp, điều kinh, an thai. Chủ trị: Kinh nguyệt không đều, băng huyết, rong huyết, thổ huyết, khí hư bạch đới, động thai.

Sản phẩm CAO ÍCH MẪU kết hợp 3 vị thuốc trên, đã được thử lâm sàng, kết quả cho thấy có tác dụng trên người nữ có chứng rối loạn kinh nguyệt và đau bụng kinh:

- Thực sự làm giảm đau đối với chứng đau bụng kinh và có tác dụng điều chỉnh chu kỳ hành kinh, làm thông kinh.
- Làm hạ huyết áp nhẹ và giảm nhịp tim trên người nữ ở độ tuổi mãn kinh, làm giảm các triệu chứng khó chịu lúc hành kinh như cảm giác nóng bừng mặt, nhức đầu, cáu gắt..
- Làm giảm đau vùng thượng vị trên bệnh nhân có hội chứng dạ dày tá tràng.
- Thuốc có thể sử dụng lâu dài mà không gây hại cho người dùng.

CHỈ ĐỊNH:

Kinh nguyệt không đều (bao gồm vòng kinh dài, vòng kinh ngắn hay vòng kinh dài ngắn không đều), đau bụng kinh.

Rối loạn kinh nguyệt trong thời kỳ mới có kinh và tiền mãn kinh (bao gồm vòng kinh dài, vòng kinh ngắn hay vòng kinh dài ngắn không đều).

Các triệu chứng trong giai đoạn tiền mãn kinh như cảm giác nóng bừng mặt, nhức đầu, cáu gắt, đau bụng.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 muỗng canh (15ml).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữ có thai. Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG: Cho đến nay chưa có thông tin báo cáo về các trường hợp cần thận trọng khi dùng thuốc.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Không dùng cho phụ nữ có thai; phụ nữ cho con bú được sử dụng.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Cho đến nay chưa có thông tin báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Cho đến nay chưa có thông tin báo cáo về tương tác thuốc.

DẠNG THUỐC VÀ TRÌNH BÀY: Cao lỏng.

Hộp 1 chai thủy tinh 90ml; Hộp 1 chai thủy tinh 100ml; Hộp 1 chai thủy tinh 180ml.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 08.37517111 - 08.38778899 Fax: 08.38752048

Sản xuất tại Nhà Máy Dược Phẩm OPC

Ấp Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương
Email: info@opcpharma.com Website: www.opcpharma.com