



Mẫu nhãn ống nhựa 8ml

CAO LÔNG HOẠT HUYẾT ống 8ml không được tiêm

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

DƯỠNG NÃO DTH

CAO KHÔ LÁ BẠCH QUẢ 40MG/8ML
CAO ĐẶC RỄ ĐINH LĂNG (10:1) 120MG/8ML

HĐ: LSX:

Mẫu nhãn quy cách hộp 10 ống nhựa x 8 ml

GMP - WHO

CAO LÔNG HOẠT HUYẾT

DƯỠNG NÃO DTH

- CAO KHÔ LÁ BẠCH QUẢ
- CAO ĐẶC RỄ ĐINH LĂNG

Hộp 10 ống 8 ml

THÀNH PHẦN: Cho 8ml cao lỏng

Cao khô lá Bạch quả Tương đương 9,6 mg Ginkgolavon Glycosid toàn phần	40mg
Cao đặc rễ Đinh lăng 10:1 Tương đương 36 mcg acid Oleanolic Tương đương 1,2 gam Đinh lăng (rễ)	120mg
Tã được vừa đủ 8 ml	

CHỈ ĐỊNH: Phòng và điều trị các bệnh:

- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mất thăng bằng
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

Cách dùng: Uống trực tiếp hoặc pha loãng với nước ấm. Uống sau bữa ăn.
Liều dùng:
Trẻ em từ 7 - 15 tuổi: Uống mỗi lần 1 ống hoặc 8ml, ngày 2 - 3 lần
Người lớn: Uống mỗi lần 2 ống hoặc 16 ml, ngày 2 - 3 lần
Chống chỉ định và các thông tin khác: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

CAO LÔNG HOẠT HUYẾT
DƯỠNG NÃO DTH

CAO LÔNG HOẠT HUYẾT
DƯỠNG NÃO DTH

Hộp 10 ống 8 ml

CAO LÔNG HOẠT HUYẾT

DƯỠNG NÃO DTH

- CAO KHÔ LÁ BẠCH QUẢ
- CAO ĐẶC RỄ ĐINH LĂNG

GMP - WHO

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng
Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Không được tiêm

SĐK:
LSX:
NSX:
HĐ:



TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn cơ sở

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa,
tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 0903220367 - Hotline: 0906.59.98.98
Email: Thpharmajsc2019@gmail.com
Website: www.Thpharma.vn



MẪU NHÃN QUY CÁCH HỘP 10 ỨNG THUỶ TINH X 8ML

GMP - WHO

CAO LÔNG HOẠT HUYẾT

DƯỠNG NÃO DTH

■ CAO KHÔ LÁ BẠCH QUẢ

■ CAO ĐẶC RỄ ĐÌNH LĂNG

Hộp 10 ống 8 ml

CAO LÔNG HOẠT HUYẾT
DƯỠNG NÃO DTH

THÀNH PHẦN: Cho 8ml cao lỏng

Cao khô lá Bạch quả	40 mg
Tương đương 9,6 mg Ginkgolivon Glycosid toàn phần:	
Cao đặc rễ Đình lăng (10:1)	120 mg
Tương đương 36 mcg acid Oleonic	
Tương đương 1,2 gam Đình lăng (rễ)	
Tã được: vừa đủ 8 ml	

CHỈ ĐỊNH: Phòng và điều trị các bệnh:

- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mất thăng bằng
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

Cách dùng: Uống trực tiếp hoặc pha loãng với nước ấm. Uống sau bữa ăn.
Liều dùng:
Trẻ em từ 7 - 15 tuổi: Uống mỗi lần 1 ống hoặc 8 ml, ngày 2 - 3 lần.
Người lớn: Uống mỗi lần 2 ống hoặc 16 ml, ngày 2 - 3 lần.

Chống chỉ định và các thông tin khác: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

CAO LÔNG HOẠT HUYẾT

DƯỠNG NÃO DTH

CAO LÔNG HOẠT HUYẾT

DƯỠNG NÃO DTH

■ CAO KHÔ LÁ BẠCH QUẢ

■ CAO ĐẶC RỄ ĐÌNH LĂNG

Hộp 10 ống 8 ml

GMP - WHO

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng
Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Không được lạm

LSX:
NSX:
HD:



TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn cơ sở

SỞ:

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa,
tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 0903220367 - Hotline: 0906.59.98.98
Email: Thpharmajsc2019@gmail.com
Website: www.Thpharma.vn

GMP - WHO



- CAO KHÔ LÁ BẠCH QUẢ
- CAO ĐẮC RỄ ĐÌNH LĂNG



Hộp 20 ống 8 ml

THÀNH PHẦN: Cho 8ml cao lỏng

Cao khô là Bạch quả	
Tương đương 9,6 mg Ginkgolavon Glycosid toàn phần:	40 mg
Cao đặc rễ Đinh lăng (10:1)	
Tương đương 36 mcg acid Oleonic Tương đương 1,2 gam Đinh lăng (rễ)	120 mg
Tã được: vừa đủ 8 ml	

CHỈ ĐỊNH: Phòng và điều trị các bệnh:

- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mất môi, mất thăng bằng
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

Cách dùng: Uống trực tiếp hoặc pha loãng với nước ấm. Uống sau bữa ăn.

Trẻ em từ 7 - 15 tuổi: Uống mỗi lần 1 ống hoặc 8 ml, ngày 2 - 3 lần

Người lớn: Uống mỗi lần 2 ống hoặc 16 ml, ngày 2 - 3 lần

Chống chỉ định và các thông tin khác: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

Hộp 20 ống 8 ml

CAO LONG HOẠT HUYẾT
DƯỠNG NẤU DTH



- CAO KHÔ LÀ BẠCH QUA
- CAO ĐẶC RỄ ĐÌNH LĂNG

CAO LÔNG HOÀT HUYẾT
DƯỠNG NẠO DTH



GMP - WHO

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng
Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Không được tiêm

LSX:

NSX:

HD:



TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn cơ sở

SDK:

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Lô 04, KCN Tây Bắc Gà, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa,
tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903220367 – Hotline: 0906.59.98.98

Email: Thpharmajsc2019@gmail.com

Website: www.Thpharma.vn



MẪU NHÃN QUY CÁCH HỘP 24 ỨNG THUỶ TINH X 8ML

GMP - WHO



CAO LÔNG HOẠT HUYẾT
DƯỠNG NÃO DTH

- CAO KHÔ LÁ BẠCH QUẢ
- CAO ĐẶC RỄ ĐÌNH LĂNG



Hộp 24 ống 8 ml

THÀNH PHẦN: Cho 8ml cao lỏng

Cao khô lá Bạch quả	40 mg
Tương đương 9,6 mg Ginkgolavon Glycosid toàn phần:	
Cao đặc rễ Đình lăng (10:1)	120 mg
Tương đương 36 mcg acid Oleanolic	
Tương đương 1,2 gam Rễ đình lăng (rễ)	
Ta được: vừa đủ 8 ml	

CHỈ ĐỊNH: Phòng và điều trị các bệnh:

- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mất thăng bằng
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

Cách dùng: Uống trực tiếp hoặc pha loãng với nước ấm. Uống sau bữa ăn

Liều dùng:

Trẻ em từ 7 - 15 tuổi: Uống mỗi lần 1 ống hoặc 8 ml, ngày 2 - 3 lần

Người lớn: Uống mỗi lần 2 ống hoặc 16 ml, ngày 2 - 3 lần

Chống chỉ định và các thông tin khác: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

Hộp 24 ống 8 ml

- CAO KHÔ LÁ BẠCH QUẢ
- CAO ĐẶC RỄ ĐÌNH LĂNG

CAO LÔNG HOẠT HUYẾT
DƯỠNG NÃO DTH



GMP - WHO

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng
Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Không được tiêm

LSX:

NSX:

HD:



TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn cơ sở

SĐK:

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đồng Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903220367 - Hotline: 0906.59.98.98

Email: Thpharmajsc2019@gmail.com

Website: www.Thpharma.vn



Mẫu nhãn ống thủy tinh

ống 8 ml

Không được tiêm



CAO LÔNG HOẠT HUYẾT

DƯỠNG NÃO DTH

- CAO KHÔ LÁ BẠCH QUẢ 40MG/8ML
- CAO ĐẶC RỄ ĐINH LĂNG (10:1) 120 MG/8ML



LSX:

HD:

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA



GMP - WHO

CAO LÔNG

HOẠT HUYẾT

DƯỠNG NÀO DTH

■ CAO KHÔ LÁ BẠCH QUẢ

■ CAO ĐẶC RỄ ĐÌNH LĂNG

Hộp 1 chai x 100ml, kèm cốc đong

THÀNH PHẦN: Cho 8ml cao lỏng	
Cao khô lá Bạch quả <i>Tương đương 9,6 mg Ginkgolavon</i> <i>Glycosid toàn phần</i>	40mg
Cao đặc rễ Đinh lăng (10:1) <i>Tương đương 36 mcg acid Oleanolic</i> <i>Tương đương 1,2 gam Đinh lăng (rễ)</i>	120mg
Tá được vừa đủ 8 ml	

CHỈ ĐỊNH:

Phòng và điều trị các bệnh:

- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mất thăng bằng
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

Cách dùng: Uống trực tiếp hoặc pha loãng với nước ấm. Uống sau bữa ăn

Liều dùng:

Trẻ em từ 7 – 15 tuổi: Uống mỗi lần 1 ống hoặc 8 ml, ngày 2-3 lần

Người lớn: Uống mỗi lần 2 ống hoặc 16 ml, ngày 2-3 lần

Chống chỉ định và các thông tin khác:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

GMP - WHO

CAO LÔNG

HOẠT HUYẾT

DƯỠNG NÀO DTH

■ CAO KHÔ LÁ BẠCH QUẢ

■ CAO ĐẶC RỄ ĐÌNH LĂNG

Hộp 1 chai x 100ml, kèm cốc đong

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

Tiêu chuẩn cơ sở

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30 độ C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn
sử dụng trước khi dùng

SĐK:

LSX:

NSX:

HD:

SẢN XUẤT TẠI:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, phường Đồng Thọ, Thành phố Thanh Hóa.

Điện thoại: 0903220367

Hotline: 0906.59.98.98

Email: Thpharmajsc2019@gmail.com

Website: www.thpharma.vn





NHẪN CHAI

THÀNH PHẦN: Cho 8ml cao lỏng

Cao khô lá Bạch quả	40 mg
Tương đương 9,6 mg Ginkgolavon Glycosid toàn phần	
Cao đặc rễ Đinh lăng (10:1)	
Tương đương 36 mcg acid Oleonic	120 mg
Tương đương 1,2 gam Đinh lăng (rễ)	
Tã được rửa đủ 8 ml	

CHỈ ĐỊNH:

- Phòng và điều trị các bệnh:
- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mất thăng bằng
 - Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

Cách dùng: Uống trực tiếp hoặc pha loãng với nước ấm. Uống sau bữa ăn


Liều dùng:

Trẻ em từ 7 – 15 tuổi: Uống mỗi lần 1 ống hoặc 8 ml, ngày 2-3 lần

Người lớn: Uống mỗi lần 2 ống hoặc 16 ml, ngày 2-3 lần

GMP - WHO

CAO LÔNG
HOẠT HUYẾT
DƯỠNG NÃO DTH



TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

Tiêu chuẩn cơ sở

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30 độ C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

LSX:

HD:



SẢN XUẤT TẠI:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại: 0903220367 – Hotline: 0906.59.98.98
Email: Thpharmajsc2019@gmail.com Website: www.thpharma.vn

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC



Tên thuốc: CAO LỎNG HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO DTH

Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc:

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Không được tiêm

3. Thành phần công thức thuốc: Cho 8 ml cao lỏng

Thành phần hoạt chất:	
Cao khô lá Bạch quả (<i>Extractum Folii Ginkgo siccus</i>) Tương đương 9,6 mg Ginkoflavon Glycosid toàn phần	40 mg
Cao đặc rễ Đinh lăng 10:1 (<i>Extractum Polysciacis fruticosae spissum</i>) Tương đương 36 mcg acid Oleanolic Tương đương 1,2 gam Đinh lăng (rễ) (<i>Polyscias fruticosa</i>)	120 mg
Thành phần tá dược:	
Methylparaben, Propylparaben, Sucralose, Ethanol 96%, nước tinh khiết vừa đủ 8 ml	

4. Dạng bào chế: Cao lỏng

Mô tả sản phẩm: Chất lỏng màu vàng nâu đến nâu sẫm, mùi thơm dược liệu, vị ngọt, hơi đắng

5. Chỉ định:

Phòng và điều trị các bệnh:

- Thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mất thăng bằng
- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh.

6. Cách dùng, liều dùng:

Cách dùng: Uống trực tiếp hoặc pha loãng với nước ấm. Uống sau bữa ăn

Liều dùng:

Trẻ em từ 7 – 15 tuổi: Uống mỗi lần 1 ống hoặc 8 ml, ngày 2-3 lần

Người lớn: Uống mỗi lần 2 ống hoặc 16 ml, ngày 2-3 lần

Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng

7. Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai
- Người đang xuất huyết, rối loạn đông máu.

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:



(C) những bệnh nhân có bệnh lý có xu hướng tăng nguy cơ chảy máu (chảy máu nội tạng), đang điều trị bằng thuốc chống đông, thuốc kháng tiểu cầu, cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc này.

Thuốc (có chứa Bạch quả) có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Để phòng ngừa, cần ngừng dùng thuốc này 3 đến 4 ngày trước khi phẫu thuật.

- Ở bệnh nhân động kinh, không thể loại trừ tăng khởi phát cơn co giật do uống thuốc (có chứa Bạch quả).
- Không nên sử dụng đồng thời thuốc (có chứa Bạch quả) với Efavirenz
- Sản phẩm có chứa Methylparaben, Propylparaben: có thể gây ra các phản ứng dị ứng (có thể xảy ra chậm)
- Thuốc này có chứa 12,5% (thể tích) ethanol, tức là đạt khoảng 800 mg ethanol trong mỗi liều, tương đương 20 ml bia, 8,3 ml rượu vang trong mỗi liều (8ml). Điều này có hại cho bệnh nhân bị nghiện rượu. Cần lưu ý cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, trẻ em và các đối tượng có nguy cơ cao như bệnh nhân bị suy gan, hoặc động kinh

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Phụ nữ có thai: Không dùng
- Phụ nữ cho con bú: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ cho con bú, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Chưa có nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. Tuy nhiên, do tác dụng không mong muốn của thuốc có thể gây đau đầu, chóng mặt nên cần thận trọng khi lái xe, vận hành máy móc trong khi dùng thuốc này

11. Tương tác, tương kỵ của thuốc:

- *Tương tác:*

- + Bạch quả có thể làm giảm nồng độ efavirenz trong huyết tương do cảm ứng Cytochrome CYP3A4, do đó không nên sử dụng đồng thời thuốc này với efavirenz.
- + Bạch quả khi dùng chung với các thuốc chống đông máu (ví dụ: phenprocoumon, warfarin) hoặc thuốc kháng tiểu cầu (ví dụ: clopidogrel, axit acetylsalicylic và các thuốc NSAIDs), hiệu quả của thuốc có thể bị ảnh hưởng.
- + Các nghiên cứu hiện có với warfarin không cho thấy sự tương tác giữa warfarin và Bạch quả, nhưng cần theo dõi khi bắt đầu điều trị, khi đổi liều, khi kết thúc điều trị với thuốc có chứa Bạch quả, hoặc khi đổi thuốc
- + Một nghiên cứu về tương tác với Talinolol cho thấy Bạch quả có thể ức chế P-glycoprotein tại ruột. Điều này có thể làm tăng phơi nhiễm của các thuốc nhạy cảm với P-glycoprotein tại ruột như dabigatran etexilate. Do đó cần hỏi ý kiến bác sĩ khi dùng kết hợp thuốc có chứa Bạch quả và dabigatran.

+ Một nghiên cứu về tương tác thuốc cho thấy C_{max} của nifedipine có thể tăng khi dùng cùng với Bạch quả. Ở một số trường hợp, mức tăng có thể lên tới 100% gây nên chóng mặt và tăng bốc hỏa.

- *Tương kỵ:*

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

12. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Sản phẩm chứa Bạch quả có thể gây ra các tác dụng phụ bao gồm: đau đầu, chóng mặt, đánh trống ngực, rối loạn tiêu hóa, rối loạn chảy máu và phản ứng quá mẫn ở da.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc

13. Quá liều và cách xử trí:

- Quá liều: khi dùng thuốc quá liều có thể xảy ra: ỉa chảy, buồn nôn, nôn mửa, kích ứng và bồn chồn. Không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
- Xử trí: Nếu thấy có dấu hiệu bất thường sau khi dùng thuốc quá liều, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

14. Quy cách đóng gói:

- Hộp 10 ống (thủy tinh/ nhựa PVC/PE) x 8 ml
- Hộp 20 ống (thủy tinh/ nhựa PVC/PE) x 8 ml
- Hộp 24 ống (thủy tinh) x 8 ml
- Hộp 1 chai (thủy tinh) x 100 ml, kèm cốc đong.

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
- Điều kiện bảo sau khi mở nắp chai lần đầu: vặn chặt nắp chai, để nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C
- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất; 15 ngày sau khi mở nắp chai lần đầu
- Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở

16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0903220367 – Hotline: 0906.59.98.98

Ngày 6 tháng 4 năm 2024
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA
TP. THANH HÓA T. THANH HÓA
CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Lăng Hùng