

Thành phần: Mỗi g chứa:

Carbomer0,2%

Tá dược vừa đủ 1 g.

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 0,6 g

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

SĐK:

Số lô SX:

NSX: dd.mm.yy

HD: dd.mm.yy

Mã vạch
(nếu có)

Nhà sản xuất:



Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.



Số lô, hạn dùng được dập nổi trực tiếp dưới chân ống dưới dạng:

LSX: nmmmyy

HD: dd.mm.yy



Hộp 20 ống x 0,6 g

Carbomer


TCCS.



Hộp 20 ống x 0,6 g



Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,
xã Văn Bình, huyện Thường Tín,
thành phố Hà Nội.



Số lô, hạn dùng được dập nổi trực tiếp dưới chân ống dưới dạng:

LSX: nnmmyy

HD: dd.mm.yy



Thành phần: Mỗi g chứa:

Carbomer0,2%

Tá dược vừa đủ 1 g.

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 1 g

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Đề xa tầm tay trẻ em

SĐK:

Số lô SX:

NSX: dd.mm.yy

HD: dd.mm.yy

Nhà sản xuất:

Mã vạch
(nếu có)



Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.




Carbomer

Carbomer
Carbomer 0,2%

*Điều trị khô mắt
Không chất bảo quản*

Gel nhỏ mắt

Hộp 20 ống x 1 g

Carbomer

Thành phần:
Mỗi g có chứa:
Carbomer 0,2%
Tá dược vừa đủ 1g.
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:
Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.
Điều kiện bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
Quy cách đóng gói:
Hộp 20 ống x 1 g
Tiêu chuẩn chất lượng:
TCCS.

Carbomer
Carbomer 0,2%

*Điều trị khô mắt
Không chất bảo quản*

Gel nhỏ mắt

Hộp 20 ống x 1 g

Carbomer

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Đề xa tầm tay trẻ em.*

SĐK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

Mã vạch
(nếu có)

Nhà sản xuất:


Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,
xã Văn Bình, huyện Thường Tín,
thành phố Hà Nội.

M.S.D.N: 0104089394 - G.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
CPC1 HÀ NỘI
H. THƯỜNG TÍN - TP. HÀ NỘI

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

Carbomer

Carbomer 0,2% (w/w)

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng



Thành phần:

Mỗi g chứa:

Thành phần hoạt chất:

Carbomer 0,2%

Thành phần tá dược: Sorbitol, natri hydroxid, nước cất pha tiêm.

Dạng bào chế: Gel nhỏ mắt

Mô tả: Dịch nhớt, không có tiểu phân quan sát được bằng mắt thường.

pH: 6,0 – 8,0

Chỉ định

Thay thế nước mắt trong các trường hợp tiết nước mắt không đủ và điều trị triệu chứng cho bệnh khô mắt bao gồm cả viêm kết-giác mạc khô và phim nước mắt không ổn định.

Liều dùng và cách dùng

Người lớn (kể cả người cao tuổi) và trẻ em (từ 2 tuổi trở lên):

Nhỏ 1 giọt vào khóe mắt x 3-4 lần/ngày hoặc theo yêu cầu, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Hướng dẫn sử dụng:



Tách ống ra khỏi vỉ, kiểm tra tính nguyên vẹn của ống trước khi mở

Vặn nắp rời ống thuốc và giữ sạch đầu nắp

Giữ ống càng gần mắt càng tốt nhưng không chạm vào mắt, bóp nhẹ, nhỏ từng giọt vào mắt

Đậy nắp lại sau khi sử dụng

Chống chỉ định

Mẫn cảm với hoạt chất hoặc bất kỳ tá dược nào.



Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

Chỉ sử dụng cho mắt.
Mờ mắt có thể xảy ra nếu nhỏ quá nhiều giọt cùng lúc hoặc sử dụng thuốc quá thường xuyên. Tình trạng này có thể kéo dài tới 1 giờ. Có thể khắc phục bằng cách chớp mắt mạnh trong vài giây. Nếu không đỡ, kéo mi mắt dưới để cho đến khi gel chảy xuống túi kết mạc và thị lực được phục hồi.
Không nên dùng kính áp tròng trong thời gian điều trị với **Carbomer**.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Dữ liệu an toàn khi sử dụng **Carbomer** cho phụ nữ có thai và cho con bú chưa được thiết lập, vì vậy không nên dùng **Carbomer** cho những đối tượng này.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc

Mờ mắt thoáng qua có thể xảy ra khi nhỏ thuốc. Nếu gặp phải tình trạng này, bệnh nhân không nên lái xe hay vận hành máy móc cho đến khi thị lực được phục hồi.

Tương tác, tương kỵ của thuốc

Không có tương tác đáng kể nào được báo cáo.
Tương kỵ: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

Tác dụng không mong muốn của thuốc

Tác dụng không mong muốn của carbomer được liệt kê trong bảng sau theo tần suất: rất thường gặp ($ADR \geq 1/10$), thường gặp ($1/100 \leq ADR < 1/10$), ít gặp ($1/1000 \leq ADR < 1/100$), hiếm gặp ($1/10000 \leq ADR < 1/1000$), rất hiếm gặp ($ADR < 1/10000$) và không được biết đến (không thể ước tính từ các dữ liệu có sẵn).

Hệ cơ quan	Tác dụng không mong muốn
Rối loạn mắt	<i>Rất thường gặp:</i> mờ mắt <i>Thường gặp:</i> khó chịu ở mắt, nứt mí mắt, kích ứng mắt <i>Ít gặp:</i> phù phúc mạc, phù mạc kết mạc, đau mắt, ngứa mắt, tăng calci máu, chảy nước mắt
Rối loạn da và mô dưới da	<i>Ít gặp:</i> viêm da tiếp xúc
Rối loạn miễn dịch	<i>Không được biết đến:</i> Phản ứng quá mẫn.

Xử trí ADR:

Mờ mắt: Sẽ hết sau một vài phút sau khi nhỏ thuốc, không cần ngừng thuốc. Tuy nhiên không lái xe hay vận hành máy móc cho đến khi mắt nhìn rõ trở lại.
Kích ứng mắt, cảm giác châm chích: Tác dụng này thường kéo dài không quá một hoặc hai phút. Nếu tác dụng này vẫn còn tiếp tục, cần thông báo với bác sĩ.
Phản ứng quá mẫn: Cần ngưng sử dụng và thông báo cho bác sĩ.

40003
ÔNG T
Ổ PHẢ
JC PH
31 HÀ
TÍN



Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ khi gặp các tác dụng không mong muốn như trên khi sử dụng thuốc hoặc báo cáo các phản ứng có hại của thuốc về Trung tâm Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (ADR) Quốc Gia.

Địa chỉ: 13 - 15 Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điện thoại: 024.3.9335.618; Fax: 024.3.9335642;

Email: di.pvcenter@gmail.com

Quá liều và cách xử trí

Không có trường hợp quá liều nào được báo cáo.


Đặc tính dược lực học

Mã ATC: S01XA20

Nhóm tác dụng dược lý: Nước mắt nhân tạo và các thuốc nhãn khoa khác

Carbomer có chứa carbomer 980, một polyme trọng lượng phân tử cao có chứa acid carboxyvinylic. Gel tạo thành một màng bôi trơn và làm ẩm màng trên bề mặt của mắt, do đó làm giảm các triệu chứng khô mắt và bảo vệ giác mạc khỏi bị khô. Thuốc có pH và độ thẩm thấu tương tự như của màng nước mắt thông thường.

Việc sử dụng các chất nhuộm màu cần thiết cung cấp bằng chứng khách quan rằng **Carbomer** giúp cải thiện trong điều trị tổn thương biểu mô giác mạc và kết mạc kết hợp với tình trạng khô mắt. Thời gian lưu của gel trên niêm mạc mắt lâu hơn so với nước mắt nhân tạo có độ nhớt thấp, do đó không nên dùng thường xuyên.



Đặc tính dược động học

Không có sẵn nghiên cứu dược động học trên người. Sự hấp thu hoặc tích lũy trong các mô mắt có thể không đáng kể do trọng lượng phân tử cao của carbomer.

Quy cách đóng gói:

Ống 0,6 g; 1 g

Hộp 5 ống, 20 ống

Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở

Nhà sản xuất:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

HSBS4 02/2025

