

CILINE EFF

MẪU HỘP (10 gói x 2 g)



Long An, ngày 13 tháng 02 năm 2025



GIÁM ĐỐC

Đặng Hữu Phước Thịnh



Long An, ngày 13 tháng 02 năm 2025

GIÁM ĐỐC



Đặng Hữu Phước Thịnh

CILINE EFF

MẪU HỘP (30 gói x 2 g)

Thuốc cốm sủi bọt

CILINE EFF

L-Citrulline DL-Malate (1:1)
1000 mg

Hộp 30 gói x 2g



ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

SLSX:

NSX:

HSD:

BARCODE

Thành phần:

Mỗi gói cốm sủi bọt chứa:

L-Citrulline DL-Malate (1:1) 1000 mg.

Tá dược vừa đủ 1 gói.

Cách dùng, liều dùng, chỉ định, chống chỉ định và các thông tin khác:

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

Số giấy đăng ký lưu hành:

Thuốc cốm sủi bọt

CILINE EFF

L-Citrulline DL-Malate (1:1)
1000 mg

Hộp 30 gói x 2g



Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE

Lô B3-1, góc đường D4-N1, khu công nghiệp Hựu Thạnh, Xã Hựu Thạnh,
Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Website: <https://laterrefrance.vn>

Email: laterrefrance@laterrefrance.vn

Long An, ngày 13 tháng 02 năm 2025



GIÁM ĐỐC

Đặng Hữu Phước Thịnh

CILINE EFF

MẪU gói x 2 g

LSX:
HD:

Thuốc cốm sủi bọt

CILINE EFF



- Cho thuốc vào ly.
- Cho thêm một ít nước.
- Khuấy đều.
- Uống ngay sau khi pha.

Gói x 2g

Thành phần: Mỗi gói cốm sủi bọt chứa:
L-Citrulline DL-Malate (1:1) 1000 mg. Tá dược vừa đủ 1 gói.

Cách dùng, liều dùng, chỉ định, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

Số giấy đăng ký lưu hành:



Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE
Lô B3-1, góc đường D4-N1, khu công nghiệp Hựu Thạnh,
Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam.
Website: <https://laterrefrance.vn>
Email: laterrefrance@laterrefrance.vn

Long An, ngày 13 tháng 02 năm 2025



GIÁM ĐỐC

Đặng Hữu Phước Thịnh

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Thuốc cầm sùi bọt

CILINE EFF

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để xa tầm tay trẻ em



1. Thành phần công thức thuốc

Thuốc cầm sùi bọt **CILINE EFF** chứa:

Thành phần dược chất: L-Citrulline DL-Malate (1:1)1000 mg

Thành phần tá dượcvừa đủ 1 gói

(Maltodextrin, natri bicarbonat khan, aspartam, povidon K30, mùi cam).

2. Dạng bào chế

Dạng bào chế: Thuốc cầm sùi bọt.

Mô tả: Cốm màu trắng, khô rời, mùi thơm, vị ngọt chua.

3. Chỉ định

Hỗ trợ điều trị suy nhược chức năng.

4. Liều dùng, cách dùng

Cách dùng

Dùng đường uống.

Hòa tan thuốc trong một ly nước trước khi uống.

Liều dùng

Thuốc chỉ được sử dụng cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi.

Thời gian dùng thuốc giới hạn trong 15 ngày.

Người lớn: 3 gói mỗi ngày, chia làm nhiều lần trong ngày.

Trẻ em trên 12 tuổi: 2 gói mỗi ngày, chia làm nhiều lần trong ngày.

5. Chống chỉ định

Quá mẫn với L-Citrulline DL-Malate (1:1) hay bất kỳ thành phần tá dược nào của thuốc.

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

Không có thông tin về cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc.

Thông tin về tá dược:

Thuốc này có chứa 65 mg Aspartam trong mỗi gói. Aspartam bị thủy phân tại ống tiêu hóa khi dùng đường uống. Một trong những sản phẩm thủy phân chính là phenylalanine. Chưa có bằng chứng phi

lâm sàng hay lâm sàng để đánh giá việc sử dụng Aspartam cho trẻ dưới 12 tuần tuổi (khoảng 3 tháng tuổi)

Thuốc này có chứa 104,04 mg natri trong mỗi gói, tương đương 5,2% trong khẩu phần natri tối đa mỗi ngày được khuyến cáo cho người lớn là 2 g.

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Phụ nữ có thai

Chưa có dữ liệu cho thấy thuốc gây quái thai ở động vật.

Hiện chưa có báo cáo lâm sàng nào về bất kỳ tác dụng gây dị dạng hoặc độc tính cho bào thai. Tuy nhiên, việc theo dõi các trường hợp mang thai có sử dụng thuốc này là không đủ để loại trừ mọi nguy cơ. Do đó, để phòng ngừa, khuyến cáo không sử dụng thuốc này trong thời kì mang thai.

Phụ nữ cho con bú

Chưa có đầy đủ dữ liệu về sự bài tiết của thuốc qua sữa mẹ. Khuyến cáo không sử dụng thuốc trong thời kỳ đang cho con bú.

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

9. Tương tác, tương kỵ của thuốc

Tương tác của thuốc

Không có nghiên cứu nào về tương tác thuốc.

Tương kỵ của thuốc

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc

Rối loạn hệ tiêu hóa

Hiếm gặp: đau dạ dày nhẹ khi bắt đầu điều trị.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ khi gặp các tác dụng không mong muốn như trên khi sử dụng thuốc hoặc báo cáo các phản ứng có hại của thuốc về Trung tâm Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (ADR) Quốc Gia. Địa chỉ: 13 - 15 Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Điện thoại: 024.3.9335.618; Fax: 024.3.9335642; Email: di.pycenter@gmail.com.

11. Quá liều và cách xử trí

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

12. Đặc tính dược lực học

Nhóm dược lý: Thuốc chống suy nhược.

Mã ATC: A13A2 - (A; đường tiêu hóa và chuyển hóa)



13. Đặc tính dược động học

Không có thông tin về đặc tính dược động học của thuốc.

14. Quy cách đóng gói:

Hộp 10 gói Alu phức hợp $\times$ 2g thuốc cốm sủi bọt, kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

Hộp 20 gói Alu phức hợp $\times$ 2g thuốc cốm sủi bọt, kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

Hộp 30 gói Alu phức hợp $\times$ 2g thuốc cốm sủi bọt, kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc

Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Hạn dùng của thuốc: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:

Tên cơ sở sản xuất thuốc: CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE

Địa chỉ: Lô B3-1, góc đường D4-N1, khu công nghiệp Hựu Thạnh, Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An