

ĐẠI TRÀNG NANG **Bà Giăng**

CÁC DẤU HIỆU CẦN LƯU Ý VÀ KHUYẾN CÁO KHI DÙNG THUỐC

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ. Không dùng quá liều chỉ định. Không sử dụng thuốc đã quá hạn dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nang cứng chứa:

Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>) ..	80,0 mg	Trần bì (<i>Pericarpium Citri reticulatae perenne</i>)	53,6 mg
Mộc hương (<i>Radix Saussurea lappae</i>)	27,2 mg	Sa nhân (<i>Fructus Amoni</i>)	27,2 mg
Hoàng liên (<i>Rhizoma Coptidis</i>)	13,6 mg	Mạch nha (<i>Fructus Hordei germinatus</i>)...	27,2 mg
Cam thảo (<i>Radix et Rhizoma Glycyrrhizae</i>)	16,0 mg	Sơn tra (<i>Fructus Mali</i>)	27,2 mg
Bạch linh (<i>Poria</i>)	53,6 mg	Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>) ...	27,2 mg
Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis</i>)	27,2 mg	Nhục đậu khấu (<i>Semen Myristicae</i>)	53,6 mg
Thần khúc (<i>Massa Medicata fermentata</i>)	27,2 mg		

Tá dược:

tinh bột sắn, magnesium stearate, vỏ nang cứng cỡ số 0 màu nâu – đỏ vừa đủ 1 viên.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng.

Mô tả: Viên nang cứng, nắp nang và thân nang có màu nâu – đỏ, bên trong chứa bột thuốc màu nâu, có mùi thơm dược liệu.

TÁC DỤNG, CHỈ ĐỊNH

TÁC DỤNG: Kịen tỳ hóa thấp, hành khí chỉ thống, tiêu thực đạo trệ.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị viêm đại tràng co thắt, hội chứng ruột kích thích thuộc thể tỳ hư thấp trệ với triệu chứng đau bụng kèm theo đi ngoài phân lỏng nhiều lần trong ngày, đặc biệt sau khi ăn đồ ăn nhiều đạm, dầu mỡ, uống rượu bia.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG

LIỀU DÙNG:

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Mỗi lần từ 3 - 4 viên, ngày uống 3 lần.
- Trẻ em 6 - 12 tuổi: Mỗi lần 1 đến 3 viên, ngày uống 3 lần.

Có thể hiệu chỉnh liều theo hướng dẫn của bác sĩ.

CÁCH DÙNG: Uống trước khi ăn 15-30 phút.

KIÊNG: Các chất cay, nóng, tanh, nhiều mỡ.

Đơn vị sản xuất thành phẩm:

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC YHCT BÀ GIĂNG
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM BAGIACO -
CHI NHÁNH HÀ NAM

Khu Công Nghiệp Thanh Liêm, X. Thanh Phong,
H. Thanh Liêm, T. Hà Nam.

Đơn vị sản xuất vị thuốc:

CƠ SỞ SẢN XUẤT VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN GMP BÀ GIĂNG
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM BAGIACO -
CHI NHÁNH THANH HOÁ

Lô C4 -1, Khu công nghiệp Hoàng Long,
P. Tào Xuyên, Tp. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú, trẻ em dưới 6 tuổi, người có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

Thận trọng ở người suy gan, thận.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không dùng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ VỚI THUỐC:

Chưa có báo cáo gây tương tác với các thuốc khác. Kiêng các chất cay, nóng, tanh, nhiều mỡ trong thời gian dùng thuốc.

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Tham khảo ý kiến bác sĩ và tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời trong trường hợp có triệu chứng đặc biệt do uống thuốc quá liều.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp x 1 lọ 50/60/100/150/200 viên nang cứng

Hộp 3/5/6/10/15/20 vỉ Alu/Alu x 10 viên nang cứng

Hộp 3/5/6/10/15/20 vỉ Alu/PVC x 10 viên nang cứng

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn cơ sở.