

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

DẦU XOA NGOÀI DA

DẦU KHUYNH DIỆP A.T

“Thuốc dùng ngoài”

“Để xa tầm tay trẻ em”

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”

THÀNH PHẦN

Hoạt chất: Eucalyptol 82,92% (kl/tt)

Tá dược: Chlorophyll 15%, hương Aloe vera, paraffin lỏng vừa đủ.

DẠNG BẢO CHẾ: Dầu xoa ngoài da.

Mô tả sản phẩm: Dung dịch trong, màu xanh lục, mùi thơm của tinh dầu.

CHỈ ĐỊNH

Phòng, trị cảm cúm, sổ mũi, nghẹt mũi, ho tức ngực, đau bụng, nhức mỏi, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, côn trùng đốt, bong gân, sưng.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Xoa bóp ngoài da tại chỗ đau.

Cảm cúm, sổ mũi, nghẹt mũi: Xoa dầu hai bên thái dương, cổ, sau gáy, mũi.

Nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn: Xoa dầu hai bên thái dương, cổ, nhân trung, mũi.

Ho tức ngực: Xoa dầu trước vùng ngực, cổ và sau lưng.

Ăn không tiêu, đau bụng: Xoa dầu vùng bụng.

Trường hợp cảm cúm, người lớn có thể xông: cho 5-10 giọt dầu vào bình xông có khoảng 250 ml nước nóng.

Hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân mẫn cảm với eucalyptol hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Trẻ em có tiền sử động kinh hay co giật do sốt cao.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Không xoa lên da mặt, thóp, mũi trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Không bôi lên mắt, niêm mạc, vết thương hở. Không được uống.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai và cho con bú, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

Tương tác thuốc: Chưa có thông tin về tương tác thuốc.

Tương kỵ: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.



TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Chưa ghi nhận báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Cách xử trí: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 1 chai 1,5 ml.	Hộp lớn chứa 10 hộp 1 chai 1,5 ml.
Hộp 1 chai 5 ml.	Hộp lớn chứa 10 hộp 1 chai 5 ml.
Hộp 1 chai 10 ml.	Hộp lớn chứa 10 hộp 1 chai 10 ml.
Hộp 1 chai 15 ml.	Hộp lớn chứa 10 hộp 1 chai 15 ml.
Hộp 1 chai 25 ml.	Hộp lớn chứa 10 hộp 1 chai 25 ml.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Cơ sở sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN

Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

Giám đốc Nhà Máy 

DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo