

DI-SAMINExtra

Thành phần/Composition: Mỗi viên nang chứa/Each capsule contains:

Glucosamin sulfat250mg

Natri chondroitin sulfat 50mg

Tà dược vd/Excipients q.s.f1viên/1 capsule

Chỉ định, Chống chỉ định, Cách dùng - Liều dùng/ Indications,

Contraindications, Dosage - Administration: Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp/ See the package insert inside.

Sản xuất bởi/ Manufactured by:

CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY/ HATAY PHARMACEUTICAL J.S.C (HATAPHAR)

La Khê - Hà Đông - T.P Hà Nội/ La Khe - Ha Dong - Ha Noi City

Hộp 9 vỉ x 10 viên nang

DI-SAMINExtra

Glucosamin sulfat 250mg

Natri chondroitin sulfat 50mg



HATAPHAR - GMP - WHO

DI-SAMINExtra

Bảo quản/Storage: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C./ Store in a dry place, below 30°C.

Tiêu chuẩn/Specifications: TCCS/Manufacturer's.

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng/

Keep out of reach of children.

Carefully read the accompanying instructions before use.

SDK (Reg.No):

Số lô SX (Lot.No):

Ngày SX (Mfg Date):

HD (Exp. Date):



HATAPHAR - GMP - WHO

DI-SAMINExtra

Box of 9 blisters of 10 capsules

DI-SAMINExtra

Glucosamin sulfat 250mg
Natri chondroitin sulfat 50mg

DI-SAMINExtra

Glucosamin sulfat 250mg
Natri chondroitin sulfat 50mg
SDK (Reg.No):

GMP-WHO

DI-SAMINExtra

Glucosamin sulfat 250mg
Natri chondroitin sulfat 50mg
SDK (Reg.No):

GMP-WHO

DI-SAMINExtra

Glucosamin sulfat 250mg
Natri chondroitin sulfat 50mg

SX tại: C.T.C.P.D.P HÀ TÂY
HATAPHAR

Glucosamin sulfat 250mg
Natri chondroitin sulfat 50mg
SDK (Reg.No):

DI-SAMINExtra

Glucosamin sulfat 250mg
Natri chondroitin sulfat 50mg
SDK (Reg.No):

GMP-WHO

DI-SAMINExtra

Glucosamin sulfat 250mg
Natri chondroitin sulfat 50mg
SDK (Reg.No):

GMP-WHO

DI-SAMINExtra

Glucosamin sulfat 250mg
Natri chondroitin sulfat 50mg

Manufactured by: HATAY
PHARMACEUTICAL J.S.C (HATAPHAR)

Glucosamin sulfat 250mg
Natri chondroitin sulfat 50mg
SDK (Reg.No):

DI-SAMINExtra

Glucosamin sulfat 250mg
Natri chondroitin sulfat 50mg
SDK (Reg.No):

GMP-WHO

DI-SAMINExtra

Glucosamin sulfat 250mg
Natri chondroitin sulfat 50mg
SDK (Reg.No):

GMP-WHO

HD:



DI-SAMINEXTRA

- **Dạng thuốc:** Viên nang.
- **Qui cách đóng gói:** Hộp 9 vỉ x 10 viên.
- **Thành phần:** Mỗi viên nang chứa:

Glucosamin sulfat natri clorid tương ứng với:

Glucosamin sulfat 250mg

Natri chondroitin sulfat 50mg

Tá dược vđ 1 viên

Tá dược gồm: (Lactose, avicel, bột talc, povidon, magnesi stearat)

- **Chỉ định:** Giảm triệu chứng của viêm khớp gối nhẹ và trung bình.
- **Cách dùng và liều dùng:** Dùng cho người trên 18 tuổi: Uống 2 viên/lần x 3 lần/ngày. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.
- **Chống chỉ định:** Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.
- **Thận trọng:** Cần theo dõi xét nghiệm nước tiểu, máu, chức năng gan định kỳ khi dùng thuốc lâu dài. Thuốc điều trị nguyên nhân nên có thể tác dụng của thuốc sau 1 tuần, vì vậy nếu đau nhiều có thể dùng thuốc giảm đau, chống viêm trong những ngày đầu. Bệnh nhân tiểu đường nên theo sự hướng dẫn của bác sĩ khi dùng thuốc hàng ngày.
- **Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Không dùng
- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Hiếm gặp, nhìn chung nhẹ: Đau hơi, tiêu chảy hoặc buồn nôn. Khi thấy các hiện tượng khác lạ phải ngừng thuốc sử dụng.
- **Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:** Khi dùng chung với Heparin có khả năng làm tăng nguy cơ chảy máu.
- **Quá liều và cách xử trí:** Chưa có báo cáo.
- **Hạn dùng:** 36 tháng tính từ ngày sản xuất. **Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.**
- * **Lưu ý:** Khi thấy nang thuốc bị ẩm mốc, nang thuốc bị rách, móp méo, bột thuốc chuyển màu, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.
- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
- **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"

THUỐC SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

L a Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

ĐT: 04.33522203 - 33516101.

FAX: 04.33522203

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



PHÓ GIÁM ĐỐC

ĐS. Nguyễn Bá Lai

TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN (PIL)

- Tên sản phẩm:** DI-SAMINEXTRA
- Mô tả sản phẩm:** Viên nang cứng, một đầu trắng ngà, một đầu đỏ, bột thuốc bên trong khô tơi, màu trắng ngà.
- Thành phần của thuốc:** Glucosamin sulfat, Natri chondroitin sulfat.
- Hàm lượng của thuốc:** Mỗi viên nang chứa:
Glucosamin sulfat natri clorid tương ứng với:
Glucosamin sulfat 250mg
Natri chondroitin sulfat 50mg
Tá dược vđ 1 viên
- Thuốc dùng cho bệnh gì ?** Giảm triệu chứng của viêm khớp gối nhẹ và trung bình.
- Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?**
Dùng cho người trên 18 tuổi: Uống 2 viên/lần x 3 lần/ngày.
Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.
- Khi nào không nên dùng thuốc này?** Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.
- Tác dụng không mong muốn:**
Hiếm gặp, nhìn chung nhẹ: Đau hơi, tiêu chảy hoặc buồn nôn. Khi thấy các hiện tượng khác lạ phải ngừng thuốc sử dụng.
- Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?:**
Khi dùng chung với Heparin có khả năng làm tăng nguy cơ chảy máu.
- Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?** Nên tiếp tục uống thuốc theo liều lượng đã hướng dẫn trong tờ thông tin cho bệnh nhân.
- Cần bảo quản thuốc này như thế nào?** Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
- Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều?** Chưa có báo cáo.
- Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo?** Chưa có báo cáo.
- Tên của nhà sản xuất và chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:** CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY.
- Những điều cần trọng khi dùng thuốc này:** Cần theo dõi xét nghiệm nước tiểu, máu, chức năng gan định kỳ khi dùng thuốc lâu dài. Thuốc điều trị nguyên nhân nên có thể tác dụng của thuốc sau 1 tuần, vì vậy nếu đau nhiều có thể dùng thuốc giảm đau, chống viêm trong những ngày đầu.
Bệnh nhân tiểu đường nên theo sự hướng dẫn của bác sĩ khi dùng thuốc hàng ngày.
- Khi nào cần tham vấn bác sĩ:**
 - Khi cần thêm thông tin về thuốc.
 - Khi thấy những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
 - Khi dùng thuốc mà thấy triệu chứng của bệnh không thuyên giảm.
- Ngày xem xét sửa đổi lại tờ thông tin cho bệnh nhân:** 23/07/2011

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



PHÓ GIÁM ĐỐC