




MẪU VÍ ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU

- Mẫu nhãn ví chứa 10 viên nén bao phim
(SLSX, HD được dập nổi trên ví)



Ngày 02 Tháng 03 Năm 2024

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

MẪU HỘP ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU

- Mẫu nhãn hộp chứa 2 vì

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

VIÊN NÉN BAO PHIM
 Hộp 2 vỉ x 10 viên

AT
 AN THIEN PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Tiêu chuẩn: TCCS

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SĐK:

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
 Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, Tp.HCM

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

FILM - COATED TABLET
 Box of 2 blisters
 x 10 tablets

AT
 AN THIEN PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
 314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City

GMP - WHO

Rx PRESCRIPTION DRUG

AT
 AN THIEN PHARMA

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

AT
 AN THIEN PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
 314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City

Tiêu chuẩn: TCCS

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SĐK:

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
 Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, Tp.HCM

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

FILM - COATED TABLET
 Box of 2 blisters
 x 10 tablets

AT
 AN THIEN PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
 314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City

GMP - WHO

Rx PRESCRIPTION DRUG

AT
 AN THIEN PHARMA

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

AT
 AN THIEN PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
 314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City

Tiêu chuẩn: TCCS

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SĐK:

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
 Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, Tp.HCM

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

FILM - COATED TABLET
 Box of 2 blisters
 x 10 tablets

AT
 AN THIEN PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
 314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City

GMP - WHO

Rx PRESCRIPTION DRUG

AT
 AN THIEN PHARMA

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

AT
 AN THIEN PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
 314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City

Tiêu chuẩn: TCCS

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SĐK:

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
 Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, Tp.HCM

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

FILM - COATED TABLET
 Box of 2 blisters
 x 10 tablets

AT
 AN THIEN PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
 314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City

GMP - WHO

Rx PRESCRIPTION DRUG

AT
 AN THIEN PHARMA

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

AT
 AN THIEN PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
 314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City

Tiêu chuẩn: TCCS

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SĐK:

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
 Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, Tp.HCM

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

FILM - COATED TABLET
 Box of 2 blisters
 x 10 tablets

AT
 AN THIEN PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
 314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City

GMP - WHO

Rx PRESCRIPTION DRUG

AT
 AN THIEN PHARMA

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

AT
 AN THIEN PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
 314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City

Tiêu chuẩn: TCCS

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SĐK:

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
 Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, Tp.HCM

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

FILM - COATED TABLET
 Box of 2 blisters
 x 10 tablets

AT
 AN THIEN PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
 314 Bông

Ngày 02 Tháng 03 Năm 2024

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

MẪU HỘP ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU

- Mẫu nhãn hộp chứa 3 vì

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

VIÊN NÉN BAO PHIM
Hộp 3 vỉ x 10 viên

AT
AN THIEN PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Tiêu chuẩn: TCCS

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SĐK:

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, Tp.HCM

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

FILM - COATED TABLET
Box of 3 blisters
x 10 tablets

AT
AN THIEN PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City

GMP - WHO

PRESCRIPTION DRUG

AT
AN THIEN PHARMA

Ngày 02 Tháng 03 Năm 2024

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo



MẪU HỘP ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU

- Mẫu nhãn hộp chứa 5 vì

	GMP - WHO Rx THUỐC KÊ ĐƠN DIOMEDES 600 Diosmin 600 mg VIÊN NÉN BAO PHIM Hộp 5 vỉ x 10 viên  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh	Rx DIOMEDES 600 Diosmin 600 mg
Tiêu chuẩn: TCCS SDK: ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM, ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. Số lô sản xuất: Ngày sản xuất: Hạn dùng: Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, Tp. HCM		
Rx DIOMEDES 600 Diosmin 600 mg	Rx PRESCRIPTION DRUG DIOMEDES 600 Diosmin FILM - COATED TABLET 600 mg Box of 5 blisters x 10 tablets  AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City GMP - WHO	
	Thành phần: Diosmin 600 mg Tà được vừa đủ 1 viên. Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.	

Ngày 02 Tháng 03 Năm 2024

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



ĐS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

MẪU HỘP ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU

- Mẫu nhãn hộp chứa 10 vỉ

Ngày 02 Tháng 03 Năm 2024

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



ĐS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.
TRƯỚC KHI DÙNG.

Cơ sở sản xuất
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước,
Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh



GMP - WHO

Rx PRESCRIPTION DRUG

DIOMEDES 600

Diosmin

600 mg

FILM - COATED TABLET

Box of 10 blisters x 10 tablets



AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION
114 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City

Thành phần:

Diosmin 600 mg

Tá được vừa đủ 1 viên.

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Số lô sản xuất:

Ngày sản xuất:

Hạn dùng:

GMP - WHO

RX THUỐC KÉ ĐƠN

DIOMEDES 600

Diosmin

600 mg

VIÊN NÉN BAO PHIM

Hộp 10 vỉ x 10 viên



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

- 1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 chai 30 viên nén bao phim
- 2 - Mẫu nhãn chai 30 viên nén bao phim

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

THUỐC KẼ ĐƠN

CHIAI - JBO

Thành phần:
Diosmin 600 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên.

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chỉ tiết khác: Xem trên tờ HDSĐ kèm theo.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

VIÊN NÉN BAO PHIM
Chai 30 viên

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.

Số lô SX:
Hạn dùng:

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước,
Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

VIÊN NÉN BAO PHIM
Hộp 1 chai 30 viên

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần:
Diosmin 600 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên.

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chỉ tiết khác: Xem trên tờ HDSĐ kèm theo.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Số lô sản xuất:
Ngày sản xuất:
Hạn dùng:

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

FILM - COATED TABLET
Box of 1 bottle 30 tablets

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước,
Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

Barcode

Ngày 02 Tháng 03 Năm 2024
GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
AN THIÊN
QUẬN 8, TP. HỒ CHÍ MINH
DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

- 1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 chai 60 viên nén bao phim
- 2 - Mẫu nhãn chai 60 viên nén bao phim

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

THUỐC KÊ ĐƠN

GMP - WHO

Thành phần:
Diosmin 600 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên.

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

VIÊN NÉN BAO PHIM
Chai 60 viên

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.

Số lô SX:
Hạn dùng:

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước,
Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

THUỐC KÊ ĐƠN

GMP - WHO

Thành phần:
Diosmin 600 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên.

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

VIÊN NÉN BAO PHIM
Hộp 1 chai 60 viên

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.

Số lô sản xuất:
Ngày sản xuất:
Hạn dùng:

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước,
Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

PRESCRIPTION DRUG

GMP - WHO

Thành phần:
Diosmin 600 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên.

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

FILM - COATED TABLET
Box of 1 bottle 60 tablets

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
314 Bông Sao Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh City

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước,
Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

Ngày 02 Tháng 03 Năm 2024
GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
QUẬN 8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

MẪU NHÃN, HỘP ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU

- 1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 chai 100 viên nén bao phim
- 2 - Mẫu nhãn chai 100 viên nén bao phim

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

THUỐC KÊ ĐƠN

GMP - WHO

Thành phần:
Diosmin 600 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên.

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chỉ tiết khác: Xem trên tờ HDSĐ kèm theo.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

VIÊN NÉN BAO PHIM
Chai 100 viên

GMP - WHO

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.

Số lô SX:
Hạn dùng:

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước,
Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

THUỐC KÊ ĐƠN

GMP - WHO

Thành phần:
Diosmin 600 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên.

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chỉ tiết khác: Xem trên tờ HDSĐ kèm theo.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

VIÊN NÉN BAO PHIM
Hộp 1 chai 100 viên

GMP - WHO

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.

Số lô sản xuất:
Ngày sản xuất:
Hạn dùng:

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước,
Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

PRESCRIPTION DRUG

GMP - WHO

Thành phần:
Diosmin 600 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên.

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và cách dùng - Thận trọng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin chỉ tiết khác: Xem trên tờ HDSĐ kèm theo.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

DIOMEDES 600
Diosmin
600 mg

FILM - COATED TABLET
Box of 1 bottle 100 tablets

GMP - WHO

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.

Số lô sản xuất:
Ngày sản xuất:
Hạn dùng:

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN
Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước,
Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

Ngày 02 Tháng 03 Năm 2024
GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY



DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC



VIÊN NÉN BAO PHIM

DIOMEDES 600

"Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc"

"Để xa tầm tay trẻ em"

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng"

THÀNH PHẦN

Hoạt chất: Diosmin 600 mg

Tá dược: Vừa đủ 1 viên.

(Microcrystalline cellulose 102, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, HPMC E15, PEG 6000, talc, titanium dioxide, iron oxide red, erythrosin lake).

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao phim.

Mô tả sản phẩm: Viên nén oval, bao phim màu hồng, một mặt có vạch chia, một mặt có logo chữ AT, cạnh và thành viên lành lặn.

CHỈ ĐỊNH

- Cải thiện các triệu chứng liên quan đến suy tĩnh mạch bạch huyết như nặng ở chân, đau nhức chân, bứt rứt ở chân khi mới nằm.
- Điều trị hỗ trợ các rối loạn chức năng do mao mạch dễ vỡ.
- Điều trị các dấu hiệu chức năng có liên quan đến cơn trĩ cấp tính.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều dùng

Người lớn

Suy tĩnh mạch: 1 viên mỗi ngày, uống trước bữa ăn sáng.

Cơn trĩ cấp tính: 2 - 3 viên/ngày, uống trong bữa ăn.

Trẻ em: Tính an toàn và hiệu quả của diosmin ở trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi chưa được thiết lập.

Cách dùng: Dùng đường uống.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn với diosmin hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Trong điều trị cơn đau trĩ cấp tính: Cần phân biệt với các bệnh hậu môn vì thuốc không thể thay thế được các trị liệu chuyên biệt cho các bệnh hậu môn khác.

Nên điều trị trong một thời gian ngắn hạn.

Nếu các triệu chứng không được cải thiện nhanh chóng, cần tiến hành khám hậu môn và xem lại liệu pháp điều trị.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai

Không có hoặc có rất ít dữ liệu về việc sử dụng diosmin cho phụ nữ có thai. Các nghiên cứu được thực hiện trên động vật không cho thấy diosmin gây ra bất kỳ tác hại trực tiếp hoặc gián



tiếp nào đến khả năng sinh sản. Để phòng ngừa, tốt nhất là không nên dùng diosmin cho phụ nữ mang thai.

Phụ nữ cho con bú

Không biết liệu diosmin hoặc các chất chuyển hóa của nó có được bài tiết vào sữa mẹ hay không. Không thể loại trừ nguy cơ của thuốc đối với trẻ sơ sinh/nhũ nhi. Cần đưa ra quyết định nên ngừng cho con bú hay ngừng/tránh điều trị bằng diosmin, có tính đến lợi ích của thuốc đối với người mẹ và lợi ích của trẻ trong việc bú mẹ.

Khả năng sinh sản

Các nghiên cứu không cho thấy bất kỳ ảnh hưởng nào đến khả năng sinh sản của chuột đực và chuột cái.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không có nghiên cứu cụ thể nào được thực hiện về tác động của diosmin lên khả năng lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên, xem xét về mức độ an toàn tổng thể thì diosmin không có hoặc không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

Tương tác thuốc: Cho đến nay, không có tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng nào được báo cáo với diosmin.

Tương kỵ: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC (ADR)

Các tác dụng không mong muốn sau đây được báo cáo với các tần suất tương ứng: *Rất thường gặp* ($ADR \geq 1/10$), *thường gặp* ($1/100 \leq ADR < 1/10$), *ít gặp* ($1/1.000 \leq ADR < 1/100$), *hiếm gặp* ($1/10.000 \leq ADR < 1/1.000$), *rất hiếm gặp* ($ADR < 1/10.000$).

Rối loạn hệ thống cơ quan	Tần suất	Tác dụng không mong muốn
Rối loạn tiêu hóa (Hiếm khi dẫn đến ngừng thuốc)	<i>Thường gặp</i>	Đau dạ dày.
	<i>Ít gặp</i>	Đầy hơi, tiêu chảy, khó tiêu, buồn nôn.
	<i>Hiếm gặp</i>	Nôn ói.
Rối loạn da và mô dưới da	<i>Ít gặp</i>	Phản ứng dị ứng như phát ban, ngứa, nổi mề đay, phù mạch.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc hoặc báo cáo các phản ứng có hại của thuốc về Trung tâm Quốc gia về Thông tin Thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Quá liều: Không có trường hợp quá liều nào liên quan đến tác dụng không mong muốn được báo cáo khi chỉ dùng diosmin.

Cách xử trí: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ

Dược lực học

Nhóm dược lý: Thuốc bảo vệ mạch máu/tác động trên mao mạch

Mã ATC: C05CA03

Cơ chế tác dụng

Thuốc trợ tĩnh mạch (tăng trương lực tĩnh mạch) và bảo vệ mạch máu, từ đó sẽ giúp co mạch, tăng sức bền và giảm tính thấm của mạch máu.

Tác dụng dược lý

Nhiều nghiên cứu dược lực học khác nhau đã được tiến hành để chứng minh những đặc tính của thuốc trên người sau đây:

❖ Tác dụng trợ mạch máu

- Tăng tác dụng co mạch của adrenalin, norepinephrin và serotonin trên các tĩnh mạch bề mặt của bàn tay hoặc trên tĩnh mạch hiển riêng biệt ở chân.
- Tăng trương lực tĩnh mạch, được chứng minh bằng cách đo trương lực tĩnh mạch bằng phép ghi biến đổi thể tích cho thấy làm giảm ứ trệ ở tĩnh mạch.
- Tác dụng co tĩnh mạch phụ thuộc vào liều dùng.
- Giảm áp lực trung bình cả ở hệ tĩnh mạch sâu và nông, được chứng minh bằng thử nghiệm mù đôi so với giả được dưới sự kiểm soát của siêu âm Doppler.
- Làm tăng huyết áp tâm thu và tâm trương trong trường hợp hạ huyết áp thể đứng sau phẫu thuật.
- Có tác dụng sau khi phẫu thuật tĩnh mạch hiển.

❖ Bảo vệ mạch máu

- Làm tăng sức bền của mao mạch phụ thuộc vào liều dùng.

Dược động học

Các nghiên cứu dược động học dùng diosmin được đánh dấu phóng xạ C^{14} ở động vật cho thấy:

Hấp thu: Sau khi uống, diosmin được vi khuẩn đường ruột chuyển hóa thành diosmetin. Diosmetin sau đó được hấp thu và tìm thấy trong máu dưới dạng glucuronid và sulfoconjugat. Diosmetin-3-glucuronid đã được chứng minh là một trong những chất chuyển hóa chính của diosmin.

Nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được từ 12 - 15 giờ sau khi uống diosmin.

Phân bố: Ở động vật, nghiên cứu dược động học của diosmin được đánh dấu bằng C^{14} cho thấy sự phân bố phóng xạ ưu tiên trong tĩnh mạch chủ và tĩnh mạch hiển.

Thải trừ: Ở động vật, diosmin trải qua chu trình gan - ruột và được thải trừ qua nước tiểu (79%), qua phân (11%) và qua mật (2,4%). Ở người, diosmetin-3-glucuronid được tìm thấy trong nước tiểu.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 2 vi, 3 vi, 5 vi, 10 vi x 10 viên.

Hộp 1 chai 30 viên, 60 viên, 100 viên.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Cơ sở sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN

Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2025

Giám Đốc Nhà Máy
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
AN THIÊN
QUẬN 8 - TP. HỒ CHÍ MINH

DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo