

THÀNH PHẦN

Mỗi viên nang mềm chứa:

- *Hoạt chất:*

Eucalyptol.....	100 mg
Tinh dầu tràm.....	50 mg
Menthol.....	0,5 mg
Tinh dầu tần.....	0,36 mg
Tinh dầu gừng.....	0,75 mg

- *Tá dược:* Dầu đậu nành, gelatin, glycerin, sorbitol lỏng, vanilin, methyl paraben, propyl paraben, đỗ ponceau vừa đủ 1 viên nang mềm.

ĐƯỢC LỰC HỌC

- *Eucalyptol:* có tính sát trùng, được dùng chữa ho, kích thích tiêu hóa. Eucalyptol được đào thải chủ yếu qua đường hô hấp.
- *Menthol:* là trích tinh của tinh dầu bạc hà, có tính chất làm dịu cơn ho, làm loãng niêm dịch. Uống liều nhỏ có thể gây hưng phấn, tăng bài tiết mồ hôi, làm hạ thân nhiệt. Sau khi hấp thu, menthol được bài tiết trong nước tiểu và mật dưới dạng glucuronide. Menthol thường được dùng trong cảm sốt, nhức đầu, sổ mũi, viêm họng, ho, kích thích tiêu hóa, tiêu chảy, đau bụng.
- *Gừng:* có tác dụng chống dị ứng, giảm co thắt cơ trơn. Tinh dầu gừng có tác dụng kháng khuẩn trên nhiều chủng vi khuẩn, làm loãng niêm dịch và giảm ho, chống viêm giảm đau. Gừng thường được sử dụng điều trị cảm mạo, làm ra mồ hôi, chữa ho, hen phế quản, viêm phế quản, sổ mũi, viêm họng, chống cảm lạnh. Gừng còn là một vị thuốc chữa đầy bụng, ăn không tiêu, nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng.
- *Tần dày lá (húng chanh):* một dược liệu chữa cảm cúm, ho hen. Tinh dầu tần có tác dụng kháng sinh mạnh đối với một số chủng vi khuẩn như *Staphylococcus*, *Salmonella typhi*, *Shigella*, *E. coli*, *Streptococcus*, *Pneumococcus*...

ĐƯỢC ĐỘNG HỌC

Chưa có báo cáo

CHỈ ĐỊNH

EUCATOL FORTE được chỉ định trong:

- Các chứng ho, đau họng, sổ mũi, cảm cúm.
- Sát trùng đường hô hấp.
- Làm loãng đàm, dịu cơn ho.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Cách dùng: EUCATOL FORTE được dùng uống.

Liều lượng thông thường :

- Người lớn: 1 viên/lần x 3 - 4 lần mỗi ngày.
- Trẻ em trên 2 tuổi: 1 viên/lần x 2 lần mỗi ngày, hoặc theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh nhân quá mẫn với một trong các thành phần của thuốc.
- Ho do suyễn, ho lao, suy hô hấp.
- Không sử dụng cho trẻ em dưới 2 tuổi.

THẬN TRỌNG

- Menthol có tính ức chế hô hấp qua đường thở (hít vào) nhất là đối với trẻ nhỏ. Vì vậy cần sử dụng thận trọng cho trẻ nhỏ.
- Cân thận trọng khi sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa có báo cáo.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Do chưa có dữ liệu nghiên cứu trên phụ nữ có thai và cho con bú nên cần sử dụng thật thận trọng cho những trường hợp này.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Khi uống một lượng lớn menthol có thể gây đau bụng dữ dội, buồn nôn, nôn, chóng mặt, buồn ngủ, hôn mê.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU

Chưa có báo cáo.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 25°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.

ĐÓNG GÓI: Hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm. Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm. Hộp 20 vỉ x 10 viên nang mềm.

TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

ĐÈ XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG****NÉU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ**

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BOSTON VIỆT NAM

Số 43, Đường số 8, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 06503 769 606 - Fax: 06503 769 601