

15/1/2021

MẪU NHÃN HỘP VÀ NHÃN CHAI SẢN PHẨM GARLIC OIL

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 9 / 9 / 15

BOTTLE 100 SORT CAPSULES



GARLIC OIL



MEDISUN

Công ty CP Dược Phẩm ME DI SUN
Số 521, An Lợi X, Hòa Lợi, H. Bến Cát, Bình Dương

CHAI 100 VIÊN NANG MỀM

GARLIC OIL

SDK: xxxxx

LIỀU DÙNG & CÁCH DÙNG:
- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 2 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi: 1 viên/lần x 2 lần/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

- Phụ nữ có thai 3 tháng đầu.
- Người trẻ nhiệt, hao máu, tiểu đường, tiểu nhạt, thiếu máu.

THẬN TRỌNG:
- Bệnh nhân cao huyết áp cần được kiểm tra huyết áp thường xuyên.

- Người loét dạ dày.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
Thuốc dung nạp tốt, rất hiếm gặp tác dụng phụ như buồn nôn, nhức đầu.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Có thể tăng nguy cơ bị xuất huyết khi sử dụng kết hợp với thuốc chống đông: warfarin, aspirin do tác dụng của tôi lên kết tập tiểu cầu fibrinogen.

BAO QUẢN:
Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, dưới 30°C.

Sản xuất theo : TCCS

GARLIC OIL

VISA: xxxxx

CÔNG THỨC:
Mỗi viên nang mềm chứa:
Garlic oil (Dầu tỏi): 4 mg
Tá dược: Dầu đậu nành, Gelatin, Sorbitol, Glycerin, Vanillin, Propyl paraben, Methyl paraben, Titan dioxide vừa đủ 1 viên nang mềm.

CHỈ ĐỊNH:

- Nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Phòng và hỗ trợ điều trị cảm cúm thông thường. Giảm chứng đau khớp. Cholesterol máu.
- Giảm Cholesterol trong máu, ngăn ngừa xơ vữa mạch, cao huyết áp.
- Dùng thường xuyên có tác dụng phòng ngừa ung thư.
- Giảm chướng bụng, đầy hơi, ăn uống khó tiêu.

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG**

GARLIC OIL



(GMP - WHO)

MEDISUN
Pharmaceutical Joint Stock Company
Số 521 An Lợi X, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương

Ngày SX:
Lô SX:

HD:

GARLIC OIL

CHAI 100 VIÊN NANG MỀM

(GMP - WHO)

CÔNG THỨC:
Mỗi viên nang mềm chứa:
Garlic oil (Dầu tỏi): 4 mg

CHỈ ĐỊNH:

- Nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Phòng và hỗ trợ điều trị cảm cúm thông thường. Giảm chứng đau khớp. Cholesterol máu.
- Giảm Cholesterol trong máu, ngăn ngừa xơ vữa mạch, cao huyết áp.
- Dùng thường xuyên có tác dụng phòng ngừa ung thư.
- Giảm chướng bụng, đầy hơi, ăn uống khó tiêu.

Ngày SX:
Lô SX:

HD:

LIỀU DÙNG & CÁCH DÙNG:
- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 2 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi: 1 viên/lần x 2 lần/ngày.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC THUỐC:
Xin đọc kỹ trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
BAO QUẢN:
Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, dưới 30°C

SDK: xxxxx

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG**

Công ty CP Dược Phẩm ME DI SUN
Số 521, An Lợi X, Hòa Lợi, H. Bến Cát, Bình Dương
ĐT: (0650) 3588 096 - FAX: (0650) 3589 287

MEDISUN

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin tham khảo ý kiến bác sĩ

Dạng bào chế: viên nang mềm



GARLIC OIL

Trình bày: Hộp 1 Chai x 100 viên nang mềm

Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa:

- Tinh dầu tỏi (*Oleum Bulbus Allii sativi*): 4 mg
- Tá dược : Dầu đậu nành, Gelatin, Sorbitol , Glycerin, Vanilin, Propyl paraben, Methyl paraben, Titan dioxyd vđ 1 viên nang mềm.

Tính chất:

- Garlic oil (dầu tỏi) có thành phần chủ yếu là chất kháng sinh allicin, một hợp chất sulfur có tác dụng diệt khuẩn rất mạnh đối với vi khuẩn *Staphylococcus*, thương hàn, phó thương hàn, lỵ, vi trùng tả, trực khuẩn sinh bệnh bạch hầu... Đặc biệt allicin có tác dụng diệt virus rất tốt, nhất là các chủng virus cúm.
- Dầu tỏi dùng rất hiệu quả trong các bệnh về tuần hoàn máu như về bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch, cao huyết áp, đột quỵ và cholesterol cao.
- Dầu tỏi còn có tác dụng điều hòa lượng đường trong máu ở bệnh nhân bị tiểu đường và hiệu quả trong các bệnh về gan. Các rối loạn khác về tiêu hóa và đường ruột như viêm dạ dày, khó tiêu, viêm đại tràng mạn tính, tiêu chảy, và bệnh lỵ giảm hẳn khi dùng tỏi.

Chỉ định:

- Nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị cảm cúm thông thường. Giảm chứng đau khớp. Chống lão hóa.
- Giảm Cholesterol trong máu, ngăn ngừa xơ vữa mạch, cao huyết áp.
- Dùng thường xuyên có tác dụng phòng ngừa ung thư.
- Giảm chướng bụng, đầy hơi, ăn uống khó tiêu.

Liều dùng và cách dùng:

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 2 viên/lần x 2 lần/ngày.
 - Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi: 1 viên/lần x 2 lần/ngày.
- Trẻ em dưới 6 tuổi theo hướng dẫn bác sĩ.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai 3 tháng đầu.
- Người thể nhiệt, háo khát, tiểu đường, tiểu nhạt, thiếu máu.

Thận trọng :

- Bệnh nhân cao huyết áp cần được kiểm tra huyết áp thường xuyên.
- Người loét dạ dày.

Tương tác thuốc :

Có thể tăng nguy cơ bị xuất huyết khi sử dụng kết hợp với thuốc chống đông warfarin, aspirin do tác dụng của tời lên kết tập tiểu cầu fibrinogen.

Phụ nữ có thai và cho con bú:

Phụ nữ có thai và cho con bú cần tham khảo ý kiến của thầy thuốc trước khi dùng, tránh dùng thuốc trong 3 tháng đầu của thai kỳ.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn:

Thuốc dung nạp tốt, rất hiếm gặp tác dụng phụ như buồn nôn, nhức đầu.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và xử trí :

Triệu chứng quá liều chưa được ghi nhận. Trong trường hợp dùng thuốc quá liều, cần thông báo với bác sĩ ngay để được xử lý thích hợp.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.

Tiêu chuẩn: TCCS số 0650-B-006-08

Logo công ty: 

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Phẩm ME DI SUN

Địa chỉ: 521 An Lợi, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương.

Điện thoại: 0650 3589 036 – Fax: 0650 3589 297



TU QU CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy

Bình Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2015
Giám Đốc công ty



DS. Lê Minh Hoàn