


60/85



Glucosamine & Chondroitin Tablets

GINFUL

Each film coated tablet contains:

Glucosamine Sulphate 750 mg.
Chondroitin Sulphate 400 mg.

Dosage/ Indications/ Contraindication/
Administration/ Precaution/ Side effect/
Warning: See the leaflet.

Store in tight container, protect from moisture,
temperature below 30°C.

Keep out of reach of children.
Read the leaflet before use.

Batch No. / Lô SX.:

Mfg. Date / NSX.:

Exp. Date / HD.:

V.N. Visa No.:

Manufactured by:
M/s Prayash Healthcare Pvt. Ltd.,
185-186, Yellampet, Medchal Mandal,
Ranga Reddy-District, A.P., India.

GINFUL GINFUL GINFUL GINFUL GINFUL



Handwritten text and markings on the right edge of the box, including a red mark at the top and some illegible characters.

Tờ hướng dẫn sử dụng

GINFUL

Glucosamin và Chondroitin

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ, dược sỹ.

Tên thuốc GINFUL

Thành phần Mỗi viên chứa:

Dược chất:

Glucosamin sulfat (dưới dạng glucosamin sulfat kali clorid)	750mg
Tương đương 588.8mg Glucosamin	
Chondroitin sulfat (dưới dạng chondroitin sulfat natri)	400 mg

Tá dược: Cellulose vi tinh thể, natri starch glycolat, povidon K-30, magnesi stearat, hypromellose, polyethylen glycol 6000, titan dioxit, red oxid of iron, carmoisin lake.

Dạng bào chế Viên nén bao phim.

Quy cách đóng gói 10 vi x 10 viên /hộp.

Đặc tính dược lực học

Chondroitin sulfat: Cơ chế tác dụng của chondroitin sulfat trong việc làm giảm bệnh lý xương khớp là bảo vệ khớp bằng cách ức chế các enzym có vai trò phá hủy sụn và kích thích tăng hoạt tính các enzym có vai trò xúc tác phản ứng tổng hợp acid hyaluronic (là chất giúp khớp hoạt động tốt).

Glucosamin sulfat: Kích thích sản xuất collagen, thành phần protein của các cấu trúc sợi chằng khớp. Glucosamin sulfat đồng thời ức chế các enzym phá hủy sụn khớp như collagenase, phospholipase A2 và giảm các gốc tự do superoxide phá hủy các tế bào sụn. Glucosamin làm tăng sản xuất chất nhầy dịch khớp nên tăng độ nhớt, tăng khả năng bôi trơn của dịch khớp. Vì thế glucosamin không những giảm triệu chứng của thoái khớp (đau, khó vận động) mà còn ngăn chặn quá trình thoái hóa khớp, ngăn chặn bệnh tiến triển.

Dược động học

- Chondroitin hấp thu qua đường uống khoảng 30%, kết hợp với mô giàu glycosaminoglycan như sụn khớp. Trong một nghiên cứu lâm sàng trên những bệnh nhân bị viêm xương khớp cho thấy chondroitin khởi phát tác dụng chậm hơn diclofenac nhưng kéo dài hơn. Chondroitin đào thải chủ yếu qua thận. Thời gian bán thải của thuốc khi dùng đường uống khoảng 5%.
- Glucosamin: Sinh khả dụng của glucosamin khoảng 26% sau khi chuyển hóa lần đầu qua gan. Gan, thận, sụn khớp là những nơi tập trung glucosamin cao nhất. Ngoài con đường chuyển hóa qua gan, glucosamin còn chuyển hóa thành CO₂ và bài tiết qua đường hô hấp. Một phần glucosamin không chuyển hóa qua gan hay không kết hợp với protein huyết tương đào thải chủ yếu qua nước tiểu; Glucosamin được tìm thấy trong phân xem như là phần không hấp thu.

Chỉ định

Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

Liều lượng và cách dùng

Dùng cho người trên 18 tuổi:

Uống 1 viên/ lần x 2 lần/ngày.

Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

Chống chỉ định

- Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

Thận trọng

- Những bệnh nhân sử dụng glucosamin trong thời gian dài nên kiểm tra mức đường huyết.
- Bệnh nhân bị tiểu đường nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng glucosamin và nên theo dõi đường huyết khi quyết định dùng glucosamin.
- Những bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc.
- Nên dùng thuốc từ liều thấp nhất có tác dụng.

Tác dụng phụ

- Có thể xuất hiện những phản ứng phụ nhẹ trên hệ tiêu hóa như buồn nôn, tiêu chảy...
- Một số bệnh nhân có thể bị phát ban, mệt mỏi và nhức đầu nhẹ.
- Bệnh nhân bị loét tiêu hóa và những người có dùng kèm thuốc lợi tiểu thường xuất hiện tác dụng phụ nhiều hơn.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ khi gặp phải các tác dụng phụ của thuốc.

Tương tác thuốc

- Glucosamin và chondroitin: Thận trọng khi phối hợp với các thuốc sau vì có thể dẫn đến tăng tác dụng của các thuốc đi kèm.
 - NSAIDs: Glucosamin và chondroitin làm tăng tác dụng chống viêm của các thuốc này (như ibuprofen).
 - Thuốc hạ đường huyết hoặc insulin: Glucosamin và chondroitin làm giảm sinh sản insulin, làm giảm đáp ứng receptor với insulin dẫn đến tăng đường huyết. Vì vậy cần cẩn trọng đối với bệnh nhân bị tiểu đường, đang dùng thuốc hạ đường huyết hoặc điều trị với insulin.
 - Thuốc chống đông, hủy tiểu cầu: Glucosamin và chondroitin làm tăng tác dụng của các thuốc này, làm tăng nguy cơ chảy máu ở những bệnh nhân đang dùng chúng.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Không sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và phụ nữ đang cho con bú.

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

Không ảnh hưởng.

Quá liều

Glucosamin: Quá liều glucosamin có thể gây ảnh hưởng đến dạ dày, gây ỉa chảy, lỏng phân, đau bụng và đường huyết tăng cao.

Chưa có các dữ liệu khi quá liều chondroitin.

Bảo quản Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, ở nhiệt độ dưới 30°C.



Hạn dùng 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỀ THUỐC TRÁNH XA TÂM TAY TRẺ EM.

Nhà sản xuất

M/s Prayash healthcare Pvt.Ltd.

185-186, Yellampet, Medchal Mandal, Ranga Reddy-District, A.P, Ấn Độ.



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

