

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 09/09/2015

NHÃN VỈ GLUCOSAMIN 500 GLOMED

Kích thước:

Cao : 100 mm

Dài : 70 mm



Ngày 23 tháng 04 năm 2014

P. Tổng Giám Đốc



Trang Văn Ty

NHÃN HỘP GLUCOSAMIN 500 GLOMED

(Hộp 20 vỉ x 10 viên)

Dài: 120 mm

Cao: 80 mm

GLUCOSAMIN 500

GLOMED®

Mỗi viên nang cứng chứa: Glucosamin 500 mg (dưới dạng Glucosamin sulfat kali clorid)
Each capsule contains Glucosamine 500 mg (as Glucosamine sulfate potassium chloride)
Chỉ định, liều lượng, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác về sản phẩm:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng.
*Indications, dosage, administration, contraindications and other information:
Please refer to the package insert.*
Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30 °C.
Storage: Store at the temperature not more than 30°C, in a dry place, protect from light.
Để xa tầm tay trẻ em. *Keep out of reach of children.*
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. *Read carefully the leaflet before use.*
Tiêu chuẩn: TCCS *Specification: Manufacturer's*
SĐK / REG. No.: **Hộp 20 vỉ x 10 viên nang cứng**
Thuốc dùng cho Bệnh viện *Box of 20 blisters of 10 capsules*



Sản xuất bởi / *Manufactured by:*
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED
GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY, Inc.
35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương

Số lô SX / Batch No.:
NSX / Mfg. Date:
HD / Exp. Date:

Ngày 13 tháng 04 năm 2014


P. Tổng Giám Đốc



Trang Văn Tỷ

NHÃN HỘP GLUCOSAMIN 500 GLOMED (Hộp 10 vỉ x 10 viên)

Kích thước:
Dài : 90 mm
Rộng: 73 mm
Cao : 103 mm



Ngày 23 tháng 04 năm 2014
P. Tổng Giám Đốc

Trang Văn Tỷ

Số lô SX / Batch No.:
NSX / Mfg. Date :
HD / Exp. Date :

NHÃN CHAI GLUCOSAMIN 500 GLOMED

Kích thước:
Dài : 170 mm
Cao : 70 mm

COMPOSITION:
Each capsule contains: Glucosamine 500 mg
(as Glucosamine sulfate potassium chloride)

**INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION,
CONTRAINDICATIONS AND OTHER
INFORMATION:**
Please refer to the package insert.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE.**

STORAGE:
Store at the temperature not more than 30°C,
in a dry place, protect from light.

SPECIFICATION: Manufacturer's.
REG. NO.:

Số lô SX/ Batch No.:
NSX / Mfg. Date :
HD / Exp Date :



GLUCOSAMIN 500
GLOMED®

Chai 100 viên nang cứng
Bottle 100 capsules

THÀNH PHẦN:
Mỗi viên nang cứng chứa: Glucosamin 500 mg
(dưới dạng Glucosamin sulfate kali clorid)

**CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG,
CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC
VỀ SẢN PHẨM:** Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM, ĐỌC KỸ HƯỚNG
DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng,
nhiệt độ không quá 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS
SĐK:

Sản xuất bởi / Manufactured by:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED
35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore,
Thuận An, Bình Dương.



Ngày 23 tháng 04 năm 2014
P. Tổng Giám Đốc

Trương Văn Quý

GLUCOSAMIN 500 GLOMED

Glucosamin

Viên nang cứng

1- Thành phần

Mỗi viên nang cứng chứa:

Hoạt chất: Glucosamin 500 mg (*dưới dạng glucosamin sulfat kali clorid*).

Tá dược: Tinh bột ngô, lactose monohydrat, talc, magnesi stearat.

2- Cơ chế tác động

Glucosamin là một thành phần tự nhiên được tìm thấy trong chitin, mucoprotein và các mucopolysaccharid. Glucosamin tham gia sản xuất glycosaminoglycan, là chất tạo nên mô sụn trong cơ thể; glucosamin còn có ở trong các gân và dây chằng. Glucosamin dùng đường uống có thể giúp tái tạo sụn và thường được dùng trong điều trị viêm xương khớp.

3- Chỉ định

Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

4- Liều dùng và cách dùng

Người lớn: 1 viên/ lần, 3 lần mỗi ngày, dùng ít nhất trong 2-3 tháng.

Nuốt nguyên viên thuốc với một cốc nước đầy.

Nên uống thuốc trong bữa ăn.

5- Chống chỉ định

Người mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

Trẻ em và trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.

6- Lưu ý và thận trọng

Sử dụng thận trọng trên những người mắc bệnh tiểu đường hoặc giảm glucose huyết.

Thận trọng khi dùng trên những bệnh nhân bị rối loạn chảy máu hoặc đang dùng các thuốc làm tăng nguy cơ chảy máu. Trong trường hợp này có thể điều chỉnh liều nếu cần thiết.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Do thiếu bằng chứng khoa học, thuốc này không được khuyến dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng điều khiển tàu xe và vận hành máy móc: Thuốc có thể gây buồn ngủ, không điều khiển tàu xe và vận hành máy móc khi dùng thuốc.

7- Tác dụng không mong muốn

Tác dụng không mong muốn gồm khó chịu ở bụng, buồn ngủ, mất ngủ, đau đầu, phản ứng ở da và nhạy cảm với ánh nắng.

Hiếm khi đau bụng, ăn không ngon, nôn, buồn nôn, đầy hơi, táo bón, ợ nóng và tiêu chảy.

Ngưng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ nếu: Chảy máu bất thường, nôn hoặc tiêu chảy kéo dài.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

8- Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác

Về lý thuyết, glucosamin có thể làm giảm tác dụng của insulin hay các thuốc kiểm soát nồng độ đường trong máu khác.

Dùng chung glucosamin với các thuốc lợi tiểu như furosemid có thể làm tăng tác dụng phụ của glucosamin.

Glucosamin có thể làm tăng nguy cơ chảy máu khi sử dụng chung với các thuốc gây tăng nguy cơ chảy máu như acid acetylsalicylic, thuốc chống đông như warfarin hay heparin, thuốc chống kết tập tiểu cầu như clopidogrel và các thuốc kháng viêm không steroid như ibuprofen hay naproxen.

9- Quá liều và xử trí

Triệu chứng: Chưa có thông tin về quá liều.

Xử trí: Trong trường hợp quá liều, phải báo ngay cho bác sĩ. Bệnh nhân nên được theo dõi kỹ và điều trị triệu chứng.

10- Dạng bào chế và đóng gói:

Hộp 10 vi, vi 10 viên nang cứng.

Hộp 20 vi, vi 10 viên nang cứng.



Hộp 1 chai, chai 100 viên nang cứng.

11- Điều kiện bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

12- Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.

13- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỀ XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

Sản xuất bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED**

Địa chỉ: Số 35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam – Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650. 3768823;

Fax: 0650. 3769095

Ngày 23 tháng 04 năm 2014

P. Tổng giám đốc



TU QU CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Thu Thủy



Trang Văn Tỷ

