

## MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ

(Bổ sung lần 1)

Tên thuốc : **GLUCOSAMIN F**

Dạng thuốc : **VIÊN NÉN BAO PHIM**

Hàm lượng cho 1 viên:

**Glucosamin sulfat. 2NaCl 943 mg**  
**(Tương đương 750 mg Glucosamin sulfat)**

Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký: CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG.


Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG.

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

529/1045

\* Nhãn trên vỉ 10 viên (bổ sung lần 1):



MC

Sản xuất tại: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

**GLUCOSAMIN F**  
Glucosamin sulfat 750 mg

**GLUCOSAMIN F**  
Glucosamin sulfat 750 mg

**GLUCOSAMIN F**  
Glucosamin sulfat 750 mg

**GLUCOSAMIN F**  
Glucosamin sulfat 750 mg

**GLUCOSAMIN F**  
Glucosamin sulfat 750 mg

**GLUCOSAMIN F**  
Glucosamin sulfat 750 mg



**GLUCOSAMIN F**  
Glucosamin sulfat 750 mg

**GLUCOSAMIN F**  
Glucosamin sulfat 750 mg

**GLUCOSAMIN F**  
Glucosamin sulfat 750 mg

**GLUCOSAMIN F**  
Glucosamin sulfat 750 mg

DHG PHARMA

Số 10 SX: HD:

\* Nhãn trên chai 100 viên (bổ sung lần 1):

*[Handwritten signature]*

**THÀNH PHẦN:** Glucosamin sulfat..... 750 mg  
(tương đương 484,67 mg Glucosamin)  
Tá được vừa đủ..... 1 viên

**CHỈ ĐỊNH - CHỐNG CHỈ ĐỊNH - CÁC THÔNG TIN KHÁC:**  
Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**  
**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM**

**ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:**  
Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

  
849352064008333

SDK (Reg. No.):

Sản xuất tại:  
**CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG**  
Nhà máy Tia Phá Thành, Cầu Thành A, Hậu Giang  
ĐT: (0711) 3953555 • Fax: (0711) 3953555

Tư Vấn Khách Hàng  
071 9.3999000  
www.dhgpharma.com.vn

Chai 100 viên nén bao phim GMP-WHO



**GLUCOSAMIN F**  
Glucosamin sulfat 750 mg

DHG PHARMA

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:**  
Dùng cho người trên 18 tuổi: Uống từ 1250 mg đến 1500 mg glucosamin/ ngày (các dạng muối của glucosamin được quy đổi tương ứng với glucosamin), chia 3 lần. Có thể dùng đơn độc glucosamin sulfat hoặc phối hợp với thuốc khác như chondroitin 1200 mg/ ngày. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.  
Liều dùng trên tương đương 1 viên Glucosamin F (chứa 484,67 mg glucosamin) x 3 lần/ ngày.  
Hoặc theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.





\* Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc (bổ sung lần 1):



## GLUCOSAMIN F

Glucosamin sulfat 750 mg

### CÔNG THỨC:

Glucosamin sulfat..... 750 mg  
(tương đương 484,67 mg Glucosamin)  
Tá được vừa đủ..... 1 viên

(Tinh bột biến tính, kollidon VA 64, sodium starch glycolat, magnesi stearat, talc, HPMC, PVA, PEG 6000, titan dioxyd, màu eurolake ponceau, oxyd sắt vàng).

**DẠNG BẢO CHẾ:** Viên nén bao phim.

**QUY CÁCH ĐÓNG GỐI:** Chai 100 viên. Hộp 3 vỉ x 10 viên.

**TÍNH CHẤT:** Glucosamin là một amino - monosaccharid, nguyên liệu để tổng hợp proteoglycan. Khi vào cơ thể, glucosamin tập trung ở xương và khớp, kích thích tế bào sản xuất proteoglycan, collagen. Kết quả của quá trình trùng hợp tạo ra mucopolysaccharid là thành phần cơ bản cấu tạo nên đầu sụn khớp. Đồng thời glucosamin cũng ức chế các enzym phá hủy sụn khớp như collagenase, phospholipase A2 và giảm các gốc tự do superoxide phá hủy các tế bào sụn.

Glucosamin kích thích sinh sản mô liên kết của xương, giảm quá trình mất calci của xương. Ngoài ra, glucosamin còn làm tăng sản xuất chất nhầy dịch khớp nên tăng độ nhớt, tăng khả năng bôi trơn của dịch khớp. Vì vậy, glucosamin không những giảm triệu chứng của thoái hóa khớp như đau, khó vận động mà còn ngăn chặn quá trình thoái hóa khớp, ngăn chặn bệnh tiến triển.

Glucosamin tác dụng vào cơ chế bệnh sinh của thoái hóa khớp, ngăn ngừa các bệnh thoái hóa xương khớp, phục hồi cấu trúc sụn khớp.

**CHỈ ĐỊNH:** Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

**THẬN TRỌNG:** Chưa tìm thấy tài liệu.

**PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** Thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai và cho con bú.

**LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:** Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

**TƯƠNG TÁC THUỐC:** Glucosamin có thể gây tăng đề kháng insulin và do đó ảnh hưởng đến sự dung nạp glucose.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Hiếm gặp: buồn nôn, nôn, tiêu chảy.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

**QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:** Chưa tìm thấy tài liệu.

### LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Dùng cho người trên 18 tuổi: Uống từ 1250 mg đến 1500 mg glucosamin/ ngày (các dạng muối của glucosamin được quy đổi tương ứng với glucosamin), chia 3 lần. Có thể dùng đơn độc glucosamin sulfat hoặc phối hợp với thuốc khác như chondroitin 1200 mg/ ngày. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

Liều dùng trên tương đương 1 viên Glucosamin F (chứa 484,67 mg glucosamin) x 3 lần/ ngày.

Hoặc theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

**Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Điều kiện bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

**Tiêu chuẩn:** TCCS.

Sản xuất tại:

**CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG**

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Huyện Giang

ĐT: (0711) 3953555 • Fax: (0711) 3953555



Tư Vấn Khách Hàng  
☎ 0710.3899000

E-mail: [dhgpharma@dhgpharma.com.vn](mailto:dhgpharma@dhgpharma.com.vn)  
[www.dhgpharma.com.vn](http://www.dhgpharma.com.vn)

**PHÓ CỤC TRƯỞNG**

*Nguyễn Việt Hùng*  
**GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Hoàng Nam*