

381/153

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 23/3/2016

1782

Glusamin 250

Glucosamine 250mg

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang



OSTEOARTHRITIS



Số lô SX/ Lot : ABMMYY
Ngày SX/ Mfg.: Ngày / Tháng / Năm
HD/ Exp. : Ngày / Tháng / Năm

Glusamin 250

THÀNH PHẦN - Mỗi viên nang chứa
Glucosamine 250 mg

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG,
CÁCH DÙNG - Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN - Nơi khô, mát (dưới 30°C).
Tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN - TCCS.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
166-170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

SDK / VISA: XX - XXXX - XX

Glucosamine 250mg

Glusamin 250

Glusamin 250

Glucosamine 250mg

Box of 10 blisters x 10 capsules



OSTEOARTHRITIS



Glusamin 250


COMPOSITION - Each capsule contains
Glucosamine 250 mg

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS,
DOSAGE, ADMINISTRATION
Read the leaflet inside.

STORAGE - In a dry, cool place (below 30°C).
Protect from light.

SPECIFICATION - In-house.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ THE LEAFLET CAREFULLY BEFORE USING



583623



HUỖNH TẤN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nhãn vỉ

Handwritten signature



HUỲNH TẤN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay của trẻ em.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ

Glusamin 250
(Glucosamin 250mg)

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa

Glucosamin sulfat natri clorid 400 mg

tương đương Glucosamin 250 mg

Tá dược: Magnesi stearat.

DƯỢC LỰC HỌC

Glucosamin là một thành phần tự nhiên được tìm thấy trong chitin, mucoprotein và các mucopolysaccharid. Glucosamin có liên quan đến sản xuất glycosaminoglycan, là chất tạo nên mô sụn trong cơ thể; glucosamin còn có ở trong các gân và dây chằng. Glucosamin được tổng hợp trong cơ thể nhưng sẽ bị giảm theo tuổi. Glucosamin và glucosamin dạng muối được dùng trong điều trị các rối loạn xương khớp bao gồm viêm xương khớp. Glucosamin được chiết xuất từ chitin hoặc được tổng hợp.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Các thông số dược động học của glucosamin được xác định chủ yếu ở các nghiên cứu trên động vật. Khoảng 90% liều uống glucosamin được hấp thu qua hệ tiêu hóa, từ đó thuốc được vận chuyển vào hệ tuần hoàn và đến gan. Sinh khả dụng của thuốc thấp do chuyển hóa mạnh qua gan lần đầu. Không thấy dạng glucosamin tự do trong huyết thanh sau khi uống.

Glucosamin liên kết khá chặt chẽ với protein huyết tương chủ yếu là globulin. Thể tích phân phối: 2,5L. Khoảng 11% liều uống được thải trừ qua phân. Thời gian bán thải khoảng 68 giờ.

CHỈ ĐỊNH

Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Dùng cho người trên 18 tuổi: Uống 6 viên/ngày, chia 3 lần.

Có thể dùng đơn độc glucosamin sulfat hoặc phối hợp với thuốc khác như chondroitin 1200mg/ngày.

Thời gian dùng thuốc tùy theo cá nhân, ít nhất dùng liên tục trong 2 – 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

THẬN TRỌNG

Thận trọng sử dụng thuốc ở bệnh nhân bị tiểu đường, cần kiểm tra thường xuyên đường huyết ở những bệnh nhân này khi sử dụng glucosamin.

Ở những người bị dị ứng với hải sản có thể tăng nguy cơ dị ứng với glucosamin.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Thận trọng khi dùng đồng thời glucosamin với thuốc trị tiểu đường, do có thể làm giảm tác dụng của thuốc trị tiểu đường.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Chống chỉ định.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC LÊN LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không ảnh hưởng.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Dị ứng, mẩn ngứa, mề đay, mụn nước.

Rất hiếm khi bị rối loạn đường tiêu hóa như ợ nóng, khó chịu vùng thượng vị.

Thông báo cho thấy thuốc tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

Chưa có các nghiên cứu đầy đủ.

HẠN DÙNG 36 tháng kể từ ngày sản xuất

BẢO QUẢN Bảo quản nơi khô mát (dưới 30°C). Tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN TCCS

TRÌNH BÀY Hộp 10 vỉ x 10 viên.



CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
166-170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên

HUYỀN TẤN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC