

SDS / VISA : XX / ASIA / XXXX - XX

Glucosamin 395mg

## Glusamin Capsules

WHO-GMP

### Glusamin Capsules

COMPOSITION - Each capsule contains  
Glucosamine sulfate sodium chloride equivalent to  
Glucosamine ..... 395mg

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS, DOSAGE,  
ADMINISTRATION - Read the leaflet inside.

STORAGE - In a dry, cool place (below 30°C).  
Protect from light.

SPECIFICATION - In-house.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
READ THE LEAFLET CAREFULLY BEFORE USING



## Glusamin Capsules

Glucosamine 395mg

Box of 10 blisters x 10 capsules



OSTEOARTHRITIS



WHO-GMP

### Glusamin Capsules

THÀNH PHẦN - Mỗi viên nang cứng chứa  
Glucosamin sulfat natri clorid tương đương  
Glucosamin.....395mg

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG,  
CÁCH DÙNG - Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN - Nơi khô, mát (dưới 30°C).  
Tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN - TCCS.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CTY CỔ PHẦN PYMEPHARCO  
166 - 170 Nguyễn Huệ - Tuy Hòa - Phú Yên - VN

## Glusamin Capsules

Glucosamine 395mg

Hộp 10 vỉ bấm x 10 viên nang cứng



OSTEOARTHRITIS



104 x 70 x 57



Số lô SX/ Lot. :  
Ngày SX / Mfg. :  
Hạn Exp. :

**HUYỀN TẤN NAM**  
TỔNG GIÁM ĐỐC

## Nhãn vỉ



**HUỲNH TẤN NAM**  
TỔNG GIÁM ĐỐC



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*

*Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ. Để xa tầm tay trẻ em.*

### GLUSAMIN Capsules

(Glucosamin 395mg)

**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nang chứa

Glucosamin sulfat natri clorid tương đương

Glucosamin 395 mg

Tá dược: magnesi stearat

#### ĐƯỢC LỰC HỌC

Glucosamin sulfat đóng vai trò kích thích, duy trì bền vững cấu trúc và chức năng của sụn trong các khớp của cơ thể, làm giảm đau xương khớp, cải thiện chức năng sụn.

Chức năng chính của glucosamin là tham gia vào quá trình tổng hợp thành phần sụn khớp. Kích thích tế bào ở sụn tổng hợp các proteoglycan, là thành phần cơ bản cấu tạo nên các khớp sụn ở đầu xương tại khớp. Glucosamin ức chế một số enzym gây phá hủy sụn khớp, giảm các gốc tự do gây tác hại đến các tế bào sinh sụn. Ngoài ra, thuốc còn kích thích sinh sản mô liên kết của xương, giảm triệu chứng mất calci ở xương, làm tăng sinh sản chất nhầy ở dịch khớp.

#### ĐƯỢC ĐỘNG HỌC

Glucosamin được hấp thu rất tốt sau khi uống. Khoảng 90% liều uống glucosamin được hấp thu qua hệ tiêu hóa, từ đó thuốc được vận chuyển vào hệ tuần hoàn và đến gan. Thuốc được chuyển hóa mạnh qua gan lần đầu, không thấy dạng glucosamin tự do trong huyết thanh sau khi uống. Glucosamin liên kết chặt chẽ với protein huyết tương, chủ yếu là globulin. Thể tích phân phối là 2,5 lít, khoảng 11 % liều uống được thải trừ qua phân. Thời gian bán thải của glucosamin khoảng 68 giờ.

#### CHỈ ĐỊNH

Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

#### LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Dùng cho người trên 18 tuổi: uống từ 1250mg đến 1500mg glucosamin/ngày (3 viên/ngày), chia làm 3 lần.

Có thể dùng đơn độc glucosamin sulfat hoặc phối hợp với thuốc khác như Chondroitin 1200 mg/ngày.

Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

#### THẬN TRỌNG

Thận trọng sử dụng thuốc ở bệnh nhân bị tiểu đường, cần kiểm tra thường xuyên đường huyết ở những bệnh nhân này khi sử dụng glucosamin.

#### CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân mẫn cảm với thành phần của thuốc.

Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

#### TƯƠNG TÁC THUỐC

Thận trọng khi dùng đồng thời glucosamin với thuốc điều trị tiểu đường, do có thể làm giảm tác dụng của thuốc điều trị tiểu đường.

#### PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Chỉ sử dụng khi thật cần thiết. Nên hỏi ý kiến thầy thuốc trước khi sử dụng.

#### TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Glucosamin không ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

#### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Rất hiếm khi bị rối loạn đường tiêu hóa như ợ nóng, khó chịu vùng thượng vị.

Thông báo cho thầy thuốc tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

#### QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

Chưa tìm thấy thông tin về quá liều glucosamin.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, mát (dưới 30°C). Tránh ánh sáng.

**TIÊU CHUẨN:** Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS).

**TRÌNH BÀY:** Hộp 10 vỉ bầm, vỉ 10 viên.

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

170 Nguyễn Huệ, Tuy Hoà, Phú Yên

**HUYỀN TẤN NAM**  
TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ CỤC TRƯỞNG

*Nguyễn Việt Hưng*