





287/138

 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ĐÃ PHÊ DUYỆT Lần đầu: 18/01/2013	MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ THUỐC	Golsa thepharm Hộp (66 x 95 x 40)mm Vi: (76 x 60)mm	 Ngày 19 tháng 09 năm 2012 TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC DS. Trịnh Đăng Hùng	
	SẢN PHẨM			
	KÍCH THUỐC			
MÀU SẮC				





TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
GOLSATHEPHARM

CÔNG THỨC: Cho 1 viên nang cứng

Glucosamin

250mg

Tá dược vđ

1 viên

(Tá dược: *Silica collidal anhydrous*)

TRÌNH BÀY: Hộp 05 vỉ x 10 viên

DƯỢC LỰC

Glucosamin tham gia quá trình chuyển hóa tổng hợp nên thành phần của sụn khớp.

TÁC DỤNG

Glucosamin là một amino-monosaccharide, nguyên liệu để tổng hợp proteoglycan, khi vào trong cơ thể nó kích thích tế bào sụn khớp tăng tổng hợp và trùng hợp nên cấu trúc proteoglycan bình thường. Kết quả của quá trình tổng hợp là muco- polysaccharide, thành phần cơ bản cấu tạo nên sụn khớp. Glucosamin sulfat đồng thời ức chế các enzym phá hủy sụn khớp như collagenase, phospholinase A2 và giảm các gốc tự do superoxide phá hủy các tế bào sinh sụn. Glucosamin còn kích thích sinh sản mô liên kết của xương, giảm quá trình mất calci của xương.

Do Glucosamin làm tăng sản xuất chất nhầy dịch khớp nên tăng độ nhớt, tăng khả năng bôi trơn của dịch khớp. Vì thế glucosamin không những giảm triệu chứng của thoái hóa khớp (đau, khó vận động) mà còn ngăn cản quá trình thoái hóa khớp, ngăn chặn bệnh tiến triển.

Glucosamin tác dụng vào cơ chế bệnh sinh của thoái hóa khớp, điều trị các bệnh thoái hóa xương khớp cả cấp và mãn tính, có đau hay không có đau, cải thiện chức năng khớp và ngăn chặn bệnh tiến triển, phục hồi cấu trúc sụn khớp.

CHỈ ĐỊNH

Giảm triệu chứng của viêm khớp gối nhẹ và trung bình.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Dị ứng với glucosamin sulfat kali clorid.

Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

- Liều cho người trên 18 tuổi : Uống từ 1250mg đến 1500mg Glucosamin/ ngày chia làm 3 lần
- Có thể dùng đơn độc Glucosamin sulfat hoặc phối hợp với các thuốc khác như Chondroitin 1200mg/ngày
- Thời gian điều trị tùy theo cá thể, ít nhất dùng 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.
- Uống thuốc trước bữa ăn ít nhất 15 phút.

THẬN TRỌNG VÀ CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG

[Handwritten signature]

- Glucosamin không gây rối loạn dạ dày ruột nên có thể điều trị lâu dài. Điều trị nên nhắc lại 6 tháng hoặc ngắn hơn tùy theo tình trạng bệnh.
- Glucosamin là thuốc điều trị nguyên nhân nên tác dụng của thuốc có thể bắt đầu sau 1 tuần, vì vậy nếu đau nhiều có thể dùng thuốc giảm đau chống viêm trong những ngày đầu.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN (ADR)

- Glucosamin thuộc nhóm carbohydrat, dù không trực tiếp gây tăng đường huyết nhưng có thể ảnh hưởng lên sự bài tiết insulin, vì thế cần theo dõi đường huyết thường xuyên trên những bệnh nhân đái tháo đường.
- Tác dụng không mong muốn: Hiếm gặp rối loạn tiêu hoá nhẹ.
- Dị ứng da : bao gồm hồng ban, phù mạch, mề đay, phát ban, ngứa. Cần phải chú ý rằng nếu nguyên liệu Glucosamin có nguồn gốc từ hải sản sẽ tăng phản ứng quá mẫn đối với bệnh nhân có cơ địa dị ứng với động vật có vỏ cứng.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Hướng dẫn cách xử trí ADR

Chưa có thông tin.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa có thông tin.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

Chưa có thông tin.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin hỏi ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ

Để xa tầm với của trẻ em

HẠN DÙNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất

BẢO QUẢN

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN:

TCCS : 037- B-826-11

Nhà sản xuất và phân phối

CÔNG TY DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ

Số 04 - Quang Trung - TP. Thanh hóa

Điện thoại: (037) 3852.691 - Fax: (037) 3855.209



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

Ngày...19...tháng...02...năm 2012



DS. *Trịnh Đăng Hùng*