


MẪU NHÃN GÓI:



**GONSA
GATRILA**

THUỐC CỐM SỦI BỌT

Điều Trị Triệu Chứng



Khó Tiêu



Đầy Hơi



Buồn Nôn

Hương Cam

Gói 5 g

Số lô SX:
HD:

THÀNH PHẦN:

Mỗi gói chứa:

Natri bicarbonat 2.320 mg
Acid citric khan 2.180 mg
Natri carbonat khan 500 mg

CHỈ ĐỊNH: Điều trị các triệu chứng khó tiêu, đầy hơi và buồn nôn.

LIỀU DÙNG:

Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên:
1 gói/lần, uống khi có triệu chứng. Có thể dùng liều thứ hai sau 2 - 3 giờ.
Liều tối đa hằng ngày: 2 gói/ngày.

CÁCH DÙNG:

Hòa tan hoàn toàn lượng thuốc trong gói với nước (khoảng 150 mL) và sử dụng ngay.

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CPDP IMEXPHARM
Cơ sở phân phối:
CÔNG TY TNHH GSPHARM

COMPOSITION:

Each sachet contains:

Sodium bicarbonate 2.320 mg
Anhydrous citric acid 2.180 mg
Anhydrous sodium carbonate: 500 mg

INDICATION: The symptomatic relief of indigestion, flatulence and nausea.

DOSAGE:

Adults and children aged 12 and over:
1 sachet as symptoms occur. A second dose may be taken after 2 - 3 hours.
Maximum daily dose: 2 sachets.

ADMINISTRATION:

Dissolve the contents of the sachet completely in water (approximately 150 mL) and use immediately.

Manufacturer:
IMEXPHARM CORPORATION
Distributor:
GSPHARM COMPANY LIMITED

MẪU NHÃN HỘP:
(Thiết kế gồm 2 trang)



MẪU NHÃN HỘP:
(Thiết kế gồm 2 trang)



GONSA GATRILA

COMPOSITION:
Each sachet contains:
Sodium bicarbonate . 2,320 mg
Anhydrous citric acid . 2,180 mg
Anhydrous sodium carbonate 500 mg

INDICATION: The symptomatic relief of indigestion, flatulence and nausea.

DOSAGE - ADMINISTRATION - CONTRA INDICATION AND OTHER INFORMATION:
See enclosed leaflet.
SDR/Visa No. xx-xxxx-xx

STORAGE: Do not store above 30°C, protect from light and moisture.

SPECIFICATION: In-house.

Keep out of reach of children.
Carefully read the instructions before use.

IMEXPHARM
Manufacturer:
IMEXPHARM CORPORATION
No 4 - 33/4 Street, Ward 7, Cao Lãnh City, Đồng Tháp Province, Vietnam.

GSpharm
Distributor:
GS PHARM COMPANY LIMITED
88 Phạm Thị Tồnh Street, Ward 4, District 8, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Tel: 1800 646859

GONSA GATRILA

EFFERVESCENT GRANULES

The symptomatic relief of

Indigestion Flatulence Nausea

Box of 20 sachets x 5 g

Orange Flavour

NSX / Mfg. Date:
Số lô SX / Batch No.:
HD / Exp. Date:



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: (Nội dung gồm 03 trang)

GONSA GATRILA

GMP - WHO

THUỐC CỐM SỦI BỌT

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Để xa tầm tay trẻ em.

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC:

Mỗi gói chứa:

Thành phần dược chất: Natri bicarbonat	2.320 mg
Acid citric khan	2.180 mg
Natri carbonat khan	500 mg

Thành phần tá dược: Natri saccharin, FD&C Blue 1 powder, Quinolin, Bột mùi cam.

DẠNG BÀO CHẾ:

Thuốc cốm sủi bọt.

Thuốc cốm khô toí, màu xanh lá cây, có mùi cam, vị ngọt nhẹ hơi mặn.

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị các triệu chứng khó tiêu, đầy hơi và buồn nôn.

LIỀU DÙNG – CÁCH DÙNG:

Liều dùng:

Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1 gói/ lần, uống khi có triệu chứng. Có thể dùng liều thứ hai sau 2 - 3 giờ.

Liều tối đa hằng ngày: 2 gói/ ngày.

Thời gian điều trị bằng thuốc kháng acid tối đa: 14 ngày.

Trẻ em dưới 12 tuổi: Không khuyến cáo sử dụng.

Người cao tuổi: Có thể sử dụng liều lượng tương tự như người lớn.

Cách dùng:

- Hòa tan hoàn toàn lượng thuốc trong gói với nước (khoảng 150 mL) và sử dụng ngay.
- Trường hợp quên uống một liều thuốc: Hãy uống ngay khi nhớ ra. Nếu thời gian gần với lần dùng thuốc tiếp theo (không quá 2 giờ), bỏ qua liều đã quên và uống liều tiếp theo vào thời gian thường lệ. Không dùng liều gấp đôi để bù vào liều đã quên.

Một số lưu ý đặc biệt về xử lý thuốc trước và sau khi sử dụng thuốc:

Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với natri bicarbonat, natri carbonat khan, acid citric khan hoặc bất kỳ thành phần nào khác của thuốc (xem mục *Thành phần công thức thuốc*).
- Bệnh nhân cần kiểm soát lượng muối (natri) trong chế độ ăn (ví dụ: bệnh nhân tăng huyết áp hoặc suy tim sung huyết), trừ khi có chỉ định của bác sĩ.
- Bệnh nhân suy giảm chức năng gan và thận.



CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

Sử dụng thuốc theo liều lượng khuyến cáo. Sử dụng thuốc quá liều lượng hay kéo dài có thể dẫn đến nhiễm kiềm chuyển hóa.

Nên ngừng điều trị với thuốc nếu tình trạng không cải thiện.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai:

Chưa có dữ liệu lâm sàng về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai.

Các nghiên cứu về từng hoạt chất của thuốc trên động vật cho thấy thuốc không gây hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến khả năng mang thai, sự phát triển của phôi thai/ thai nhi, quá trình sinh nở hoặc phát triển của trẻ sau sinh.

Thận trọng khi sử dụng thuốc cho phụ nữ mang thai.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú:

Chưa có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ cho con bú. Thận trọng khi sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỲ CỦA THUỐC:

Tương tác của thuốc:

Khả năng trung hòa acid của GONSA GATRILA có thể làm thay đổi hấp thu của các loại thuốc có độ hấp thu thay đổi theo pH khi sử dụng đồng thời.

Tương kỳ của thuốc:

Do chưa có các nghiên cứu về tính tương kỳ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

Các tác dụng không mong muốn (Adverse drug reactions - ADRs) của thuốc dưới đây được ghi nhận sau khi thuốc lưu hành trên thị trường với tần suất chưa xác định:

- **Hệ tiêu hóa:** Kích ứng nhẹ đường tiêu hóa, bao gồm ợ hơi, đầy hơi và trướng bụng.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Quá liều:

- Trường hợp dùng quá liều rất khó xảy ra.
- Quá liều cấp tính trung bình có thể dẫn đến ợ hơi và rối loạn đường tiêu hóa.
- Quá liều cấp tính nặng có thể dẫn đến tình trạng quá tải natri (tăng natri huyết hoặc tăng áp lực thẩm thấu) và gây nhiễm kiềm chuyển hóa. Các triệu chứng có thể bao gồm bồn chồn, suy nhược, khát nước, giảm tiết nước bọt, chóng mặt, đau đầu, hạ huyết áp và nhịp tim nhanh.
- Ngộ độc cấp tính do dùng trực tiếp cốm thuốc có thể dẫn đến kích thích dạ dày, giải phóng khí và có khả năng gây thủng dạ dày.

Cách xử trí:

- Quá liều cấp tính trung bình: Ngừng sử dụng thuốc và điều trị các triệu chứng quá liều.
- Quá liều cấp tính nặng: Cách xử trí là điều chỉnh thích hợp cân bằng lượng nước và điện giải cho



bệnh nhân.

Ngộ độc cấp tính do dùng trực tiếp cốm thuốc: Rửa dạ dày, điều trị triệu chứng và thực hiện các biện pháp hỗ trợ.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 20 gói x 5 g.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:

Không quá 30°C, tránh ẩm và ánh sáng.

HẠN DÙNG:

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA THUỐC:

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.



GSpharm

Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Số 04, đường 30/4, phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Điện thoại: 1800 555 535 Email: imp@imexpharm.com

Cơ sở phân phối:

CÔNG TY TNHH GSPHARM

88 Đường Phạm Thị Tánh, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 1800 646 899