

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

**MẪU NHÃN DUYỆT CẤP SỐ ĐĂNG KÝ
HADISTRIL**

Hà Tĩnh, 2013

UBND TỈNH HÀ TĨNH
Công ty CP Dược Hà Tĩnh
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN VỈ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



10 vỉ x 10 viên nang cứng

Hadistril

Glucosamin sulfat

HADIPHAR
Công ty Cp Dược Hà Tĩnh
167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh

Công thức cho 1 viên nang cứng
Glucosamin sulphat natri clorid
Tương ứng Glucosamin...197,4mg
Tá dược vừa đủ 1 viên

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng,
thận trọng, thông tin khác
Xem tờ hướng dẫn sử dụng
thuốc bên trong hộp.

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ
dưới 30°C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SĐK:
Đề xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Ngày SX:
Số lô SX:
HD:
Công ty CP Dược Hà Tĩnh
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

10 Blisters x 10 capsules

Hadistril

Glucosamin sulfat

HADIPHAR
Công ty Cp Dược Hà Tĩnh
167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh

Composition: Each capsule contains:
glucosamin sulfat natri clorid
Equivalent to Glucosamin ...197,4mg
Excipients qs for 1 capsules

Indications, contraindications, dosage &
administration: See the package insert
Storage: Store in a cool, dry place.
Specifications: Manufacturers
Visa No:

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAREFULLY READ THE ACCOMPANYING
INSTRUCTIONS BEFORE USE

HA TINH PHARMACEUTICAL
167 Hà Huy Tập - Hà Tĩnh City
Tel: 0393 854617 - Fax 0393.856821

UBND TỈNH HÀ TĨNH
Công ty CP Dược Hà Tĩnh
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN LỘ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

Công thức cho 1 viên nang cứng Glucosamin sulphat natri clorid Tương ứng Glucosamin sulphat 250mg Tá dược vừa đủ 1 viên Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, thận trọng, thông tin khác Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp. Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS SDK: Đề xa tầm tay của trẻ em Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Ngày SX: Số lô SX: HD: Công ty CP Dược Hà Tĩnh 167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh	100 capsules Hadistril Glucosamin sulphat Glucosamin sulphat Degenerative arthritis Degenerative cartilage HADIPHAR Công ty CP Dược Hà Tĩnh 167 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh	Composition: Each capsule contains: glucosamin sulfate natri clorid Equivalent to Glucosamin sulfate 250mg Excipients qs for 1 capsules Indications, contraindications, dosage & administration: See the package insert inside. Storage: Store in a cool, dry place. Specifications: Manufacturers Visa No: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN CAREFULLY READ THE ACCOMPANYING INSTRUCTIONS BEFORE USE HA TINH PHARMACEUTICAL 167 Ha Huy Tap - Ha Tinh City Tel: 0393 854617 - Fax 0393.856821
--	---	---

100 viên nang cứng Hadistril Glucosamin sulphat Glucosamin sulphat Degenerative arthritis Degenerative cartilage HADIPHAR Công ty CP Dược Hà Tĩnh 167 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh	Công thức cho 1 viên nang cứng Glucosamin sulphat natri clorid Tương ứng Glucosamin.....197,4mg Tá dược vừa đủ 1 viên Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, thận trọng, thông tin khác Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp. Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS SDK: Đề xa tầm tay của trẻ em Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Ngày SX: Số lô SX: HD: Công ty CP Dược Hà Tĩnh 167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh	100 capsules Hadistril Glucosamin sulphat Glucosamin sulphat Degenerative arthritis Degenerative cartilage HADIPHAR Công ty CP Dược Hà Tĩnh 167 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh	Composition: Each capsule contains: glucosamin sulfate natri clorid Equivalent to Glucosamin197,4mg Excipients qs for 1 capsules Indications, contraindications, dosage & administration: See the package insert inside. Storage: Store in a cool, dry place. Specifications: Manufacturers Visa No: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN CAREFULLY READ THE ACCOMPANYING INSTRUCTIONS BEFORE USE HA TINH PHARMACEUTICAL 167 Ha Huy Tap - Ha Tinh City Tel: 0393 854617 - Fax 0393.856821
---	--	---	--

M.S.D.N: 3000104879 - C.T.G.P

CÔNG TY
CƠ PHÂN
DƯỢC
HÀ TĨNH

TP. HÀ TĨNH T. HÀ TĨNH

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

HADISTRIL

Công thức bào chế cho : 1 viên nang cứng

Glucosamin sulphat natri clorid

Tương ứng Glucosamin 197,4 mg

Tá dược Tinh bột mỳ, PVP, Sodium starch glycolate, Magnesi stearat, Talc, nước tinh khiết) vừa đủ 1 viên

Chỉ định điều trị: Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình

Liều lượng và cách dùng: Dùng cho người trên 18 tuổi

Uống 6 – 8 viên /ngày chia làm 3 lần. Có thể dùng đơn độc glucosamin hoặc phối hợp với các thuốc khác như chondroitin 5viên/ngày. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể. ít nhất dùng liên tục trong 2 -3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

Chống chỉ định: : Người bệnh quá mẫn cảm với thuốc. Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị..

Tác dụng không mong muốn: Thường hiếm khi xảy ra chỉ giới hạn một số các rối loạn tiêu hoá thông thường, nhìn chung rất nhẹ và thoáng qua. Liều cao có thể gây đầy bụng, tiêu phân lỏng, buồn nôn.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác:

Không nên kết hợp đồng thời thuốc này với các thuốc kháng viêm, giảm đau.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không dùng

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có thông tin

Thận trọng: Thuốc không gây rối loạn dạ dày ruột nên có thể điều trị lâu dài. Điều trị nên nhắc lại 6 tháng hoặc ngắn hơn tùy theo tình trạng bệnh.

Sử dụng quá liều: Chưa có tư liệu về quá liều của glucosamin.

Qui cách đóng gói: Vi PVC/ Al vi 10 viên hộp 10 vi. Lọ 100 viên/hộp

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30⁰C tránh ánh sáng

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

ĐỂ THUỐC XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SỸ.



HADIPHAR

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

167 - Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh

ĐT: 0393 854617 - 3 855906

Fax : 3856821



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh