



TrungTamThuoc.com

Thông tin sản phẩm: <http://trungtamthuoc.com/>

#### THÀNH PHẦN

**Kem bôi:** White Petrolatum, Lanolin, Caprylic/Capric/Myristic/Stearic Triglyceride, Calcium Carbonate, Camphor (long não), Eucalyptus Oil (tinh dầu khuynh diệp), Ethanol, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, BHA.

**Viên đặt:** Chiết xuất dầu lô hội, Chiết xuất dầu cúc Calendula,\* Chiết xuất dầu cúc vạn diệp, Long não, Cồn Ethanol, tinh dầu dinh hương, Glycerit béo tổng hợp (Witepsol H15), Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, BHA.

#### CHỈ ĐỊNH

##### Kem bôi:

- Sản phẩm được dung nạp tốt ở niêm mạc hậu môn và da.
- Sản phẩm được khuyên dùng cho việc chăm sóc vùng hậu môn và trực tràng, để cải thiện, điều trị, và ngăn ngừa:
  - Bất kỳ dạng trĩ nào, ở bất kỳ giai đoạn nào (trĩ nội, ngoại, trĩ chảy máu)
  - Chảy máu ở vùng hậu môn và trực tràng, bảo vệ niêm mạc nhạy cảm ở vùng bị ảnh hưởng
  - Nứt kẽ hậu môn

##### Viên đặt:

Được dung nạp tốt ở niêm mạc hậu môn và trực tràng, viên đặt HEMOTREAT H là sản phẩm hiệu quả trong việc cải thiện, phòng ngừa và điều trị trĩ nội và nứt kẽ hậu môn. Viên đặt được khuyên dùng cho phụ nữ mang thai và theo hướng dẫn của Chuyên viên y tế.

#### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Vệ sinh và làm sạch hậu môn bằng khăn ướt thấm cồn hoặc bằng nước ấm.
- Thoa hoặc đặt hậu môn 2 lần trong ngày, vào buổi sáng và buổi tối, thời gian 5 đến 7 ngày trong trường hợp trĩ cấp. Khi các triệu chứng trĩ thuyên giảm, sử dụng 1 lần 1 ngày.
- Nằm nghiêng 10-15 phút sau khi đặt, hoặc thoa sản phẩm
- Kem bôi có dụng cụ đưa sản phẩm vào bên trong, dụng cụ này cần được làm sạch, bằng khăn giấy cồn sau khi dùng. Sau đó vệ sinh tay bằng xà phòng.

Thời gian sử dụng tùy thuộc vào tiến triển và tình trạng trĩ.

Lưu ý: Không dùng quá 30 ngày liên tục.

#### CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm
- Người bị dị ứng với cao su latex không được sử dụng dụng cụ bôi bọc ngón tay latex

#### CẢNH BÁO VÀ THẬN TRONG

- Nếu bất kỳ dấu hiệu nào của nhiễm khuẩn cục bộ xảy ra, việc tiếp tục sử dụng sản phẩm sẽ phải tuân theo chỉ định của bác sĩ.
- Không dùng sản phẩm trong 1 giai đoạn dài hơn 30 ngày
- Kiểm tra bao bì còn nguyên vẹn trước khi sử dụng
- Không sử dụng sản phẩm nếu bao bì bị hư hỏng
- Không sử dụng sản phẩm sau ngày hết hạn/hạn sử dụng
- Viên đặt phải được bảo quản dưới 25°C
- Để xa tầm tay trẻ em