


MẪU HỘP 5ml INNILOR 0.15

1. Hình thức và nội dung:



Màu sắc: 3 màu
Blue, Red, Cyan

MẪU NHÃN 5ml INNILOR 0.15



Ngày 14 tháng 5 năm 2024

Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Vàng



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO

08 Nguyễn Trường Tộ- P.Phước Vĩnh- Tp.Huế
Tel: 0234.3611870

Email: rd@medipharco.vn
Website: www.medipharco.vn

MẪU HỘP 8ml INNILOR 0.15

1.Hình thức và nội dung:



Màu sắc: 3 màu
Blue, Red, Cyan

MẪU NHÃN 8ml INNILOR 0.15



Ngày 14 tháng 5 năm 2024

Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
GLOBAL
PHARMACEUTICAL
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Văn Vàng



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO

08 Nguyễn Trường Tộ- P.Phước Vĩnh- Tp.Huế
Tel: 0234.3611870

Email: rd@medipharco.vn
Website: www.medipharco.vn


MẪU HỘP 10ml INNILOR 0.15

1.Hình thức và nội dung:



Màu sắc: 3 màu
Blue, Red, Cyan

MẪU NHÃN 10ml INNILOR 0.15



Ngày 19 tháng 5 năm 2024

Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Vàng

R_x



Thuốc nhỏ mắt

INNILOR 0.15

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc.

Để xa tầm tay của trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thành phần công thức thuốc:

-*Thành phần được chất:* natri hyaluronat..... 0,15% (kl/tt)

-*Thành phần tá dược:* natri clorid, propylen glycol, 6-aminocaproic acid, dinatri edetat, benzalkonium clorid, natri hydroxyd, acid hydroclorid, nước cất vừa đủ 1 lọ

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt. Dung dịch trong suốt, không màu đến ngà vàng.

Chỉ định: Thuốc chứa thành phần bôi trơn hiệu quả, giảm bớt nhanh chóng chứng bông rớt, sưng tấy và sự khó chịu do khô mắt. Nó có thể được sử dụng thay thế nước mắt trong trường hợp thiếu hụt tiết nước mắt, hội chứng khô mắt hoặc bất kỳ điều kiện đòi hỏi phải làm dịu mắt, bôi trơn và giữ ẩm giác mạc.

Cách dùng, liều dùng:

Nhỏ một giọt vào mắt bị ảnh hưởng, 4 lần/ngày hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ nhãn khoa. Bệnh nhân đeo kính áp tròng cần được tư vấn để tháo bỏ chúng trước khi nhỏ thuốc vào mắt, sau đó có thể được đeo vào sau 15 phút.

Lưu ý: Khi một lần quên không dùng thuốc: Không cần dùng bù những lần quên sử dụng thuốc với liều gấp đôi cho những lần dùng tiếp theo. Nên dùng thuốc trở lại sớm nhất nếu có thể và theo đúng liều lượng khuyến cáo.

Chống chỉ định: Chống chỉ định đối với những bệnh nhân quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Chỉ sử dụng thuốc để nhỏ mắt. Không được dùng để tiêm. Nếu sự khó chịu vẫn còn hoặc tăng lên, nên ngưng sử dụng thuốc và tham khảo ý kiến bác sĩ. Không chạm đầu của lọ thuốc vào bề mặt của mắt.

Thuốc có chứa: Benzalkonium clorid có thể bị hấp thụ bởi kính áp tròng mềm và có thể làm thay đổi màu sắc của kính áp tròng. Bạn nên tháo kính áp tròng trước khi sử dụng thuốc này



và đặt chúng trở lại sau 15 phút. Benzalkonium clorid cũng có thể gây kích ứng mắt, đặc biệt nếu bạn bị khô mắt hoặc rối loạn giác mạc (lớp trong suốt ở phía trước của mắt). Nếu bạn cảm thấy mắt bất thường, châm chích hoặc đau mắt sau khi sử dụng thuốc này, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

-Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

-Sử dụng thuốc ở phụ nữ cho con bú: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ cho con bú, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Các tác dụng phụ khi nhỏ thuốc vào mắt có thể ảnh hưởng đến những công việc cần sự tập trung như lái xe và vận hành máy móc. Do đó, không nên sử dụng cho các đối tượng này.

Tương tác, tương kỵ của thuốc:

**Tương tác của thuốc:* Không nên được sử dụng cùng lúc với các dung dịch thuốc nhỏ mắt khác, cũng như bất kỳ loại thuốc hay sản phẩm được sử dụng cho mắt do có thể thay đổi hiệu quả của thuốc.

**Tương kỵ của thuốc:* Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Một số tác dụng phụ trên mắt như ngứa mắt, khó chịu và sung huyết ở mắt có thể xảy ra.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí:

-Quá liều: Các biểu hiện quá liều được báo cáo bao gồm xuất hiện chất bài tiết mắt bất thường, đỏ mắt, thị lực kém, mắt mờ và sợ ánh sáng.

-Xử trí: Khi sử dụng quá liều, bệnh nhân cần ngưng dùng và cần được điều trị triệu chứng.

Đặc tính dược lực học:

Nhóm dược lý: Nước mắt nhân tạo và các chế phẩm khác

Mã ATC: S01XA20

Natri hyaluronat có độ đàn hồi và độ nhớt cao, có tác dụng bôi trơn bề mặt mắt, làm giảm ma sát trong lúc chớp mắt và trong các cử động mắt.

Đặc tính dược động học:

Natri hyaluronat là một polyme có trọng lượng phân tử lớn, vì vậy không được hấp thu vào máu khi dùng nhỏ mắt.

Khi dùng nhỏ mắt, natri hyaluronat chủ yếu tập trung ở tiền phòng và tạo được màng phun nước mắt nhân tạo ở bề mặt của mắt. Thời gian bán thải trung bình của natri hyaluronat ở bề mặt của mắt là 321 giây. Natri hyaluronat được thải trừ qua tuyến lệ dưới dạng không đổi.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml; 8ml; 10ml kèm tờ hướng dẫn sử dụng

Điều kiện bảo quản: Để nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không sử dụng thuốc quá 15 ngày kể từ khi mở nắp sử dụng lần đầu.

Số lô sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng xem trên bao bì chính của sản phẩm.

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở.

Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO

Địa chỉ: số 8 Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 19001010 - 0234.3837731

*Fax: 0234.3826077

Nhà phân phối: CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL PHARMACEUTICAL

Địa chỉ: Số 5 Đường 59B, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028.629.652.53

*Fax: 028.629.652.53

Ngày 14 tháng 5 năm 2024

Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Vàng

