

MẪU NHÃN JOINT SCAP
(Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng)

1/ MẪU VỈ:

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 9/1/15

JOINT SCAP

Glucosamin sulfat 250mg
(tương đương Glucosamin 197,5mg
dưới dạng Glucosamin sulfat sodium clorid)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MINH HẢI

SDK:

JOINT SCAP

Glucosamin sulfat 250mg
(tương đương Glucosamin 197,5mg
dưới dạng Glucosamin sulfat sodium clorid)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MINH HẢI

SDK:

JOINT SCAP

Glucosamin sulfat 250mg
(tương đương Glucosamin 197,5mg
dưới dạng Glucosamin sulfat sodium clorid)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MINH HẢI

SDK:

Số lô sx:



2/ MẪU HỘP:





JOINT SCAP

THÀNH PHẦN: Cho một viên nang cứng.

Glucosamin sulfat 250 mg	
Dưới dạng Glucosamin sulfat sodium clorid 314 mg	314 mg
(tương đương Glucosamin base 197,5mg)	
Tinh bột	49 mg
Lactose	17,5 mg
Dicalci phosphat	16 mg
Povidon	15 mg
Talc	10 mg
Magnesi stearat	1,67 mg
Colloidal anhydrous silica	2,67 mg
Sodium starch glycolate	24,16 mg
Ethanol 90%	0,08 ml

DƯỢC LỰC HỌC:

Viên nang cứng JOINT SCAP 250mg, chứa chất có tác dụng chính là glucosamin sulfat. Glucosamin là một amino – monosaccharid, một nguyên liệu để tổng hợp proteoglycan, khi vào cơ thể glucosamin trùng hợp tạo ra muco-polysaccharid là thành phần cơ bản tạo nên đầu sụn khớp, nó tham gia vào cấu trúc màng tế bào. Glucosamin có trong thành phần của sợi chun các mạch máu lớn, và chiếm tỷ lệ lớn trong chất căn bản của mô sụn và xương, đảm bảo cho sụn xương có độ chắc và tính đàn hồi cao. Glucosamin tham gia vào quá trình tái tạo mô sụn, xương, kích thích sự sinh sản mô liên kết của xương và làm giảm quá trình mất canxi của xương.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Sau khi uống glucosamin được hấp thu gần như hoàn toàn, chuyển hóa qua gan, thải trừ chủ yếu qua đường tiểu, một phần thải trừ qua phân.

CHỈ ĐỊNH:

Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

CÁCH DÙNG – LIỀU DÙNG: Tính theo hàm lượng Glucosamin base.

Người lớn trên 18 tuổi: Uống 4 viên/lần, 2 lần/ngày, uống liên tục 2 – 3 tháng.

THẬN TRỌNG:

- Trong thời kỳ mang thai, cho con bú khi cần dùng thuốc phải tham khảo ý kiến của thầy thuốc.
- Theo dõi bệnh nhân trong viêm cấp tính.
- Glucosamin sulfat có trong thành phần của thuốc thuộc nhóm carbohydrate, dù không trực tiếp gây tăng đường huyết nhưng có thể ảnh hưởng đến sự bài tiết insulin, vì thế cũng cần phải thận trọng khi dùng cho người bệnh tiểu đường, nếu dùng cần phải thường xuyên kiểm tra đường huyết, nước tiểu, chức năng gan.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không sử dụng cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi vì do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Tránh dùng chung với thuốc kháng viêm, thuốc giảm đau.
- Thuốc trị tiểu đường.
- Tetracycline, Penicilin, Cloramphenicol, Doxorubicin, Teniposid, Etoposid, Insulin.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC :

Chưa có tài liệu ghi nhận.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Ít gặp: Rối loạn tiêu hoá, nôn, buồn nôn, phân lỏng, tiêu chảy.
- Hiếm gặp: Ngứa, nổi mề đay.

“Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”.

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU:

Khi dùng quá liều có thể thấy rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy. Ngưng thuốc sẽ hết.

BẢO QUẢN:

Bảo quản thuốc ở nhiệt độ dưới 30°C, nơi khô mát, tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng thuốc quá hạn.

HÌNH THỨC – CÁCH TRÌNH BÀY:

Đóng trong vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng. Có toa hướng dẫn kèm theo. Đóng trong thùng carton.

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.
Thuốc SX theo : TCCS.**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MINH HẢI

322 - Lý Văn Lâm - P1 – TP. Cà Mau – Tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780 3831133 * FAX : 0780 3832676



**TUO CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy**

