



155/90



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 26/.../5/2015

Dr

[Composition] Each capsule contains:
Glucosamine Sulfate 250mg (as Glucosamin
sulfate sodium chloride)
[Dosage form]
Hard capsule.
**[Indications, Dosage & Administration,
Contraindications, Precautions, Side-effects]**
Please see the insert paper.
[Quality specification]
Manufacturer's specification
[Storage]
Store in air-tight container, cool dry place, protect
from light, at temperature below 30°C.
For more information see insert paper.
**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ INSERT PAPER CAREFULLY BEFORE USE**
Visa No. :
Lot No. :
Mfg. Date : dd /mm /yyyy
Exp. Date : dd /mm /yyyy



[Thành phần] Mỗi viên nang chứa:
Glucosamine Sulfate 250mg (dưới dạng
Glucosamin sulfate natri chloride)
[Dạng bào chế]
Viên nang cứng.
**[Chỉ định, Liều lượng và Cách dùng,
Chống chỉ định, Thận trọng, Tác dụng phụ]**
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.
[Tiêu chuẩn chất lượng]
Tiêu chuẩn nhà sản xuất
[Bảo quản]
Bảo quản trong bao bì kín, nơi khô mát,
tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C.
Các thông tin khác xem trong tờ hướng
dẫn sử dụng kèm theo.
**ĐỂ XÁC ĐỊNH TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**
SDK :
Số 16 SX :
NSX : dd/mm /yyyy
HD : dd/mm /yyyy



2017

2017

Tờ hướng dẫn sử dụng

KOSARIN Capsule

(Glucosamin sulfat 250 mg)

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ, dược sỹ.*

Tên thuốc: KOSARIN Capsule.

Thành phần Mỗi viên nang chứa:

Hoạt chất:

Glucosamin sulfat natri chloridtương đương glucosamin sulfat 250 mg.

Tá dược: Cellulose vi tinh thể, tinh bột ngô, carboxymethyl cellulose, acid silicic, magie stearat

Dạng bào chế

Viên nang cứng

Qui cách đóng gói

10 viên/vi x 10 vi/hộp.

Dược lực học

Glucosamin sulfat là một amino-monosaccharid, ức chế các enzym phá hủy sụn khớp như collagenase, phospholipase A2 và các gốc tự do superoxid phá hủy các tế bào sinh sụn; phục hồi những tổn thương trên sụn qua thực nghiệm nghiên cứu do kích thích các tế bào sụn sản sinh ra glycosaminoglycan và proteoglycan (một chất có xung quanh sụn khớp); bảo vệ tế bào sụn, chống viêm khớp. Mức độ kích thích tổng hợp proteoglycan phụ thuộc vào liều dùng của glucosamin sulfat. Glucosamin cũng có mặt trong gân và dây chằng, tăng sinh chất nhầy trong dịch khớp. Glucosamin sulfat có tác dụng chống viêm và chống tương tác giữa các tác nhân gây phù như carrageenan, detran, acid acetic và formalin.

Dược động học

Glucosamin sulfat được hấp thu tốt sau khi uống. Sự gắn kết với α và β globulin trong huyết tương bắt đầu ở phút thứ 20 sau khi dùng thuốc, đạt đến nồng độ đỉnh sau 8-10 giờ và sau đó giảm dần với thời gian bán thải là 2,9 ngày. Glucosamin sulfat được hấp thu chủ động ở các sụn khớp và một số mô khác, trong khi đó cơ chế phân bố chủ yếu của đa số các tế bào và mô trong cơ thể là khuếch tán thụ động. Glucosamin sulfat có thể qua được hàng rào máu - hoạt dịch. Mặc dù nồng độ thuốc trong huyết tương khi dùng đường uống thấp hơn khi dùng đường tiêm, dược động học của glucosamin sulfat đường uống vẫn giống như tiêm sau khi chuyển hóa bước đầu ở gan. Glucosamin sulfat thải trừ chủ yếu qua đường phổi (khoảng 50%), qua thận (khoảng 35%) dưới dạng glucosamin và qua phân (khoảng 2%).

Chỉ định

Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.



3

3

Liều lượng và cách dùng

Dùng cho người trên 18 tuổi: Uống từ 1250 mg đến 1500 mg glucosamin/ngày (các dạng muối của glucosamin được quy đổi tương ứng với glucosamin), chia 3 lần. Có thể dùng đơn độc glucosamin sulfat hoặc phối hợp với thuốc khác như chondroitin 1200 mg/ngày. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

Chống chỉ định

Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

Thận trọng

- Khi điều trị các bệnh mãn tính, cần tiến hành các xét nghiệm lâm sàng định kỳ: thử nước tiểu, xét nghiệm máu, xét nghiệm chức năng gan...
- Nên xem xét các phương pháp điều trị không dùng thuốc.
- Khi điều trị các bệnh lý cấp tính, nên xem xét mức độ viêm, đau, sốt xảy ra trong quá trình điều trị.
- Tránh dùng một loại thuốc trong một thời gian dài.
- Không dùng chung với các thuốc kháng viêm, giảm đau khác.
- Theo dõi đường huyết chặt chẽ với các bệnh nhân đái tháo đường dùng bổ sung glucosamin sulfat.
- Thuốc có thể làm nặng hơn tình trạng hen suyễn.
- Cần ngưng thuốc ít nhất 2 tuần trước phẫu thuật do có tương tác giữa glucosamin với các thuốc chống đông.
- Lưu ý đến các tác dụng phụ khi dùng thuốc cho người lớn tuổi; nên dùng thuốc với liều thấp nhất có tác dụng trị liệu.

Tác dụng phụ

Thuốc có chứa sulfur nên có thể gây rối loạn tiêu hóa nhẹ và thoáng qua.

Giảm hiệu quả kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường.

Chóng mặt, nhức đầu, phản ứng da, tăng nhãn áp.

Thông báo ngay cho bác sĩ nếu có những tác dụng phụ sau khi dùng thuốc.

Tương tác thuốc

Về lý thuyết, glucosamin có thể làm giảm tác dụng của insulin hay các thuốc kiểm soát nồng độ đường trong máu khác. Do đó không nên dùng chung KOSARIN Capsule với các thuốc thuộc nhóm thuốc này.

Dùng chung glucosamin với các thuốc lợi tiểu như furosemid có thể làm tăng tác dụng phụ của glucosamin. Không nên dùng chung KOSARIN Capsule với các thuốc lợi tiểu.

Glucosamin có thể làm tăng nguy cơ chảy máu khi sử dụng chung với các thuốc gây tăng nguy cơ chảy máu như acid acetylsalicylic, thuốc chống đông như warfarin hay heparin, thuốc chống kết tập tiểu cầu như clopidogrel và các thuốc kháng viêm không steroid như ibuprofen hay naproxen.

Thận trọng và theo dõi nếu có sự phối hợp này.





Handwritten red markings on the left edge of the page, possibly a signature or initials.

Quá liều và cách xử trí

Chưa có báo cáo.

Thời kỳ mang thai và cho con bú

Không sử dụng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú.

Ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc

Thuốc có thể gây chóng mặt, nhức đầu, cần thận trọng khi lái xe và vận hành máy móc.

Bảo quản

Bảo quản trong bao bì kín, nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc khi quá hạn sử dụng.

ĐỂ THUỐC TRÁNH XA TẦM TAY TRẺ EM.

Nhà sản xuất:

CHUNGGEI PHARM. CO., LTD.

16, DUMEORI-GIL, YANGGAM-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, HÀN QUỐC



TUQ. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Huy Hùng