

MẪU NHÃN

135

1. Nhãn trên lọ 60 viên.

Thành phần : Cho 1 viên nang.

- Cao khô Hà thủ ô (10/1).....100 mg
- Cao khô Đan sâm (10/1).....100 mg
- Cao khô Tâm thất (10/1).....50 mg
- Cao khô Sơn tra (10/1).....150 mg
- Tá dượcvừa đủ 1 viên

Lưu lượng và cách dùng :
Theo chỉ định của Thầy thuốc, hoặc dùng liều trung bình :
- Người lớn : Mỗi lần 2-3 viên, ngày 3 lần.
- Trẻ em : Mỗi lần từ 1-2 viên, ngày 3 lần.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC
KHI DÙNG



Danapha
PHARMACEUTICAL JSC

Chỉ định :
Điều trị và dự phòng chứng đau thắt ngực, đau nhói vùng tim do huyết áp, xơ cứng động mạch, thiếu năng mạch vành, thiếu năng tuần hoàn não, lipid máu cao.

Chống chỉ định :
Người mẫn cảm với thành phần của thuốc.

Bảo quản:
Nơi khô, mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Ngày SX:
Số lô SX:
HD :

CTY. CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 253 Đường Sĩ Thanh Khê Tp. Đà Nẵng

Sản xuất tại Nhà máy GMP-WHO,
KCN. Hòa Khánh, Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

2. Nhãn trên hộp 1lọ x 60 viên.

LIPACAP

Chỉ định :
Điều trị và dự phòng chứng đau thắt ngực, đau nhói vùng tim do huyết áp, xơ cứng động mạch, thiếu năng mạch vành, thiếu năng tuần hoàn não, lipid máu cao.

Lưu lượng và cách dùng :
Theo chỉ định của Thầy thuốc, hoặc dùng liều trung bình :
- Người lớn : Mỗi lần 2-3 viên, ngày 3 lần.
- Trẻ em : Mỗi lần từ 1-2 viên, ngày 3 lần.

Chống chỉ định :
Người mẫn cảm với thành phần của thuốc.

Bảo quản :
Nơi khô, mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Ngày SX :
Số lô SX :
HD :

Danapha
PHARMACEUTICAL JSC



HỘP 1LỌ X 60 VIÊN NANG. GMP-WHO

LIPACAP

Thành phần : Cho 1 viên nang.

- Cao khô Hà thủ ô (10/1).....100 mg
- Cao khô Đan sâm (10/1).....100 mg
- Cao khô Tâm thất (10/1).....50 mg
- Cao khô Sơn tra (10/1).....150 mg
- Tá dượcvừa đủ 1 viên

SĐK :

Sản xuất tại Nhà máy GMP-WHO,
KCN. Hòa Khánh, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Danapha
PHARMACEUTICAL JSC

LIPACAP

Indications :
Treatment and prevention of angina pectoris, pain in the heart by blood stasis, arteriosclerosis, coronary insufficiency, cerebral circulatory insufficiency, hyperlipidemia.

Dosage and use: As indicated by the physician or the average dose:
- Adults: 2-3 capsules each time, 3 times a day.
- Children: 1-2 capsules each time, 3 times a day.

Contraindications: People with sensitive components of the drug.

Storage : Keep in cool, dry place, protect from light, temperature below 30 degree Celsius.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAREFULLY READ THE PACKAGE INSERT BEFORE USE

Box of 60 capsules

LIPACAP

Compositions : For 1 capsule
- Radix Polygoni Multiflora extract (10/1).....100 mg
- Radix Salviae Moutanizae extract (10/1).....100 mg
- Radix Notoginseng extract (10/1).....50 mg
- Fructus Crataegi extract (10/1).....150 mg
- Excipientsjust enough for 1 capsule

Reg. No. :

Cty Cổ Phần Dược Danapha,
253 Đường Sĩ Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

SĐK.K.D: 040010
CÔNG
CỔ P
DƯ
DAN
Q. THANH K

QUẢN LÝ DƯỢC


Handwritten signature

3. Nhãn trên vỉ 10 viên.



Số lô SX, HD :
In chìm trên vỉ.

4. Nhãn trên hộp 3 vỉ x 10 viên.



Đà Nẵng ngày 26 tháng 03 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐS. Nguyễn Quang Trí, MBA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Viên nang
LIPACAP**Thành phần :** Cho 1 viên

Cao khô Hà thủ ô (Radix Polygoni multiflorae)	: 100 mg
Cao khô Đan sâm (Radix Salviae miltiorrhizae)	: 100 mg
Cao khô Tam thất (Radix Panasis notoginseng)	: 50 mg
Cao khô Sơn tra (Fructus Crataegi)	: 150 mg
Tá dược (Lactose monohydrat, Povidon K30, DST, Avicel 102, Aerosil) vừa đủ	: 1 viên

Dược lực học :

- Hà thủ ô (Polygonum multiflorum Thunb): Theo các báo cáo nghiên cứu dược lý hiện đại, Hà thủ ô có tác dụng chống lão hóa, chống mệt mỏi, bảo vệ gan và thúc đẩy quá trình tái tạo và phát triển tế bào máu v.v... SONG, Shijun... [SONG, Shijun v.v... Nghiên cứu tác dụng của Hà thủ ô đối với thử nghiệm lipid máu cao, Tạp chí Thuốc Trung y và Dược lý Tỉnh Hà Bắc, 2003, Vol.18, No.4, 90-91] quan sát tác dụng và nguyên lý tác dụng hạ lipid máu của Hà thủ ô đối với chuột bạch lớn và nhỏ; kết quả cho thấy Hà thủ ô có tác dụng hạ triglyceride và cholesterol máu rõ rệt ở chuột bạch lớn.

- Các nghiên cứu còn cho thấy, ngoài tác dụng hạ thấp cholesterol, làm giảm lượng cholesterol hấp thu trong ruột và làm ngưng sự lắng tụ của cholesterol trong máu, làm giảm các triệu chứng của xơ cứng động mạch, ngăn cản sự ứ đọng của lipid trong máu, Hà thủ ô còn có tác dụng làm cải thiện vi tuần hoàn và ngăn ngừa sự hình thành huyết khối.

- Đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) và Tam thất (Radix Notoginseng) có tác dụng ức chế và ngăn ngừa tác dụng của các chất oxy hóa, đào thải các gốc tự do, làm giãn các động mạch vành, tăng lưu lượng máu tới động mạch vành và giảm đòi hỏi oxygen ở cơ tim, bảo vệ cơ tim chống lại tình trạng rối loạn do thiếu máu. Thuốc có tác dụng chặn Calci vào tế bào cơ tim, do đó làm tăng K^+ trong cơ tim và một chức năng quan trọng là ức chế sự kết vón tiểu cầu, ngăn ngừa tạo cục máu đông (Am J Chin Med 1986; 14 (1 - 2): 26 - 32; Am J Chin Med 1986; 14 (3 - 4): 145 - 52; Planta Med 1989 Feb; 55 (1): 51 - 4).

- Sơn tra (Fructus Crataegi): giúp hoàn thiện và sự diễn ra đồng thời mục đích cải thiện vi tuần hoàn và làm hạ lipid máu, tăng hiệu quả của thuốc trong điều trị lâm sàng

Dược động học: Không có thông tin

Chỉ định :

- Điều trị và dự phòng chứng đau thắt ngực, đau nhói vùng tim do huyết ứ, xơ cứng động mạch, thiếu năng mạch vành, thiếu năng tuần hoàn não, lipid máu cao.

Liều lượng - Cách dùng: Theo sự chỉ định của thầy thuốc, hoặc liều trung bình là

* Người lớn : Mỗi lần từ 2 - 3 viên, ngày 3 lần.

* Trẻ em : Mỗi lần từ 1 - 2 viên, ngày 3 lần.

Chống chỉ định :

- Người bị mẫn cảm với thành phần của thuốc.

Tác dụng không mong muốn: Chưa ghi nhận được trường hợp nào xảy ra tác dụng không mong muốn trong khi dùng thuốc.

***Thông báo ngay cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn khi sử dụng thuốc**

Tương tác thuốc : Không có thông tin.

Quá liều: Không có thông tin

Khuyến cáo :

- Không dùng thuốc quá hạn ghi trên hộp, hoặc thuốc có nghi ngờ về chất lượng.
- **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.** Muốn biết thêm thông tin về thuốc, xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ.

Trình bày và bảo quản :

- Thuốc đóng trong lọ 60 viên, hộp 1 lọ; vi 10 viên, hộp 3 vi, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.
- Để thuốc nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30⁰C. **ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM**
- Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS

Thuốc được sản xuất tại :

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Khu Công nghiệp Hòa Khánh – Liên Chiểu - TP Đà Nẵng

Tel: 0511.3760452 Fax: 0511.3760127 Email: info@danapha.com

Điện thoại tư vấn: 0511.3760131

Và phân phối trên toàn quốc

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Nguyễn Quang Trí, MBA

