



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC LONG HUYẾT P/H EXTRA

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng - Để xa tầm tay trẻ em.

Thành phần dược chất: (cho 1 viên)

Cao khô Huyết giác (*Extractum Dracaenae siccus*) (0,45% loureirin B) : 400mg
Tá dược: Amidon, PVP K 30, magnesi stearat, vỏ nang cứng gelatin số 0 : vđ 1 viên

Dạng bào chế: Viên nang cứng, màu đỏ.

Tác dụng

Hoạt huyết chỉ thống, tán ứ sinh tân, chỉ huyết sinh cơ.

Chỉ định

Dùng uống chữa chấn thương máu tụ sưng đau, giúp vết thương mau lành, phụ nữ sau đẻ huyết ứ trệ, bế kinh.

Cách dùng, liều dùng

Uống sau bữa ăn.

- Trẻ em dưới 14 tuổi: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên
- Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 4 viên

Liệu trình dùng thuốc:

- Trường hợp chấn thương, vết thương do té ngã, chơi thể thao, tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp, vết thương do tiểu phẫu,...: 5-14 ngày (tùy mức độ nặng của vết thương)
- Phụ nữ sau sinh huyết ứ trệ: 7 – 10 ngày.

Chống chỉ định

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai, người có rối loạn đông máu.
Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thận trọng khi dùng thuốc cho người đang có xuất huyết.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

- Phụ nữ có thai: Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai.
- Phụ nữ cho con bú: Dùng được thuốc cho phụ nữ cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

Tương tác, tương kỵ của thuốc

Không dùng cùng thuốc chỉ huyết, thuốc chống kết tập tiểu cầu, thuốc chống huyết khối.

Tác dụng không mong muốn:



Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Thông báo ngay cho bác sỹ và được sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí

Không có thông tin lâm sàng về quá liều. Không dùng thuốc quá liều khuyến cáo.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 40 viên, hộp 1 lọ x 60 viên, hộp 2 vỉ x 12 viên, hộp 3 vỉ x 12 viên, hộp 5 vỉ x 12 viên.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Sau khi mở nắp lọ thuốc, nên sử dụng trong vòng không quá một tháng kể từ ngày mở nắp.

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở.

Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc.

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng.

Trụ sở: Số 96 - 98 Nguyễn Viết Xuân, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Nhà máy: Cụm Công nghiệp Thanh Oai, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Điện thoại: 024. 33824177 - 33826222; Fax: 024. 33978024.

