





MẪU NHÃN HỘP-VỈ SẢN PHẨM MEDI-GLUCOSAMIN



20/1/2015

*Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ
Dạng bào chế: Viên nang cứng*

MEDI-GLUCOSAMIN

TRÌNH BÀY: Hộp 10 vỉ x 10 viên

CÔNG THỨC: Mỗi viên nang cứng có chứa:

Glucosamin sulphat kali clorid.....500 mg

(Tương đương: Glucosamin 295,9 mg)

Tá dược (Tinh bột mì, Magnesi stearat, Talc, nang số 0), vừa đủ 1 viên.

DƯỢC LÝC HỌC

Glucosamin là một thành phần tự nhiên được tìm thấy trong chitin, mucoprotein và các mucopolysaccharid. Glucosamin có liên quan đến sản xuất glycosaminoglycan, là chất tạo nên mô sụn trong cơ thể; glucosamin còn có ở trong các gân và dây chằng. Glucosamin dùng đường uống có thể giúp tái tạo sụn và thường được dùng trong điều trị viêm xương khớp.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Khoảng 90 % liều dùng Glucosamin theo đường uống dưới dạng Glucosamin muối được hấp thu từ ruột non, sau đó được chuyển vào gan. Tại đó một phần đáng kể glucosamin được hấp thu bị dị hóa bởi chất chuyển hóa tại gan. Không tìm thấy glucosamin tự do trong huyết thanh sau khi uống và nghiên cứu ở người vẫn chưa biết là có khoảng bao nhiêu phần trăm liều được chuyển vào khớp xương nhưng lại thấy có một phần nhỏ liều dùng được chuyển vào khớp sụn khi nghiên cứu ở động vật.

CHỈ ĐỊNH

Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú.
- Trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.
- Do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

LIỀU DÙNG

Người lớn trên 18 tuổi: uống 5 viên chia 2 lần /ngày.

Có thể dùng phối hợp với thuốc khác như Chondroitin trong viêm xương khớp, viêm khớp cấp và mãn tính. Dùng liên tục trong 2-3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Về lý thuyết, Glucosamin có thể làm giảm tác dụng của Insulin hay các thuốc kiểm soát nồng độ đường trong máu khác.

Dùng chung Glucosamin với các thuốc lợi tiểu như furosemid có thể làm tăng tác dụng phụ của glucosamin.

Glucosamin có thể làm tăng nguy cơ chảy máu khi sử dụng chung với các thuốc gây tăng nguy cơ chảy máu như acid acetylsalicylic, thuốc chống đông như warfarin hay heparin, thuốc chống kết tập tiểu cầu như clopidogrel và các thuốc kháng viêm không steroid như ibuprofen hay naproxen.



THẬN TRỌNG

Không dùng quá liều chỉ định.

Trong thời kỳ mang thai khi cần dùng phải tham khảo ý kiến của thầy thuốc.
Đây là thuốc trị nguyên nhân nên chỉ có tác dụng 5 - 7 ngày sau khi uống, nếu đau nhiều cần uống thuốc giảm đau chống viêm những ngày đầu.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Glucosamin không được khuyến dùng trong thai kỳ hoặc khi đang cho con bú
TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC LÊN VẬN HÀNH MÁY MÓC VÀ LẠI XE:
Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ LÝ

Chưa có báo cáo quá liều

Thông báo ngay cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc quá liều.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Hiếm thấy, nếu có thì thấy:

Rối loạn tiêu hóa (nóng rất dạ dày, tiêu chảy).

Ngứa, nổi mề đay.

Chứng tán huyết ở người thiếu men G6PD.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không sử dụng quá hạn ghi trên bao bì

TIÊU CHUẨN: TCCS số 0650-003-2012

Logo công ty: **MEDISUN**

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Phẩm ME DI SUN

Địa chỉ nhà sản xuất: số 521, ấp An Lợi, xã Hoà Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650 3589036 – Fax: 0650 3589297



TUO CUC TRUONG
P.TRUONG PHONG

Nguyễn Thị Thu Thủy

Bình Dương, ngày 29 tháng 08 năm 2014

Giảng viên ký thuốc

