

 THUỐC BÁN THEO ĐƠN

Methionin 250mg

VIÊN NANG CỨNG

THÀNH PHẦN:

DL-Methionin.....250 mg
Tá dược vừa đủ.....1 viên

(Tá dược gồm: tinh bột sắn, talc, magnesi stearat).

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng.

CHỈ ĐỊNH: Chủ yếu dùng điều trị quá liều paracetamol khi không có acetylcystein. Ngoài ra còn dùng để toan hóa nước tiểu.

LIỀU LƯỢNG & LIỀU DÙNG:

Điều trị quá liều paracetamol: Phụ thuộc vào nồng độ paracetamol trong huyết tương. Liều uống ban đầu là 2,5 g, cách 4 giờ lại uống 2,5 g, như vậy 3 lần. Cần tiến hành điều trị chậm nhất là 10 giờ đến 12 giờ sau khi uống paracetamol. Nên uống trong bữa ăn hoặc khi đang no. Hoặc theo hướng dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Người bệnh bị nhiễm toan. Tổn thương gan nặng.

THẬN TRỌNG LÚC DÙNG:

Ở những người bệnh đã bị suy gan, methionin có thể làm cho tổn thương gan nặng thêm. Cần thận trọng khi dùng methionin cho người bệnh bị bệnh gan nặng. Ở những người bệnh đã bị suy gan/tổn thương gan, methionin có thể làm bệnh về não do gan tiến triển mạnh. Không được dùng methionin để điều trị ngộ độc paracetamol nếu đã quá 12 giờ tính từ lúc uống thuốc quá liều.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc dùng được cho người đang vận hành máy móc hay lái tàu xe. Tuy nhiên, cần phải chắc rằng thuốc không ảnh hưởng gì đến việc vận hành máy móc hay lái tàu xe.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Methionin có thể làm giảm tác dụng của levodopa. Cần tránh dùng methionin liều cao ở người bệnh đang được điều trị bằng levodopa.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Buồn nôn, nôn, ngủ gà, dễ bị kích thích. Gây nhiễm toan chuyển hóa và tăng nitơ huyết ở người bị suy chức năng thận.

DƯỢC LỰC HỌC:

Methionin là một acid amin thiết yếu có trong thành phần của chế độ ăn và trong công thức của các chế phẩm đa acid amin để nuôi dưỡng. Methionin tăng cường tổng hợp glutathion và được sử dụng thay thế cho acetylcystein để điều trị ngộ độc paracetamol để phòng tổn thương gan. Methionin còn được dùng theo đường uống để làm giảm pH nước tiểu.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Methionin được chuyển hóa ở gan.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Triệu chứng quá liều: Dùng quá liều methionin có thể gây buồn nôn, nôn, dễ bị kích thích. Liều cao methionin có nguy cơ làm tăng huyết khối (nhất là đối với bệnh nhân bị tắt động mạch não hoặc ngoại biên).

Cách xử trí: Điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ. Đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn cơ sở.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TRÌNH BÀY: Chai 100 viên nang cứng.

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ

Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến thầy thuốc

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.