



MẪU NHÃN











Hỗn dịch uống MILDGEL

Nhôm hydroxid.....400 mg
Magnesi hydroxid.....400 mg

Khuyến cáo:

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
- Để xa tầm tay trẻ em
- Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc
- Lắc kỹ trước khi dùng

1. THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC

Mỗi gói 10 ml hỗn dịch uống chứa:

- Thành phần dược chất:
Nhôm hydroxid.....400 mg
(dưới dạng Nhôm hydroxid dried gel 522,337 mg)
Magnesi hydroxid.....400 mg
- Thành phần tá dược: Methyl paraben, Propyl paraben, Propylen glycol, Vivapur MCG 811P, Novaxan gum, Glycerin, Sucralose, Acid citric khan, Hương cam, Aerosil 200.....vừa đủ 10 ml

2. DẠNG BẢO CHẾ

- Hỗn dịch uống
- Hỗn dịch sánh, màu trắng đến trắng ngà, hương thơm

3. CHỈ ĐỊNH

Được dùng để làm giảm triệu chứng:

- Khó tiêu do acid
- Ợ nóng
- Ợ chua
- Đau bụng do các triệu chứng trên

4. CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG

- Cách dùng:

Uống

Lắc kỹ trước khi dùng

- Liều dùng:

Người lớn và trẻ em > 12 tuổi: 10 – 20 ml (1 – 2 gói) x 4 lần/ngày hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Trẻ em dưới 12 tuổi: Tham khảo ý kiến bác sĩ.

- Không dùng quá 80 ml (8 gói)/ngày hoặc liều tối đa trong 2 tuần.

5. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Quá mẫn với các thành phần của thuốc
- Bệnh thận với chế độ ăn hạn chế magnesi

6. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

- Nhôm hydroxid có thể gây táo bón và Magnesi hydroxid có thể gây tiêu chảy
- Ở bệnh nhân suy thận nồng độ Nhôm và Magnesi trong huyết tương đều tăng, ở những bệnh nhân này, một thời gian dài tiếp xúc với liều lượng cao của muối nhôm và Magnesi có thể dẫn đến mất trí nhớ, thiếu máu hồng cầu nhỏ có thể tăng loãng xương trong quá trình lọc máu
- Thận trọng tá dược: Thuốc có chứa Methyl paraben và Propyl paraben, thành phần có khả năng gây dị ứng.

7. SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI, CHO CON BÚ VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN

Không có dữ liệu hoặc dữ liệu rất hạn chế về việc sử dụng Nhôm hydroxid và Magnesi hydroxid cho phụ nữ có thai và cho con bú. Nếu phải sử dụng, cần có ý kiến của bác sĩ

8. ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc.

9. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Các tác dụng phụ được báo cáo có thể xảy ra như:

- Táo bón, tiêu chảy
- Các phản ứng quá mẫn như phát ban, dị ứng, phù mắt hiếm xảy ra.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ khi gặp các tác dụng không mong muốn như trên khi sử dụng thuốc hoặc báo cáo các phản ứng có hại của thuốc về Trung tâm Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (ADR) Quốc Gia. Địa chỉ: 13 - 15 Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Điện thoại: 024.3.9335.618; Fax: 024.3.9335642; Email: di.pvcenter@gmail.com.

10. QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Không có triệu chứng nghiêm trọng nào được báo cáo.


Triệu chứng được báo cáo khi sử dụng quá liều Nhôm hydroxid và Magnesi hydroxid bao gồm tiêu chảy, táo bón, đau bụng, nôn mửa.

Nhôm hydroxid và Magnesi hydroxid được thải trừ qua đường tiết niệu, điều trị quá liều có thể dùng biện pháp bù nước và sử dụng thuốc lợi tiểu. Trong trường hợp suy thận, lọc máu hay thẩm phân phúc mạc là cần thiết.

11. ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

Nhóm dược lý: Kháng acid

Mã ATC: A02AB10



Nhôm hydroxid và Magnesi hydroxid là hai chất có tác dụng kháng acid. Chất kháng acid làm giảm tính acid bằng cách trung hòa acid quá mức của dạ dày, làm giảm đau và giảm khó chịu của chứng khó tiêu

12. ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Nhôm hydroxid và Magnesi hydroxid chỉ có tác dụng tại chỗ, không có tác dụng toàn thân và được thải trừ qua nước tiểu.

13. DỮ LIỆU AN TOÀN TIỀN LÂM SÀNG

Không có dữ liệu nào được đưa ra.

14. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- Hộp 20, 30, 50 gói PET 10 ml, kèm 1 tờ hướng dẫn sử dụng.

15. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA THUỐC

- **Điều kiện bảo quản:** Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. Để thuốc ra khỏi tầm nhìn và tầm tay của trẻ em.
- **Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- **Tiêu chuẩn chất lượng:** TCCS

16. TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT VÀ CƠ SỞ ĐĂNG KÝ

Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG

Lô 7, Đường số 2, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. HCM, Việt Nam

- **Cơ sở đăng ký: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH TÍN**
925 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

