


Rx - Thuốc kê đơn

CỐM

MIPELOP

(Folium Ampelopsis)



MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ



THÀNH PHẦN: Mỗi gói cốm 5 g chứa:

Cao khô chè dây 1 g
Tương đương với dược liệu Chè dây 10 g
Tá dược (Đường trắng, Lactose, Aspartam, Povidon K30, Natri Benzoat) vừa đủ 1 gói 5 g

TÁC DỤNG:

Tiêu viêm chỉ thống, thanh nhiệt giải độc.

CHỈ ĐỊNH:

+ Hỗ trợ điều trị viêm đau dạ dày, tá tràng cấp và mãn tính.
+ Dùng trong trường hợp đầy hơi, ợ chua, nóng rát vùng thượng vị.
+ Làm nhanh liền sẹo.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Người tiểu đường, người mẫn cảm với thành phần của thuốc

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM


ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Rx - Thuốc kê đơn

CỐM

MIPELOP

(Folium Ampelopsis)



GMP-WHO
ISO 9001

Hộp 24 gói 5 g cốm

TIÊU VIÊM CHỈ THỐNG •

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

+ Trẻ em trên 15 tuổi và người lớn: Ngày 2 lần, mỗi lần uống 1 gói. Uống sau bữa ăn.
+ Trẻ em trên 6 -15 tuổi: Ngày 1 lần, mỗi lần uống 1 gói. Uống sau bữa ăn.
Liệu trình dùng thuốc: Uống theo sự hướng dẫn của bác sỹ

TIÊU CHUẨN: TCCS.

SDK/Reg.No:

Số lô SX (Lot.No) :

Ngày SX (Mfg.Date):

HD (Exp.Date) :



Sản xuất tại:

CÔNG TY CPTM DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ


Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 1-2, phường Tiến Phong,
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Rx - Thuốc kê đơn

CỐM

MIPELOP

(Folium Ampelopsis)



GMP-WHO
ISO 9001

Hộp 24 gói 5 g cốm

TIÊU VIÊM CHỈ THỐNG •

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ



Rx - Thuốc kê đơn

GMP-WHO
ISO 9001

CÓM
MIPELOP
(Folium Ampelopsis)

Gói 5 g cốm



**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

THÀNH PHẦN: Mỗi gói cốm 5 g chứa:

Cao khô chè dây 1 g

Tương đương với dược liệu Chè dây 10 g

Tá dược (Đường trắng, Lactose, Aspartam, Povidon K30, Natri Benzoat) vừa đủ 1 gói 5 g

TÁC DỤNG: Tiêu viêm chỉ thống, thanh nhiệt giải độc.

CHỈ ĐỊNH:

- + Hỗ trợ điều trị viêm đau dạ dày, tá tràng cấp và mãn tính.

- + Dùng trong trường hợp đẩy hơi, ợ chua, nóng rát vùng thượng vị.

+ Làm nhanh liền sẹo.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

-Trẻ em trên 15 tuổi và người lớn: Ngày 2 lần, mỗi lần uống 1 gói. Uống sau bữa ăn.

-Trẻ em trên 6 -15 tuổi: Ngày 1 lần, mỗi lần uống 1 gói. Uống sau bữa ăn.

-Liệu trình dùng thuốc: Uống theo sự hướng dẫn của bác sỹ.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

SDK/Reg.No:

Số lô SX (Lot.N)

Ngày SX (Mfg.Date):

HD (Exp.Date) :

Sản xuất tại: **CÔNG TY CPTM DƯỢC VITYT KHẢI HÀ**

Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 1-2, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP-WHO / ISO 9001

Rx – Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

Để xa tầm tay trẻ em – Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

MIPELOP

Thành phần: Cho 1 gói thuốc cốm 5 g

- Thành phần hoạt chất:

Cao khô chè dây (*Extractum Folii Ampelopsis siccum*) 1,0 g

Tương đương với dược liệu Chè dây (*Folium Ampelopsis*) 10,0 g

- Thành phần tá dược (Đường trắng, Lactose, Aspartam, Povidon K30, Natri benzoat) vừa đủ 1 gói 5 g.

Dạng bào chế: Thuốc cốm.

Mô tả sản phẩm: Gói thuốc cốm bên trong chứa hạt cốm thuốc màu nâu, khô to, không vón cục, mùi thơm dược liệu, vị ngọt hơi đắng.

Tác dụng - Chỉ định:

- **Tác dụng:** Tiêu viêm chỉ thống, thanh nhiệt giải độc.

- **Chỉ định:**

+ Hỗ trợ điều trị viêm đau dạ dày, tá tràng cấp và mãn tính.

+ Dùng trong trường hợp đầy hơi, ợ chua, nóng rát vùng thượng vị.

+ Làm nhanh liền sẹo.

Cách dùng - liều dùng:

- Trẻ em trên 15 tuổi và người lớn: Ngày 2 lần, mỗi lần uống 1 gói. Uống sau bữa ăn.

- Trẻ em trên 6 -15 tuổi: Ngày 1 lần, mỗi lần uống 1 gói. Uống sau bữa ăn.

- Liều trình dùng thuốc: Uống theo sự hướng dẫn của bác sỹ.

Chống chỉ định: Người tiểu đường, người mẫn cảm với thành phần của thuốc.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: Khi sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc người cho con bú. Loét dạ dày có HP cần hỏi ý kiến bác sỹ.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Không ảnh hưởng.

Tương tác, tương kỵ của thuốc:

- **Tương tác:** Khi đang dùng thuốc cần kiêng các chất cay, nóng, đồ uống có ga.

- **Tương kỵ:** Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.



Tác dụng không mong muốn: Hiện chưa thấy tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu có hiện tượng bất thường khi dùng thuốc cần ngừng sử dụng và thông báo kịp thời cho bác sỹ hoặc dược sỹ biết để xử lý.

Quá liều và cách xử trí:

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
- Khi dùng thuốc quá liều cần tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

Quy cách đóng gói: Hộp 24 gói 5g, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

Số 2A - Phố Lý Bôn - tổ 1-2- Phường Tiền Phong - Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình

Hotline: 1900571522

