

50 Days Preservative Free
Mytro-5 Plus

25.00 mm

Mytro-5 Plus

50 Days Preservative Free

Composition
Each ml contains:
Atropine Sulfate USP 0.5mg
Sterile Aqueous Buffered Vehicle Q.S.

Storage conditions
Do not store above 30°C

Warning: To be sold by retail on the prescription of a Registered medical practitioner only



Mytro-5 Plus

60 Ngày Không chất Bảo quản

Atropine sulfate
Ophthalmic Solution
USP 0.05% W/V

NOT FOR INJECTION
FOR EXTERNAL USE ONLY

DIRECTION FOR USE:
1. Use the solution within 60 days after opening the container.
2. If irritation persists or increases discontinue the use and consult the physician.
3. Do not touch the nozzle tip or other dispensing tip to any surface since this may contaminate the solution.

SG TRAM

Marketed in Viet Nam by:
CTY TNHH VBT TUY TIẾP TRẦN
Mg. Lic. No: G/28A/6673-A

Manufactured by:
SCIPREC LIFESCIENCES
Plot no 6/2/3, Gachon Road, Opp.
Arunal Tibs, Ambawadi, SIDC
Estates, Wadhwan City-363035,
DIST: Surendranagar, Gujarat, India
At 105, 104 & 102 SIDC Estate,
Wadhwan City-36 30 35
Dist-Surendranagar, Gujarat, INDIA.

Atropine sulfate
Ophthalmic Solution
USP 0.05% W/V

EYE DROPS

For childhood myopia

Date of first opening

For childhood myopia

PACK OPENED ON:

DOCTOR'S INSTRUCTIONS:

NVZ

Left Right

10ML

CE

Mytro-5 Plus

10ML

Mytro-5 Plus

NVZ

90.00 mm
Ultima 300Gsm + UV Drip (VIETNAM-ANH KHUE)

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ

DUNG DỊCH NHÃN KHOA

Mytro-5 Plus

60
0 Preservative
Free

(Atropine 0.05% không chất bảo quản)

Mytro-5 plus là dung dịch chứa Atropine sulfate do SciPrec Lifesciences phát triển nhằm mục đích kiểm soát và làm chậm sự tiến triển bệnh cận thị ở trẻ em. Atropine sulfate là một chất sinh học, các nghiên cứu lâm sàng cho thấy có sự tương hợp tốt và tác dụng tốt đối với sự tiến triển cận thị.

THÀNH PHẦN

Hoạt chất: Atropine Sulfate USP0.5mg
(Không chất bảo quản)

DẠNG BÀO CHẾ

Dung dịch nhỏ mắt.

CHỈ ĐỊNH

- Kiểm soát sự tiến triển của bệnh cận thị, kiểm tra đánh giá các trường hợp cận thị giả,...
- Mỏi mắt do điều tiết quá mức,...

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không sử dụng **Mytro-5 plus** cho bệnh nhân mắc bệnh tăng nhãn áp nguyên phát hoặc có xu hướng về bệnh tăng nhãn áp (như người có góc tiền phòng hẹp...) Người bệnh có tiền sử quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của **Mytro-5 plus**

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Đối tượng sử dụng:

Người lớn/trẻ em mắc cận thị và có tiến triển cận thị.

Mytro-5 plus kiểm soát tốt và làm chậm tiến triển của bệnh cận thị ở trẻ em. Liều dùng thông thường, mỗi ngày nhỏ vào mỗi mắt 1 đến 2 giọt trước khi đi ngủ. (Thời điểm nhỏ mắt như vậy giúp Người bệnh tránh được tác dụng không mong muốn). Liều dùng có thể thay đổi trên từng cá nhân theo sự chỉ định của bác sĩ nhãn khoa.

Bạn nên làm gì nếu quên một liều?: Nếu bạn quên một liều dùng, hãy sử dụng càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, nếu gần với liều kế tiếp, hãy bỏ qua liều đã quên và dùng liều kế tiếp vào thời điểm như kế hoạch. Không dùng gấp đôi liều đã quy định.

KHUYẾN CÁO VÀ THẬN TRỌNG

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Không sử dụng trong các trường hợp sau:

- Dung dịch bị đổi màu hoặc bị mờ đục.

Khi sử dụng dung dịch cần lưu ý:

- Không chạm đầu lọ nhỏ vào bất kỳ bề mặt nào để tránh lây nhiễm bẩn.
- Đậy nắp sau mỗi lần sử dụng.
- Không dùng dung dịch này khi đang mang kính sát tròng.

Ngưng Mytro-5 plus trong các trường hợp sau:

- Đỏ và ngứa mắt kéo dài ngày càng nặng lên hoặc kéo dài 72h.

TÁC ĐỘNG TRÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Cũng như bất cứ loại dung dịch nhỏ mắt nào khác, nhìn mờ tạm thời hoặc các thay đổi về thị lực có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. Nếu bị nhìn mờ sau khi nhỏ **Mytro-5 plus** Người bệnh cần chờ cho tới khi nhìn rõ lại mới được làm các công việc trên.

SỬ DỤNG MYTRO-5 PLUS CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Atropine đi qua nhau thai (nhưng chưa xác định được nguy cơ độc đối với thai nhi). Trẻ sơ sinh rất nhạy cảm với Atropine, cần thận trọng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Atropine thuộc nhóm B đối với thai kỳ theo Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA)

- A: Không có nguy cơ;
- B: Không có nguy cơ trong vài nghiên cứu;
- C: Có thể có nguy cơ;
- D: Có bằng chứng về nguy cơ;
- X: Chống chỉ định;
- N: Vẫn chưa biết;

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

1. Tác động cấp tính: các tác dụng không mong muốn như mạch nhanh, thay đổi tính khí, khô miệng, bí tiểu, táo bón, hoặc ban đỏ da luôn được báo cáo với các Atropine nồng độ cao nhưng với nồng độ thấp 0.05% là rất ít gặp.

2. Với nồng độ Atropine rất nhỏ chỉ 0.05% giúp hạn chế tối đa tác dụng không mong muốn của Atropine lên mắt, tác dụng không mong muốn được ghi nhận là: nhìn mờ, kích ứng tại chỗ, viêm da dị ứng và viêm kết mạc dị ứng.

Chú ý: Ngưng sử dụng và thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng Mytro-5 plus

BẢO QUẢN

Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30°C. Chỉ sử dụng khi còn nguyên niêm phong. Hủy bỏ phần còn lại trong lọ khi mở lọ được 60 ngày.

Để xa tầm tay trẻ em**HẠN DÙNG**

1. 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
2. Hạn dùng sau khi mở lọ: 60 ngày
3. Ngày sản xuất và hạn dùng: xem chi tiết trên sản phẩm.
4. Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng.

ĐÓNG GÓI

Hộp 1 lọ chứa 10 ml dung dịch, không chất bảo quản.



NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI
Công ty TNHH Vật Tư Y Tế Đỗ Trần

Exported by:
SciPrec Lifesciences
Plot No 6/D/P, Godown No.12,
Opp. Anand Tiles, Ambavadi, G.I.D.C
Estate, Wadhwan City-363035,
Dist: Surendranagar, Gujarat, India.