

MẪU NHÃN

9/136

1. Nhãn trên lọ 15ml.



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 24/9/2012

2. Nhãn trên hộp giấy x 1 lọ



Đà Nẵng ngày 16 tháng 04 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC



DR. Nguyễn Quang Trí, MBA

CỤC
ĐÃ
Lần đầu



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

THUỐC NHỎ MẮT Rx **NALEXVA**

(THUỐC BÁN THEO ĐƠN)

THÀNH PHẦN : Mỗi lọ 15ml có chứa :

- Dikali glycyrrhizinat..... 13,5 mg
- Natri clorid.....33,0 mg
- Tá dược (Borneol , Cremophor, Propylenglycol, Thiomersal, Natri tetraborat, Acid boric, nước cất) vừa đủ..... 15 ml

DƯỢC LỰC HỌC

- Dikali glycyrrhizinat có tính kháng viêm nhẹ, hữu hiệu trong việc phòng ngừa các bệnh về mắt.
- Natri clorid có tính chống kích ứng và sát trùng nhẹ.
- Nalexva được bào chế với hệ tá dược thích hợp để đảm bảo hoạt tính ổn định, tác dụng nhanh và kéo dài. Nalexva không gây kích ứng với niêm mạc.

DƯỢC ĐỘNG HỌC: không có thông tin

CHỈ ĐỊNH : Chống mỏi mắt, ngứa mắt, khô rát mắt, bụi bẩn, gèn ri mắt. Phòng ngừa dịch bệnh đau mắt...

CHỐNG CHỈ ĐỊNH :

- Quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG : Dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ hoặc theo liều trung bình sau:

Nhỏ vào mắt 1-2 giọt/ lần. Ngày nhiều lần.

TÁC DỤNG NGOẠI Ý: Có thể gây phản ứng nhạy cảm về da - kết mạc.

Thông báo cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

TƯƠNG TÁC THUỐC

Không có thông tin về tương tác thuốc. Tuy nhiên, để tránh khả năng xảy ra tương tác, tốt nhất không nên dùng chung thuốc nhỏ mắt NALEXVA với các thuốc nhỏ mắt khác.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Không có thông tin.

THẬN TRỌNG

- Không để mi mắt chạm vào miệng lọ để tránh nhiễm trùng hoặc làm vẩn đục dung dịch do các chất tiết hoặc mầm vi sinh vật.
- Không dùng thuốc bị chuyển màu.

KHUYẾN CÁO :

- **Không dùng thuốc quá 15 ngày sau khi mở nắp.**
- Không dùng thuốc quá hạn ghi trên hộp, hoặc thuốc có nghi ngờ về chất lượng như: vẩn đục, có vật lạ, nấm mốc....
- Không dùng quá liều chỉ định.
- *Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin về thuốc, xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ.*

TRÌNH BÀY VÀ BẢO QUẢN

- Thuốc đóng trong lọ nhựa 15ml, hộp 1 lọ có kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng.
- Để thuốc nơi khô mát, tránh ánh sáng. Nhiệt độ 15°C-30°C. **ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.**
- Hạn dùng : 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS



BỘ Y T
UẢN LÝ
HỆ D

Thuốc được sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

253 - Dũng Sĩ Thanh Khê - TP Đà Nẵng

Tel: 0511.3760130

Fax: 0511.3760127

Email: info@danapha.com

Điện thoại tư vấn : 0511.3760131

Và phân phối trên toàn quốc

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Nguyễn Quang Trí, MBA



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh

