

Thuốc xịt mũi
NASAZELA MT
(Azelastine HCl 0.1%)

KT: 29 x 45 (mặt) x 110mm

Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc xịt mũi
NASAZELA MT
(Azelastine HCl 0.1%)



Thành phần:
Azelastin hydroclorid
0.1%
Tá dược vừa đủ

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:
xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

Tiêu chuẩn: TCCS

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. Không đông lạnh

SDK:

*Đề xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

Lô SX:
NSX:
HSD:

Box of a 10ml bottle

Nasal spray
NASAZELA MT
(Azelastine HCl 0.1%)



Nhà phân phối:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM THANH NGÂN
ĐT: 0983 414 368

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA
Trụ sở chính:
Số 9, Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa điểm sản xuất:
NHÀ MÁY DƯỢC PHÂM DKPHARMA - Chi nhánh Bắc Ninh
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA
Địa chỉ: Lô III-1.3, đường D3, KCN Quế Võ 2, xã Ngọc Xã, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Lọ 10ml

Thuốc xịt mũi
NASAZELA MT
(Azelastine HCl 0.1%)



Thành phần:
Azelastin hydroclorid 0.1%
Tá dược vừa đủ

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. Không đông lạnh

SDK:

Lô SX:
NSX:
HSD:

Nhà phân phối:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM THANH NGÂN

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA
Trụ sở chính:
Số 9, Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thuốc xịt mũi
NASAZELA MT
(Azelastine HCl 0.1%)



GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG
Hoàng Sỹ Đường

Thuốc xịt mũi

NASAZELA MT

(Azelastine HCl 0.1%)

Hộp 1 lọ 15ml

Thuốc xịt mũi

NASAZELA MT

(Azelastine HCl 0.1%)




Box of a 15ml bottle

Nasal spray

NASAZELA MT

(Azelastine HCl 0.1%)



Thành phần:
Azelastin hydroclorid
0.1%
Tá dược vừa đủ

Chỉ định, cách dùng,
chống chỉ định và
các thông tin khác:
xem trong tờ hướng
dẫn sử dụng thuốc
kèm theo

Tiêu chuẩn: TCCS

Bảo quản: Nơi khô
ráo, tránh ánh sáng,
nhiệt độ không quá
30°C. Không đông
lạnh

SDK:

Đề xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử
dụng trước khi dùng

Lô SX:
NSX:
HSD:

Nhà phân phối:
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
THANH NGÂN
ĐT: 0983 414 368

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC KHOA
Trụ sở chính:
Số 9, Nguyễn Công
Trứ, Phạm Đình Hổ,
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa điểm sản xuất:
NHÀ MÁY DƯỢC
PHẨM DKPHARMA -
Chi nhánh Bắc Ninh
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC KHOA
Địa chỉ: Lô III-1.3,
đường D3, KCN Quế
Võ 2, xã Ngọc Xá,
huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh

Lọ 15ml

Thuốc xịt mũi

NASAZELA MT

(Azelastine HCl 0.1%)



Thành phần:
Azelastin hydroclorid 0.1%
Tá dược vừa đủ

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng,
nhiệt độ không quá 30°C. Không đông lạnh

SDK:

Lô SX:
NSX:
HSD:

Nhà phân phối:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM THANH NGÂN

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA
Trụ sở chính:
Số 9, Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thuốc xịt mũi

NASAZELA MT

(Azelastine HCl 0.1%)



GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG
Hoàng Sỹ Đường

Thuốc xịt mũi

NASAZELA MT

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

THÀNH PHẦN:

Thành phần dược chất: Azelastin hydroclorid 0,1%

Thành phần tá dược: Hypromellose (HPMC E6), Dinatri edetat, Acid citric monohydrat, Dinatri hydrophosphat. $12\text{H}_2\text{O}$, Natri clorid, Benzalkonium clorid, Sucralose, Acid hydrocloric, Natri hydroxyd, Nước tinh khiết vừa đủ.

DẠNG BẢO CHẾ:

Dung dịch xịt mũi. Dung dịch trong suốt, không màu.

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị cả viêm mũi dị ứng theo mùa (ví dụ như dị ứng phấn hoa hay sốt cỏ khô) và viêm mũi dị ứng mạn tính ở bệnh nhân từ 6 tuổi trở lên.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG:

Liều dùng:

Người lớn và trẻ từ 6 tuổi trở lên:

Xịt một nhát xịt (0,14 ml) vào mỗi bên mũi x 2 lần/ngày (0,56 mg Azelastine hydroclorid).

Người cao tuổi: hiện chưa có nghiên cứu nào tiến hành trên người cao tuổi.

Cách dùng:

Đường dùng của chế phẩm là dùng tại chỗ ở niêm mạc mũi.

- Lắc lọ thuốc vài lần, mở nắp bảo vệ.
- Dùng tay ấn vào nắp lọ, xịt thử trong không khí sau đó mới xịt vào mũi đồng thời hít nhẹ để thuốc đi sâu vào trong khoang mũi.
- Đậy nắp bảo vệ sau mỗi lần dùng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Các trường hợp quá mẫn với azelastine hydroclorid, với các thành phần khác của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

Sản phẩm có chứa Benzalkonium clorid có thể gây kích ứng hoặc phù bên trong mũi, đặc biệt khi dùng thuốc trong thời gian dài.



SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Thử nghiệm trên động vật khi dùng đường uống ở liều cao (gấp 500 lần liều đề xuất cho đường uống dùng hàng ngày ở người), thấy xuất hiện tử vong thai nhi, chậm phát triển và tăng tỷ lệ dị tật xương.

Do chế phẩm sử dụng liều thấp và đường dùng tại chỗ ở mũi, nên tác dụng toàn thân là rất nhỏ. Tuy nhiên, giống như tất cả các thuốc khác, cần thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC:

Tương tác của thuốc

Chưa có tương tác cụ thể nào được nghiên cứu.

Tương kỵ của thuốc

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

Những tác dụng không mong muốn đã được báo cáo với tần suất như sau:

Thường gặp (1-10%): có thể cảm thấy vị đắng đặc trưng sau khi dùng (thường là do cách sử dụng không chính xác, cụ thể là nghiêng đầu quá xa trong khi dùng), trong một số trường hợp hiếm hoi có thể thấy buồn nôn.

Ít gặp (0,1-1%): có thể xảy ra kích ứng nhẹ, thoáng qua của niêm mạc mũi với các triệu chứng như: ngứa, hắt hơi, chảy máu cam.

Rất hiếm gặp (<0,01%): phản ứng quá mẫn (phát ban, ngứa, nổi mề đay) đã được báo cáo.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Quá liều

Kết quả nghiên cứu trên động vật cho thấy quá liều có thể gây ra các triệu chứng trên thần kinh trung ương, ví dụ: kích thích, run, co giật. Nếu hiện tượng này xảy ra ở người, cần điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ vì không có thuốc giải độc đặc hiệu. Rửa dạ dày được khuyến khích sử dụng nếu việc dùng quá liều vừa mới xảy ra.

Phản ứng quá liều khi sử dụng thuốc qua đường mũi không được dự đoán trước.

Cách xử trí khi dùng thuốc quá liều

Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 lọ 10 ml. Hộp 1 lọ 15ml. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng.

HẠN DÙNG CỦA THUỐC: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Không sử dụng quá 30 ngày kể từ ngày mở nắp đầu tiên.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCCS

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Không đông lạnh.

CƠ SỞ ĐĂNG KÝ VÀ SẢN XUẤT THUỐC:

Công ty cổ phần Dược Khoa

Trụ sở chính: Số 9, Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3972 8754 / (024) 39332607. Fax: (024) 3972 8753

Địa điểm sản xuất: Nhà máy dược phẩm DKPharma – Chi nhánh Bắc Ninh công ty cổ phần Dược Khoa: Lô III-1.3, đường D3, KCN Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

CÔNG TY PHÂN PHỐI:

Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm Thanh Ngân

Điện thoại: 0983 414 368

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2025

TUQ. TÔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC KHOA
GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG
Hoàng Sỹ Đường

