

Thuốc xịt mũi

Hướng dẫn sử dụng

Nozeytin

GMP - WHO

(Azelastin hydroclorid 0,1%)

■ **THÀNH PHẦN:** Mỗi lọ 15ml chứa:

Azelastin hydroclorid.....15mg
Tá dược (Benzalkonium clorid, acid citric khan, dinatri hydro phosphat dodecahydrat, dinatri edetat, surcalose, hypromellose 2900, natri clorid, nước tinh khiết) vừa đủ..... 15ml.

■ **DƯỢC LỰC HỌC:**

NOZEYTIN chứa Azelastin hydroclorid là 1 chất tác dụng kháng histamin. Ngoài tác dụng kháng histamin do gắn vào thụ thể H1, qua đó có tác dụng làm giảm sự co cơ trơn, làm mất tác dụng giãn mạch và tăng tính thấm thành mạch của histamin lên mao mạch, còn ức chế giải phóng chất trung gian gây viêm từ tế bào mast. Vì vậy, Azelastin được sử dụng tại chỗ trong giảm triệu chứng của bệnh dị ứng bao gồm cả viêm mũi dị ứng và viêm kết mạc dị ứng. Azelastin cũng được sử dụng trong điều trị viêm mũi không dị ứng.

■ **DƯỢC ĐỘNG HỌC:**

Khoảng 40% liều sử dụng qua đường mũi của Azelastin vào được hệ tuần hoàn cơ thể.

Azelastin chuyển hóa qua gan, chất chuyển hóa chính Demethyl azelastin có hoạt động kháng histamin.

Azelastin và chất chuyển hóa của nó bài tiết chủ yếu qua phân và nước tiểu.

■ **CHỈ ĐỊNH:**

- Điều trị triệu chứng của bệnh viêm mũi dị ứng như sổ mũi, hắt hơi, ngứa mũi.

- Điều trị các triệu chứng của bệnh viêm mũi vận mạch, nghẹt mũi.

- Điều trị các triệu chứng của viêm xoang mũi.

■ **LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**

- Để điều trị viêm mũi dị ứng:

+ Trẻ em từ 5-12 tuổi : Xịt mỗi bên mũi 1 lần x 2 lần/ngày

+ Người lớn: Xịt mỗi bên mũi 1-2 lần x 2 lần/ngày

- Để điều trị viêm mũi không dị ứng: Dùng ở người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, xịt mỗi bên mũi 2 lần x 2 lần/ngày.

■ **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

- Trẻ em dưới 05 tuổi.

■ **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

Phản ứng phụ ít khi xảy ra khi dùng tại chỗ ở liều điều trị. Một số

tác dụng không mong muốn thường gặp nhưng thoáng qua như :

- Kích ứng niêm mạc nơi tiếp xúc, khô niêm mạc mũi
 - Phản ứng sung huyết trở lại có thể xảy ra khi dùng dài ngày
- « Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc »

■ **THẬN TRỌNG:**

-Thận trọng khi sử dụng cho người bị cường giáp, bệnh tim, tăng huyết áp, xơ cứng động mạch, phì đại tuyến tiền liệt, đái tháo đường, người đang dùng các chất ức chế monoamin oxydase.

-Không nên dùng thuốc nhiều lần và dùng liên tục để tránh sung huyết trở lại. Khi dùng thuốc liên tục 3 ngày không đỡ cần ngừng thuốc và đi khám bác sĩ.

■ **SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

-Thời kỳ mang thai: chưa rõ tác dụng của thuốc lên bào thai nên chỉ sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai khi cần thiết.

-Thời kỳ cho con bú: Chưa rõ Azelastin có bài tiết vào sữa mẹ hay không.

■ **TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC ĐỐI VỚI NGƯỜI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:**

Thận trọng khi sử dụng Azelastin xịt mũi khi lái xe hay vận hành máy móc do đã có báo cáo rằng thuốc có thể gây buồn ngủ, dù rất ít gặp.

■ **TƯƠNG TÁC THUỐC:**

Sử dụng đồng thời Azelastin xịt mũi với rượu hoặc thuốc ức chế thần kinh trung ương có thể gây giảm sự tỉnh táo hoặc giảm tác dụng của thuốc ức chế thần kinh trung ương.

■ **QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:** Chưa có báo cáo.

■ **QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 1 lọ x 15ml, kèm tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

■ **BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

■ **HẠN DÙNG:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất in trên bao bì sản phẩm. Không dùng thuốc đã biến màu, hết hạn sử dụng.

■ **TIÊU CHUẨN:** Tiêu chuẩn cơ sở.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ**

Sản xuất tại:

**CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT
DƯỢC PHẨM MERACINE**

Đường YP6, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Đông Phong,
huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

ĐT: 0222.3699285 * Fax: 0222.3699286

E-mail: info@meracinemfg.com

Website: <https://meracinemfg.com/>

