

BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT  
Lần đầu: 27/02/2019

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

**Chỉ định:** Sát khuẩn, tẩy uế, rửa vết thương, mụn nhọt đã vỡ; viêm tai, răng, miệng.

**Chống chỉ định:** Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc. Không nhỏ thuốc vào những khoang kín của cơ thể.

**Liều dùng, cách dùng:**

- Dùng rửa bên ngoài vết thương, vết loét.
- Súc miệng: 10ml/lần, ít nhất một phút trước khi nhổ ra. Có thể súc miệng tới 4 lần mỗi ngày (sau khi ăn và trước khi đi ngủ). Không dùng quá 7 ngày.



**Bảo quản:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.  
**Tiêu chuẩn:** ĐENVN IV

**Số lô sx:**

**NSX:**

**HD:**

# NƯỚC OXY GIÀ 3%

Chai 20ml

**Thành phần:**

Hydrogen peroxid (50%).....1,2g  
Nước tinh khiết.....vừa đủ 20ml

**SDK:**.....

**Cơ sở sản xuất:**  
**C. TY CP DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG**  
Số 102 Phố Chí Linh, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, HD



18001107  
Số điện thoại liên hệ

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM/ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

## MẪU NHÃN SẢN PHẨM



**Chỉ định:** Sát khuẩn, tẩy uế, rửa vết thương, mụn nhọt đã vỡ; viêm tai, răng, miệng.

**Chống chỉ định:** Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc. Không nhỏ thuốc vào những khoang kín của cơ thể.

**Liều dùng, cách dùng:**

- Dùng rửa bên ngoài vết thương, vết loét.
- Súc miệng: 10ml/lần, ít nhất một phút trước khi nhổ ra. Có thể súc miệng tới 4 lần mỗi ngày (sau khi ăn và trước khi đi ngủ). Không dùng quá 7 ngày.



*Dùng dịch dùng ngoài*

# NƯỚC OXY GIÀ 3%

Chai 50ml

**Thành phần:**

Hydrogen peroxid (50%).....3,0g

Nước tinh khiết.....vừa đủ 20ml

**Bảo quản:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.  
**Tiêu chuẩn:** ĐEVN IV

**Số lô sx:**

**NSX:**

**HD:**



Cơ sở sản xuất:

**C. TY CP DƯỢC VITYT HÀI DƯƠNG**

Số 102 Phố Chí Linh, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, HD

SDK:.....

ĐỂ XÀ TẮM TAY TRẺ EM/ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**Tên thuốc: NƯỚC OXY GIÀ 3%**

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.*

### 1. Thành phần công thức thuốc:

<i>Thành phần hoạt chất:</i>	<i>Hàm lượng</i>
Hydrogen peroxyd (50%)	1,2g
<i>Thành phần tá dược:</i> Nước tinh khiết	Vừa đủ 20ml

**2. Dạng bào chế:** Dung dịch dùng ngoài. Dung dịch trong, không màu.

### 3. Chỉ định:

- Sát khuẩn, tẩy uế, rửa vết thương, mụn nhọt đã vỡ; viêm tai, răng, miệng.

### 4. Cách dùng, liều dùng:

- Dùng rửa bên ngoài vết thương, vết loét.

- Súc miệng: 10ml/lần, ít nhất một phút trước khi nhổ ra. Có thể súc miệng tới 4 lần mỗi ngày (sau khi ăn và trước khi đi ngủ). Không dùng quá 7 ngày.

### 5. Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.

- Không nhỏ thuốc vào những khoang kín của cơ thể.

### 6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- Không nên sử dụng cho những vết thương đang lành vì gây tổn thương mô.

- Thận trọng khi sử dụng hydrogen peroxide để thực rửa đại tràng vì đã thấy tắc mạch do khí, vỡ đại tràng hoặc viêm ruột hoại tử. Cũng đã thấy tổn thương tại chỗ niêm mạc đại – trực tràng khi tháo thực.

- Không nên sử dụng để rửa hoặc súc miệng trong thời gian dài. Không dùng quá 7 ngày nếu không có chỉ định của bác sĩ.

### 7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú. Chỉ dùng khi thật cần thiết.

### 8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

### 9. Tương tác thuốc, tương kỵ của thuốc:

Không để dung dịch nước oxy già tiếp xúc với những chất oxy hóa hoặc chất khử vì tương kỵ hóa học và dẫn đến phân hủy.

### 10. Tác dụng không mong muốn của thuốc:





- Dung dịch nước oxy già có thể gây kích ứng bóng da và niêm mạc.
- Khi sử dụng nhắc lại nhiều lần, đặc biệt trong thời gian dài dung dịch nước oxy già làm thuốc súc miệng hoặc rửa miệng, có thể gây phì đại nhú lưỡi có thể hồi phục được (lưỡi có lông).
- Sẽ nguy hiểm khi nhỏ nước oxy già vào những khoang kín của cơ thể, do oxy già phóng ra không có đường thoát. Rửa đại tràng bằng dung dịch hydrogen peroxid đã gây tắc khí mạch, vỡ đại tràng, viêm trực tràng, viêm loét đại tràng và hoại tử ruột.

## 11. Quá liều và cách xử trí:

### 11.1. Quá liều:

- Nuốt phải một lượng nhỏ dung dịch thuốc thường chỉ gây rối loạn tiêu hóa nhẹ.
- Uống một lượng lớn dịch thuốc có thể thấy tai biến, thậm chí tử vong. Kích ứng đường tiêu hóa như nôn, buồn nôn, sùi bọt mép, nôn ra máu có thể xuất hiện.

### 11.2. Xử trí:

Tham vấn nhân viên y tế khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo.

## 12. Đặc tính dược lực học

- Nhóm tác dụng dược lý: Thuốc tẩy uế, sát trùng.
- Mã ATC: D08AX01

Hydrogen peroxyd làm một chất oxy hóa, có tác dụng sát trùng, tẩy uế, làm sạch vết thương và khử mùi. Thuốc có hoạt tính kháng khuẩn yếu, kháng virus (kể cả HIV) và cầm máu nhẹ. Tác dụng của hydrogen peroxyd là do khi tiếp xúc với mô có chứa enzyme catalase, hydrogen peroxid sẽ giải phóng ra oxygen mới sinh có tính oxy hóa mạnh, làm phá hủy một số vi sinh vật gây hại, tác dụng cơ học của sùi bọt đã loại bỏ mảnh vụn của mô và loại bỏ mù để làm sạch vết thương. Giải phóng oxygen mới sinh và sùi bọt xảy ra nhanh hơn ở các vết thương, vùng da bị trầy, ở niêm mạc so với vùng da lành.

## 13. Đặc tính dược động học

Chưa có báo cáo.

## 14. Quy cách đóng gói:

Chai 20ml, chai 50ml.

## 15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

*Điều kiện bảo quản:* Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

*Hạn dùng:* 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

*Tiêu chuẩn chất lượng:* ĐĐVN

## 16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:

TRUNG TÂM THUỐC  
PH  
C  
V  
Y  
T  
H  
D  
U  
C  
H  
G

10/1/2017



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG**

*Đ/c: Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương*

ĐT: 02203.853.848

Fax: 02203.853.848



TUQ.CỤC TRƯỞNG  
P.TRƯỞNG PHÒNG  
*Nguyễn Ngọc Anh*



A small blue ink signature is located in the bottom right corner of the page.