



Omk2®

Lọ 10 ml e

Citicoline, Vitamin B12, Hyaluronic Acid

**Thành phần:**

Lọ 10ml có chứa:

Citicoline natri 0,2g;

Natri hyaluronat 0,02g;

Vitamin B12 (Cyanocobalamine) 0,005g;

Sodium phosphate monobasic monohydrate; Sodium phosphate dibasic dodecahydrate; Sodium chloride; Benzalkonium chloride; nước vô trùng.

**Mô tả sản phẩm OMK2®:**

Dung dịch nhỏ mắt vô trùng OMK2® đựng trong lọ 10ml.

OMK2® là dung dịch nhỏ mắt có chứa 2% Citicoline; 0,05% Vitamin B12 và 0,2% Acid hyaluronic trọng lượng phân tử cao.

Nhờ vào sự có mặt của Citicoline, OMK2® giúp khôi phục cấu trúc một cách hữu hiệu màng tế bào bị tổn thương do các bệnh lý thoái hóa, như bệnh võng mạc tiểu đường giảm thị lực.

Vitamin B12 giúp làm tăng sự phát triển của các tế bào biểu mô giác mạc cũng như bảo vệ các tế bào chống lại các gốc tự do.

Nhờ Acid hyaluronic và các đặc tính bám dính niêm mạc và đàn hồi nhờ độ nhớt, OMK2® có thể tạo môi trường vi mô thuận lợi cho các quá trình khôi phục bề mặt mắt trong trường hợp bị tổn thương giác mạc và biểu mô kết mạc, giúp cải thiện độ ổn định màng phim nước mắt và do đó duy trì bề mặt trơn cho mắt, tạo ẩm và bảo vệ mắt.

**Khi nào nên sử dụng OMK2®**

OMK2, nhờ sự có mặt của Citicoline và tác động của nó lên các tế bào hạch võng mạc, được chỉ định điều trị cho bệnh nhân bị bệnh võng mạc tiểu đường giảm thị lực.

Hơn nữa, nhờ vào sự có mặt của Vitamin B12, gián tiếp thúc đẩy các quá trình biểu mô hóa giác mạc sau phẫu thuật mắt, laser hoặc tẩy xước nhỏ trên bề mặt giác mạc.

Cuối cùng, tính chất tạo ẩm và bảo vệ của sản phẩm giúp làm giảm cảm giác kích ứng, nóng rát và có dị vật gây ra bởi các yếu tố môi trường, sử dụng lâu trước màn hình thiết bị điện tử.

**Sử dụng bao nhiêu và sử dụng như thế nào**

Nhỏ 1 giọt x 3 lần/ngày



**Thận trọng và Cảnh báo**

- Không sử dụng nếu lọ bị hư hỏng.
- Không sử dụng trong trường hợp mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Không sử dụng sau ngày hết hạn ghi trên bao bì.
- Tránh đầu lọ tiếp xúc vào mắt khi nhỏ mắt.
- Mờ mắt tạm thời có thể xảy ra sau khi nhỏ mắt. Nên đợi vài giây trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến việc quan sát.
- Đợi khoảng 10 - 15 phút sau khi sử dụng sản phẩm, sau đó mới sử dụng thuốc nhỏ mắt dùng tại chỗ khác.
- Sản phẩm sử dụng trong vòng 30 ngày sau khi mở nắp.
- Giữ sản phẩm tránh xa tầm với và tầm nhìn của trẻ em.
- Sản phẩm chỉ dùng cho nhỏ mắt.
- Bảo quản ở nhiệt độ dưới 25°C.
- Vứt lọ sau sử dụng đúng nơi quy định.
- Sản phẩm có chứa Benzalkonium chloride (0,01%).
- Benzalkonium chloride, ngay cả ở nồng độ thấp, có thể gây kích ứng mắt, đặc biệt ở những người bị khô mắt mãn tính hoặc bệnh giác mạc. Nếu gặp phải cảm giác bất thường, nóng rát hoặc đau sau khi sử dụng thuốc nhỏ mắt này, hãy liên hệ với bác sĩ.
- Trong trường hợp sử dụng kéo dài, những bệnh nhân bị khô mắt mãn tính hoặc bệnh giác mạc cần được theo dõi.
- Benzalkonium chloride có thể được hấp thụ bởi kính áp tròng mềm và có thể làm đổi màu. Nên tháo kính áp tròng trước khi sử dụng sản phẩm và đợi 15 phút trước khi đeo lại.
- Màu đỏ/hồng đậm của dung dịch là do sự hiện diện của cyanocobalamin (vitamin B12) và không phải là dấu hiệu cho thấy sản phẩm bị hư hỏng.

**Hạn dùng:** 36 tháng

**Nhà sản xuất:**

Omikron Italia S.r.l - Via Flaminia Nuova, 1068 - 00189 Rome - Italy.

**Ngày duyệt toa:** 03/2025

**Bằng sáng chế quốc tế và quốc gia**

