

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 01 / 4 / 2013

MẪU NHÃN

1. Nhãn gói 4 gam

THUỐC BỘT

Rx- Thuốc bán theo đơn

Phenxycap 1250

(Glucosamin.....1,25g)

Danapha
PHARMACEUTICAL JSC

Rx- Thuốc bán theo đơn

GMP-WHO

Phenxycap 1250
(Glucosamin.....1,25g)

Thành phần: Cho 1 gói
-Glucosamin.....1,25g
(Tương ứng với Glucosamin sulfat kali clorid 2,1g)
- Tá dược vừa đủ1 gói 4g

Chỉ định: Giảm triệu chứng của viêm khớp gối nhẹ và trung bình.

Liều dùng - Cách dùng, Chống chỉ định:
Xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản: Để thuốc nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng, Nhiệt độ dưới 30°C.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
XIN ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK:

CTY. CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
253 Đường Sĩ Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Ngày SX:
Số lô SX:
HD:



[Handwritten signature]

2. Nhấn hộp 30 gói x 4 gam



Đà Nẵng ngày 28 tháng 11 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đ.S. Mai Đăng Dấu



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC - ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

THUỐC BỘT
Rx PHENXYCAP 1250
(THUỐC BÁN THEO ĐƠN)

THÀNH PHẦN: Cho 1 gói:

- Glucosamin..... : 1,25 g
(Tương ứng với Glucosamin sulfat kali clorid 2,1g)
- Tá dược (mannitol, maltodextrin, natri metabisulfite, sucralose, acid citric khan, natri clorid) vừa đủ : 1 gói 4g

DƯỢC LỰC HỌC :

- Glucosamin tham gia quá trình chuyển hóa tổng hợp nên thành phần của sụn khớp. Nó là một amino- monosaccharide, nguyên liệu để tổng hợp proteoglycan, khi vào trong cơ thể nó kích thích tế bào ở sụn khớp tăng tổng hợp và trùng hợp nên cấu trúc proteoglycan bình thường. Kết quả của quá trình trùng hợp là muco- polysaccharide, thành phần cơ bản cấu tạo nên đầu sụn khớp. Glucosamin đồng thời ức chế các enzym phá hủy sụn khớp như collagenase, phospholipase A₂ và giảm các gốc tự do superoxide phá hủy các tế bào sinh sụn. Glucosamin còn kích thích sinh sản mô liên kết của xương, giảm quá trình mất calci của xương.
- Do Glucosamin làm tăng sản xuất chất nhầy dịch khớp nên tăng độ nhớt, tăng khả năng bôi trơn của dịch khớp. Vì thế glucosamin không những giảm triệu chứng của thoái khớp (đau, khó vận động) mà còn ngăn chặn quá trình thoái hóa khớp, ngăn chặn bệnh tiến triển.
- Đó là thuốc tác dụng vào cơ chế bệnh sinh của thoái khớp cả cấp và mãn tính, có đau hay không có đau, cải thiện chức năng khớp và ngăn chặn bệnh tiến triển, phục hồi cấu trúc sụn khớp.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Glucosamin sulfat dễ hấp thu qua đường uống (hơn 90% liều uống được hấp thu). Phân bố rộng rãi vào các tổ chức như gan, thận và sụn khớp. Liên kết với protein huyết tương và các mô khác trong cơ thể. Bị chuyển hóa lần đầu qua gan một phần đáng kể. Thải trừ 25% qua nước tiểu, 65% thải ra ngoài theo đường hô hấp ở dạng carbon dioxyl (Sau khi bị chuyển hóa), và khoảng 10 % được giữ lại trong mô.

CHỈ ĐỊNH :

- Giảm triệu chứng của viêm khớp gối nhẹ và trung bình.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Dùng theo liều chỉ định của Bác sĩ hoặc liều thường dùng :
Thuốc được uống 15 phút trước bữa ăn:
- Ngày uống 1 gói (hoà với 1 ly nước), dùng trong vòng 6 - 8 tuần.



Handwritten signature and date 9

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

THẬN TRỌNG:

- Tiền sử mẫn cảm với tôm cua và sản phẩm từ tôm cua.
- Cần theo dõi đường huyết thường xuyên trên bệnh nhân đái tháo đường.
- Thuốc dùng trong thời kỳ có thai cần thận trọng và có sự theo dõi của bác sĩ.
- Glucosamin là thuốc điều trị nguyên nhân nên tác dụng của thuốc có thể bắt đầu sau 1 tuần, vì vậy nếu đau nhiều có thể dùng thuốc giảm đau chống viêm trong những ngày đầu.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không dùng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú.

SỬ DỤNG THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không có nguy cơ nào được biết

TÁC DỤNG NGOẠI Ý:

- Hiếm gặp, nhìn chung rất nhẹ, thoáng qua : Táo bón, nôn mửa, tiêu chảy, đau vùng thượng vị, biếng ăn, tim đập nhanh, nhức đầu.

** Hãy báo ngay cho thầy thuốc tác dụng không mong muốn mà bạn gặp phải khi dùng thuốc.*

TƯƠNG TÁC THUỐC :

- Có thể làm tăng sự hấp thu tetracyclines.
- Giảm sự hấp thu penicillin, chloramphenicol.
- Làm giảm hiệu quả của doxorubicin, teniposide, etoposide.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Chưa có thông tin về trường hợp quá liều glucosamin, cần có những biện pháp hỗ trợ kịp thời và khẩn cấp nếu quá liều xảy ra.

KHUYẾN CÁO:

- Hãy thông báo ngay cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải trong thời gian dùng thuốc.

- *Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng.*
- *Nếu cần biết thêm thông tin xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ.*

TRÌNH BÀY VÀ BẢO QUẢN :

- Thuốc đóng trong hộp 30 gói $\times$ 4g, có kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng.
- Để thuốc nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.

- Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS

Thuốc được sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

253 - Dũng Sĩ Thanh Khê - TP Đà Nẵng

Tel: 0511.3760130

Fax: 0511.3760127


Tư vấn sức khỏe : 0511.3760131

Email: info@danapha.com

Và phân phối trên toàn quốc

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 11 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Mai Đăng Dấu

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh