


## MẪU NHÃN

1, Nhãn trên vỉ 10 viên :



Lô SX, HD :  
In chìm trên vỉ.

2. Nhãn trên hộp 6 vỉ x 10 viên :



Đà Nẵng ngày 28 tháng 12 năm 2011  
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Nguyễn Quang Trị, MBA

### 3. Hướng dẫn sử dụng thuốc :

| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>VIÊN NANG</b><br><b>PHENXYCAP 500</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| <b>Thành phần:</b> Cho 1 viên                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| -Glucosamin .....                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : 375 mg |
| ( Tương ứng Glucosamin sulfat kali clorid : 633,7 mg )                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| - Tá dược (Butylated hydroxytoluene, Talc, Magnesi stearat, Aerosil) vừa đủ .....                                                                                                                                                                                                                 | : 1 viên |
| <b>Tác dụng dược lý:</b><br>Glucosamin là một aminosaccharide tham gia quá trình tổng hợp glycosaminoglycan, thành phần cơ bản tạo nên sụn khớp.<br>Glucosamin làm tăng sinh chất nhầy dịch khớp nên tăng độ nhớt và khả năng bôi trơn của dịch khớp.                                             |          |
| <b>Chỉ định :</b><br>Giảm triệu chứng của viêm khớp gối nhẹ và trung bình.                                                                                                                                                                                                                        |          |
| <b>Liều dùng - Cách dùng :</b><br>Theo chỉ định của bác sĩ hoặc dùng liều trung bình cho người trên 18 tuổi: 4 viên/ngày, chia làm 3 lần (sáng: 1 viên, trưa: 1 viên, tối: 2 viên). Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị. |          |
| <b>Tác dụng ngoại ý:</b><br>- Hiếm gặp, nhìn chung rất nhẹ, thoáng qua : Táo bón, nôn mửa, tiêu chảy, đau vùng thượng vị, biếng ăn, tim đập nhanh, nhức đầu.<br><i>* Thông báo cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn khi sử dụng thuốc</i>                                                      |          |
| <b>Chống chỉ định:</b><br>Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.                                                                                                                                        |          |
| <b>Tương tác thuốc:</b> chưa có thông tin về tương tác thuốc.                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| <b>Thận trọng :</b><br>- Thuốc dùng trong thời kỳ có thai cần thận trọng và có sự theo dõi của bác sĩ.<br>- Glucosamin là thuốc điều trị nguyên nhân nên tác dụng của thuốc có thể bắt đầu sau 1 tuần, vì vậy nếu đau nhiều có thể dùng thuốc giảm đau chống viêm trong những ngày đầu.           |          |
| <b>Sử dụng quá liều :</b><br>Chưa có thông tin về trường hợp quá liều glucosamin. cần có những biện pháp hỗ trợ kịp thời và khẩn cấp nếu quá liều xảy ra.                                                                                                                                         |          |
| <b>Khuyến cáo:</b><br>- Không dùng thuốc quá hạn ghi trên hộp, hoặc có nghi ngờ về chất lượng của thuốc.<br>- <i>Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ.</i>                                                                          |          |
| <b>Trình bày và bảo quản:</b><br>- Thuốc đóng trong hộp 6 vỉ x 10 viên nang, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.<br>- Để thuốc nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ 15°C-30°C. <b>ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.</b><br>- Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất. <b>Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS</b>          |          |
| <b>Thuốc được sản xuất tại:</b><br><b>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA</b><br>253 - Dũng Sĩ Thanh Khê - TP Đà Nẵng<br>Tel: 0511.3760130 Fax: 0511.3760127 Email: <a href="mailto:Info@danapha.com">Info@danapha.com</a><br>Số điện thoại tư vấn: 0511.3760131<br><b>Và phân phối trên toàn quốc</b>   |          |

Ngày 28 tháng 12 năm 2011

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*ĐS. Nguyễn Quang Trị, MBA*