



Nhãn lọ 50 ml



Thành phần
Natri clorid.....0,9%

Chỉ định, chống chỉ định và các thông tin khác
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Bảo quản
Trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn chất lượng: NSX

SĐK:
Số lô sản xuất và hạn dùng
Xin xem đáy chai

Cách dùng

1. Đưa nhẹ vòi phun vào mũi cho vừa khít
2. Ấn nhanh gọn vòi phun
3. Để dung dịch dư kéo theo chất nhầy chảy ra ngoài và hỉ mũi
4. Làm lại động tác với mũi bên kia
5. Rửa sạch vòi phun bằng xà bông và lau khô

Liều dùng

- Người lớn và trẻ em từ 3 tuổi trở lên:
Nhấn vòi phun 6 - 8 lần vào mỗi bên mũi theo nhu cầu hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ.
- Trẻ em dưới 3 tuổi:
Nhấn vòi phun 1 - 2 lần vào mỗi bên mũi theo nhu cầu hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em

50 ml

 **Nhà sản xuất:**
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,
Xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Lodate in ở đáy lọ dưới dạng:

LSX: nmmmyy
HD: dd.mm.yy

Nhãn hộp lọ 100 ml





Nhấn lọ 100 ml



**SALY
SPRAY**

khuyến diệt

Nasal
hygiene

Thành phần
Natri clorid.....0,9%

Chỉ định, chống chỉ định và các thông tin khác
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo

Bảo quản
Trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn chất lượng: NSX

SDK:
Số lô sản xuất và hạn dùng
Xin xem đáy chai

Cách dùng

1. Đưa nhẹ vòi phun vào mũi cho vừa khít
2. Ấn nhanh gọn vòi phun
3. Để dung dịch du kéo theo chất nhầy chảy ra ngoài và hỉ mũi
4. Làm lại động tác với mũi bên kia
5. Rửa sạch vòi phun bằng xà bông và lau khô

Liều dùng


- Người lớn và trẻ em từ 3 tuổi trở lên:
Nhấn vòi phun 6 - 8 lần vào mỗi bên mũi theo nhu cầu hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ
- Trẻ em dưới 3 tuổi:
Nhấn vòi phun 1 - 2 lần vào mỗi bên mũi theo nhu cầu hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em

100 ml

 **Nhà sản xuất:**
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,
Xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Lodate in ở đáy lọ dưới dạng:



SALY SPRAY

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng



Thành phần

Mỗi ml chứa:

Thành phần hoạt chất:

Natri clorid 0,9%

Thành phần tá dược: Dinatri hydrophosphat, natri dihydrophosphat, dinatri edetat, benzalkonium clorid, hương khuynh diệp, glycerin, nước tinh khiết.

Dạng bào chế

Dung dịch xịt mũi

Mô tả: Dung dịch trong suốt, không màu

pH: 5,0 - 8,0

Chỉ định

Mang lại cảm giác dễ chịu tức thì và sáng khoái cho đường mũi khi bị tắc nghẽn hoặc khô, kích ứng do cảm lạnh, dị ứng, hút thuốc, ô nhiễm không khí, không khí khô và khi đi máy bay, cũng như khi sử dụng thuốc thông mũi/thuốc xịt steroid.

Liều dùng và cách dùng

Liều dùng

Người lớn và trẻ em từ 3 tuổi trở lên:

Nhấn vòi phun 6 - 8 lần vào mỗi bên mũi theo nhu cầu hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Trẻ em dưới 3 tuổi:

Nhấn vòi phun 1 - 2 lần vào mỗi bên mũi theo nhu cầu hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Cách dùng

Đưa nhẹ vòi phun vào mũi cho vừa khít, ấn nhanh gọn vòi phun, để dung dịch dư kéo theo chất nhầy chảy ra ngoài và hỉ mũi. Làm lại động tác với mũi bên kia. Rửa sạch vòi phun bằng xà bông và lau khô.

Việc sử dụng chung dụng cụ này với nhiều người có thể làm lây lan bệnh truyền nhiễm.

Chống chỉ định

Không có thông tin.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

Benzalkonium clorid có thể gây kích ứng hoặc sưng bên trong mũi, đặc biệt là nếu sử dụng lâu dài.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú



Nếu đang mang thai hoặc cho con bú, hãy hỏi ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc

Tương tác, tương kỵ thuốc

Tương tác thuốc

Chưa có nghiên cứu về tương tác thuốc.

Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những thuốc đang sử dụng.

Tương kỵ của thuốc

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác

Tác dụng không mong muốn của thuốc

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ khi gặp các tác dụng không mong muốn như trên khi sử dụng thuốc hoặc báo cáo các phản ứng có hại của thuốc về Trung tâm Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (ADR) Quốc Gia. Địa chỉ: 13 - 15 Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Điện thoại: 024.3.9335.618; Fax: 024.3.9335642; Email: di.pvcenter@gmail.com

Quá liều và cách xử trí

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Quy cách đóng gói

Hộp 1 lọ 50 ml

Hộp 1 lọ 100 ml

Bảo quản

Trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: NSX



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

HSBS 4: 04/2025