

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dung dịch nhãn khoa

SoloVit - Ultra

Thành phần: Taurine 0,5%, Sodium hyaluronate 0,2%, Vitamin B12, Acid boric, Disodium tetraborate decahydrate, Disodium edetate, Sodium chloride, Benzalkonium chloride, Sodium hydroxyd, Nước để pha thuốc tiêm.

Mục đích sử dụng:

SoloVit-Ultra có tác dụng hỗ trợ chống viêm, làm ẩm và bảo vệ biểu mô giác mạc trong:

- Phẫu thuật mắt, chấn thương mắt, xước và loét giác mạc, loạn dưỡng giác mạc, thoái hóa võng mạc do tiểu đường, viêm kết mạc, viêm giác mạc, đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp.
- Các trường hợp khô mắt cấp hoặc sau phẫu thuật, khô mắt do thiết bị điện tử.
- Hạn chế tật cận thị ở trẻ em.

Hướng dẫn sử dụng:

Nhỏ 1-2 giọt vào mỗi mắt, 3-4 lần mỗi ngày. Hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

Thông tin cảnh báo:

- Thông báo cho cán bộ y tế những tác dụng phụ nếu có khi sử dụng sản phẩm.
- Không nên sử dụng đồng thời với các dung dịch nhỏ mắt khác, nếu có nên sử dụng trước hoặc sau 5-10 phút.
- Do dung dịch có độ nhớt cao để duy trì độ ẩm cho mắt, nên sau khi nhỏ mắt có tình trạng mờ trong chốc lát.

Chống chỉ định:

Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng trực tiếp. Để xa tầm tay trẻ em.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 30 ngày sau khi mở nắp.

Quy cách đóng gói: Lọ 2 ml, 5 ml, 10 ml, 13 ml, 15 ml. Hộp 1 lọ.

Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương,
tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Phân phối và sở hữu số lưu hành TTBYT:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ SOLOPHARM VIỆT NAM

Số 100 Lô A3, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai,
TP. Hà Nội, Việt Nam

Số lưu hành TTBYT:

Người đại diện hợp pháp của cơ sở