

MẪU NHÃN



I. Mẫu nhãn gói:

THÀNH PHẦN: Mỗi gói 5g chứa:
Sorbitol.....5g

CHỈ ĐỊNH: Thuốc này được chỉ định ở người lớn để điều trị táo bón không thường xuyên và các trường hợp khó tiêu (chậm tiêu hóa, đầy bụng).

CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: (Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo).

Tiêu chuẩn: TCCS

ĐỂ XÁT TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
BẢO QUẢN NƠI KHÔ, NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C,
TRÁNH ÁNH SÁNG.

THÀNH PHẦN: Mỗi gói 5g chứa:
Sorbitol.....5g

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG

Thuốc bột

Sorbitol VIDIPHA®

Sorbitol 5g

VIDIPHA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

Thuốc bột

Sorbitol VIDIPHA®

Sorbitol 5g

VIDIPHA

Số lô sản xuất, hạn dùng
đập nổi trên vỉ



Sorbitol 5g

Sorbitol VIDIPHA®

Hộp 25 gói x 5g

Thuốc bột

Thuốc bột

Hộp 25 gói x 5g

Sorbitol VIDIPHA®
Sorbitol 5g

— cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPA
Địa chỉ: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM TRUNG ƯƠNG
VIDIPA BÌNH DƯƠNG

WIDIPHA BÌNH DƯƠNG
Thư phố Tân Bình, phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: (028) 38440106
Email: vanthuwidipha.com.vn

email: vanthuvaidipha.com.vn



ВІСНИК НА

SDK:

Tiêu chuẩn: TCCS

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
BẢO QUẢN NƠI KHÔ, NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C. TRÁNH ÁNH SÁNG**

XST

XSN

DSH

Thuốc bột

Hộp 25 gói x 5g

Sorbitol VIDIPHA®
Sorbitol 5g

Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
Địa chỉ: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
VIDIPHA BÌNH DƯƠNG

VIỆT PHA BÌNH DƯƠNG
Khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: (028) 38440106
Email: vanthu@vidipha.com.vn

Email: vanthu@vidipha.com.vn

VIDIPHA

THÀNH PHẦN: Mỗi gói 5g chứa:

Sorbitol

CHỈ ĐỊNH: Thuốc này được chỉ định ở người lớn để điều trị táo bón không thường xuyên và các trường hợp khó tiêu (chậm tiêu hóa, đầy bụng).

CÁCH DỪNG CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC

THÔNG TIN KHÁC: (Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo).

Sorbitol VIDIPHA®

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC: Mỗi gói 5g chứa:

Thành phần hoạt chất: Sorbitol5 g

Thành phần tá dược: (Không có)

NHÓM DƯỢC LÝ VÀ MÃ ATC: Thuốc nhuận tràng thẩm thấu, Mã ATC: A06AD18.

DẠNG BẢO CHẾ: Thuốc bột pha dung dịch uống.

CHỈ ĐỊNH: Thuốc này được chỉ định ở người lớn để điều trị táo bón không thường xuyên và các trường hợp khó tiêu (chậm tiêu hóa, đầy bụng).

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

Cách dùng:

- Dùng theo đường uống.
- Hòa tan lượng thuốc chứa trong gói vào nửa cốc nước.

Liều dùng:

- Đối với tình trạng táo bón không thường xuyên ở người lớn liều khuyến cáo là: 1 gói vào buổi sáng lúc bụng đói.
- Đối với tình trạng khó tiêu hóa ở người lớn, liều khuyến cáo là: 1 đến 3 gói mỗi ngày uống trước bữa ăn hoặc tại thời điểm bị rối loạn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Khi có bệnh về ruột và ruột kết (viêm loét đại tràng, bệnh Crohn, v.v..)
- Đau bụng không rõ nguyên nhân.

Trong trường hợp táo bón do uống một số loại thuốc.

Dị ứng với hoạt chất.

- Suy gan nặng.
- Tác nghiền ống mật hoặc sỏi mật.

- Đang sử dụng natri polystyrene sulfonate (sulfosodic cationesin như KAYEXALATE) hoặc canxin polystyrene sulfonate (sulfo-calcium cationesin như RESIKALI) kết hợp.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

- Tư vấn với Bác sỹ hoặc Dược sỹ trước khi dùng Sorbitol VIDIPHA. Không nên sử dụng kéo dài mà không có lời khuyên của chuyên gia y tế.
- Khuyến cáo không dùng cho những bệnh nhân không dung nạp fructose (bệnh di truyền hiếm gặp).

Táo bón không thường xuyên

- Nguyên nhân có thể liên quan đến việc thay đổi lối sống (du lịch) trong thời gian gần đây. Thuốc có thể giải quyết tình trạng này trong thời gian điều trị ngắn.
- Bệnh nhân nên tìm lời khuyên của chuyên gia y tế trước khi bắt đầu hoặc tiếp tục điều trị trong trường hợp:
 - Táo bón trong thời gian gần đây không rõ nguyên nhân do thay đổi lối sống.
 - Táo bón kèm theo nôn mửa và bí trung tiện, đau dạ dày, sốt, chướng bụng (do đau dạ dày), trong phân có máu, sụt cân.
- Những dấu hiệu này có thể là triệu chứng của một căn bệnh nghiêm trọng hơn.

Khó tiêu hóa

- Bệnh nhân nên tìm lời khuyên của chuyên gia y tế trước khi bắt đầu hoặc tiếp tục điều trị trong trường hợp:
 - Tiêu chảy
 - Đau bụng
 - Nôn mửa
- Cần kiểm tra y tế trước khi điều trị bằng thuốc này ở những bệnh nhân nằm liệt giường hoặc hoạt động thể chất ít

Đảm bảo bù đủ lượng nước hằng ngày ở người lớn tuổi



SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ:

- Nếu đang mang thai hoặc cho con bú, nghỉ ngơi mang thai hoặc đang có kế hoạch sinh con, hãy hỏi Bác sĩ hoặc Dược sĩ để được tư vấn trước khi dùng thuốc này.
- Thuốc này chỉ được sử dụng từ thời kỳ mang thai theo lời khuyên của Bác sĩ. Trong quá trình điều trị, nếu phát hiện có thai, hãy hỏi ý kiến Bác sĩ vì chỉ có Bác sĩ mới có thể đánh giá được sự cần thiết của việc tiếp tục điều trị.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc..

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỲ CỦA THUỐC:

Tương tác của thuốc:

- Thông báo cho Dược sĩ nếu đang dùng, đã dùng hoặc có thể dùng bất kỳ loại thuốc nào khác để tránh tương tác có khả năng xảy ra giữa các loại thuốc và cụ thể là Kayexalate hoặc Resikali (thuốc được sử dụng trong điều trị tăng kali huyết).
- Việc hấp thụ thuốc nhuận tràng có thể ảnh hưởng đến tác dụng của các loại thuốc khác được dùng cùng lúc.

Tương kỵ của thuốc: (Không áp dụng).

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

- Giống như tất cả các loại thuốc khác, thuốc này có thể gây ra tác dụng phụ, dù không phải ai cũng mắc phải.
- Nguy cơ tiêu chảy và đau bụng, đặc biệt là ở những đối tượng có bệnh lý cơ năng.
- Chướng bụng.
- Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

Hướng dẫn xử trí ADR: (Không áp dụng).

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Quá liều:

Quá liều xảy ra khi uống liều đơn nhiều hơn liều chỉ định.

Cách xử trí khi dùng thuốc quá liều:

- Tham khảo ngay ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ.
- Uống quá nhiều Sorbitol có thể làm tiêu chảy, chướng bụng và đầy hơi.
- Các triệu chứng này sẽ hết khi ngưng điều trị.
- Nếu bị tiêu chảy hoặc nôn mửa nghiêm trọng, nên liên hệ với Bác sĩ càng sớm càng tốt vì có thể cần điều trị để ngăn ngừa mất muối (chất điện giải) do mất nước.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 25 gói x 5g thuốc bột pha dung dịch uống.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA THUỐC:

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng:

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Uống ngay sau khi pha thành dung dịch.

Tiêu chuẩn: TCCS

TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

Địa chỉ: **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG BÌNH DƯƠNG**

VIDIPHA

Khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (028) 38440106

Email: vanthu@vidipha.com.vn

