

Thuốc súc miệng

Sumicare-T

GMP - WHO

Thuốc súc miệng

Sumicare-T

Chlorhexidine digluconate
0.2% kl/tt



Hộp 1 chai
250 ml

Thuốc súc miệng

Sumicare-T

DẠNG BẢO CHẾ:

Dung dịch súc miệng.

CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xem trong tờ Hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C

TIÊU CHUẨN: TCCS

SDK:

Để xa tầm tay trẻ em,
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Số lô SX:

Ngày SX:

HSD:



Cơ sở phân phối:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÂN PHONG
Địa chỉ: Lô B6.11/05, Khu đô thị Cầu Giấy,
Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam.

Thuốc súc miệng

Sumicare-T

GMP - WHO

Thuốc súc miệng

Sumicare-T

Chlorhexidine digluconate
0.2% kl/tt



Hộp 1 chai
250 ml

THÀNH PHẦN:

Mỗi chai 250 ml chứa:

Chlorhexidine digluconate 0.2% kl/tt

CHỈ ĐỊNH:

- Ngăn ngừa sự hình thành mảng bám trên răng.
- Hỗ trợ điều trị và dự phòng các trường hợp viêm lợi, duy trì vệ sinh răng miệng, đặc biệt trong trường hợp không thể sử dụng phương pháp đánh răng thông thường (sau phẫu thuật, can thiệp nha khoa, tổn thương cơ học ở vùng miệng...)

- Thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương sau phẫu thuật hoặc điều trị nha khoa.
- Kiểm soát nhiệt miệng và nhiễm nấm đường miệng, đặc biệt viêm miệng và tưa miệng do sử dụng răng giả.



Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM MERACINE
Địa chỉ: Đường YPC, Khu công nghiệp Yên Phong,
Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam



Thuốc súc miệng

Sumicare-T

Chlorhexidine digluconate
0,2% kl/tt



GMP - WHO

250 ml



THÀNH PHẦN: Mỗi chai 250 ml chứa:

Chlorhexidine digluconate 0,2% kl/tt

CHỈ ĐỊNH:

Ngăn ngừa sự hình thành mảng bám trên răng.

Hỗ trợ điều trị và dự phòng các trường hợp viêm lợi, duy trì vệ sinh răng miệng, đặc biệt trong trường hợp không thể sử dụng phương pháp đánh răng thông thường (sau phẫu thuật, can thiệp nha khoa, tổn thương cơ học ở vùng miệng...)

Thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương sau phẫu thuật hoặc điều trị nha khoa.

Kiểm soát nhiệt miệng và nhiễm nấm đường miệng, đặc biệt viêm miệng và tưa miệng do sử dụng răng giả.

TIÊU CHUẨN: TCCS

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C

SĐK:

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Số lô SX:

Ngày SX:

HSD:

--	--

Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM MERACINE

Địa chỉ: Đường YP6, Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Đông Phong,

Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Cơ sở phân phối:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÍN PHONG

Địa chỉ: Lô B8-B10/D6, Khu đô thị Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



