

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thidamagel

SDK: VD-34144-20

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ.

Thành phần được chất:

Mỗi gói 15 ml chứa: Almagat1,5g
(Tương đương với 240 mg Al₂O₃ và 570 mg MgO)

Thành phần tá dược:

Natri benzoat, kali sorbat, xanthan gum, glycerin, simethicon, sorbitol lỏng 70%, natri saccharin, hương bạc hà, nước RO.

Dạng bào chế: Hỗn dịch uống.

Mô tả: Hỗn dịch màu trắng sữa, vị ngọt, hương bạc hà.

Chỉ định: Thuốc có tác dụng kháng acid và cải thiện các chứng bệnh sau: loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày; các chứng bệnh do tăng tiết acid (ợ nóng, buồn nôn, nôn, đau dạ dày, chứng ợ); bệnh trào ngược thực quản.

Chống chỉ định:

Bệnh nhân quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Bệnh Alzheimer.

Bệnh xuất huyết tiêu hóa, bệnh trĩ, giữ nước (phù nề), biến chứng gan khi mang thai (nhiễm độc thai nghén) hoặc tiêu chảy.

Liều dùng và cách dùng:

Thuốc được dùng bằng đường uống, dùng nguyên chất hay pha với ít nước.

Thuốc được uống sau khi ăn 30 phút - 1 giờ và buổi tối trước khi đi ngủ.

Nên uống cách xa các thuốc khác khoảng 2-3 giờ.

- Người lớn: 15 ml (1 gói) x 3 lần/ngày.

- Trẻ em (6-12 tuổi): Dùng nửa liều dành cho người lớn.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc này:

1. Bệnh nhân đang dùng các thuốc khác:

2. Cần lưu ý:

- Giữ đúng liều lượng và cách dùng.

- Trẻ em khi sử dụng cần có sự giám sát của người lớn.

- Sau 2 tuần dùng thuốc, nếu các triệu chứng không được cải thiện nên hỏi ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ.

- Thuốc có chứa sorbitol nên báo cho Thầy thuốc biết nếu bạn bị tắc ống mật hoặc suy gan nặng. Bệnh di truyền hiếm gặp không dung nạp fructose, galactose, có thể nhận trạng nhẹ.

- Trong thành phần có chứa natri benzoat nếu dùng thời gian dài có thể dẫn đến tích lũy natri.

- Do thuốc có chứa glycerin, thận trọng với người bệnh ở tình trạng tinh thần lú lẫn, suy tim sung huyết, lão suy ở người cao tuổi, đái tháo đường và mất nước trầm trọng.

- Nếu bạn có bất kỳ bệnh thận nhẹ hoặc vừa phải như các ion nhôm và magiê có thể tích lũy trong thời gian dài cơ thể. Trong trường hợp này nó có thể khuyến khích liều thấp hơn. Almagat không được khuyến khích trong suy thận nặng.

- Nếu ăn kiêng phot pho thấp, tiêu chảy nặng, kém hấp thu hoặc là rất yếu, như muối nhôm làm giảm sự hấp thu phot pho, mà có thể gây ra, đặc biệt là với điều trị kéo dài, giảm hàm lượng phosphat máu (mất cảm giác ngon miệng, yếu cơ, mệt mỏi, vv) và không đủ khoáng xương (loãng xương).

- Nếu một bệnh nhân là người già và tiếp tục sử dụng nhôm - thuốc kháng acid có chứa thể làm nặng thêm bệnh xương hiện có (loãng xương) do việc giảm phot pho và canxi.

- Cho bác sĩ biết nếu bạn có bất kỳ triệu chứng cho thấy xuất huyết tiêu hóa, chẳng hạn như nôn ra máu hoặc sự đổi màu đen của phân.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

1/ Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai:

Độ an toàn cho phụ nữ mang thai và cho con bú chưa được thiết lập.

Nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, bạn nghĩ rằng bạn có thể có thai hoặc dự định có thai, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi sử dụng thuốc này.

2/ Phụ nữ cho con bú: Mặc dù một lượng nhỏ có thể qua sữa mẹ, nhôm magiê trong các bà mẹ được điều trị bằng Almagat, nồng độ của nó là không đủ cao để gây ảnh hưởng xấu đến trẻ sơ sinh.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác và tương kỵ của thuốc:

Bảo cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ của bạn các thuốc bạn đang dùng để tránh tương tác.

Không nên dùng đồng thời với kháng sinh tetracycline vì thuốc có thể làm giảm hấp thu tetracycline, uống cách xa 2-3 giờ.

Không dùng chung với nhóm quinolon do thuốc làm giảm độ hấp thu của nhóm này. Riêng dùng chung với norfloxacin hoặc ciprofloxacin bệnh nhân có dấu hiệu sỏi niệu và độc tính trên thận.

Dùng chung với ketoconazol phải cách xa 3 giờ.

Almagat có thể làm giảm sự hấp thu của một số thuốc bởi những thay đổi trong các điều kiện của dạ dày hoặc sự hình thành phức kém hòa tan:

- Thuốc kháng viêm không steroid (thuốc dùng để điều trị đau và viêm, ví dụ: Mefenamic acid hoặc flufenamic, indomethacin).

- Chống loét (thuốc để điều trị loét dạ dày tá tràng hoặc loét và ợ nóng số những người khác, ví dụ như: Cimetidin, famotidine, ranitidin).

- Digitalis (thuốc điều trị chức năng tim bất thường ví dụ: Digoxin, digitoxin).

- Thuốc chống loạn thần (thuốc để điều trị các rối loạn hành vi và triệu chứng tâm thần, ví dụ: Chlorpromazine).

- Lansoprazole (thuốc để điều trị viêm loét dạ dày).

- Corticoid (prednisone).

- Gabapentin (thuốc để điều trị động kinh).

- Ketoconazol (thuốc để điều trị nấm).

- Muối sắt (sắt sulfat).

- Quinidin (thuốc để điều trị rối loạn nhịp tim), do Almagat có thể làm tăng độc tính của thuốc này.

- Salicylat (thuốc để giảm đau, giảm sốt và viêm, ví dụ như Aspirin).

Almagat có thể làm giảm nồng độ giải phóng mật bằng lớn hơn do tăng pH nước tiêu, đặc biệt là với liều cao salicylat.

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

Tác dụng không mong muốn (ADR):

Trên bộ máy tiêu hóa: táo bón hoặc tiêu chảy có thể xảy ra trong khi dùng thuốc mặc dù rất hiếm. Tuy nhiên các triệu chứng này biến mất khi ngưng dùng thuốc.

Thông báo cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ các tác dụng phụ gặp phải khi dùng thuốc.

Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc:

Khi một lần quên dùng thuốc, nên dùng liều tiếp theo như bình thường.

Quá liều và cách xử trí:

Quá liều: Tại liều khuyến cáo là không mong đợi với ngộ độc thuốc này. Ở những bệnh nhân với một chế độ ăn ít phot pho và / hoặc điều trị kéo dài với liều cao có thể xảy ra giảm phosphat máu và thiếu khoáng hóa xương. Khi dùng thuốc quá liều đến ngay cơ sở y tế gần nhất, kể cả khi chưa có triệu chứng.

Triệu chứng thường gặp là tiêu chảy đối với người bình thường. Còn ở người suy thận biểu hiện triệu chứng của người ngộ độc magiê như: khô miệng, ngủ gà, chóng mặt, mệt mỏi...

Cách xử trí: Rửa dạ dày và dùng các loại thuốc tẩy xổ trừ thuốc xổ có chứa magiê.

Dược lực học:

Almagat có tác dụng trung hòa acid dạ dày nhanh chóng và kéo dài, duy trì pH dạ dày ở mức bình thường (pH=3-5) trong một giai đoạn dài do nó có cấu trúc mạng tinh thể vững chắc.

Almagat dạng hỗn dịch tạo ra một lớp màng nhầy tương tự lớp chất nhầy trên bề mặt niêm mạc dạ dày, bởi vậy nó có tác dụng bảo vệ tính toàn vẹn của lớp chất nhầy, giảm sự tổn thương trực tiếp vào các tế bào biểu mô.

Almagat hấp thu và làm mất hoạt tính của acid mật, khi chất này trào ngược vào dạ dày và có thể làm cho các rối loạn về dạ dày ruột trở nên trầm trọng hơn. Đồng thời nó cũng làm giảm hoạt động của pepsin. Almagat có tác dụng loại bỏ gốc tự do, yếu tố gây phá hủy lớp chất nhầy niêm mạc dạ dày.

Dược động học:

Do Almagat không hấp thu, vì vậy không đo được các thông số dược động học trong tuần hoàn. Almagat trung hòa acid có trong dạ dày, thì sẽ được thải trừ qua phân.

Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 15 ml.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Cần bảo quản thuốc này như thế nào:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS



Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Số 6A3 Quốc lộ 60, phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre