

MẪU HỘP GIẤY 20 GÓI 3 g





MẪU GÓI 3 g



* Ghi chú: Số lô SX và hạn dùng được in phun trên gói thuốc.



MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ACETYL CYSTEINE 200mg

Thuốc bột

CÔNG THỨC: Mỗi gói thuốc 3 gam có chứa

Acetylcystien :200 mg

Tá dược: (Đường trắng, Aspartam, Màu sunset yellow, Bột hương cam, Vanillin, Povidon) vừa đủ1 gói 3 gam.

CHỈ ĐỊNH:

Được dùng làm thuốc tiêu chất nhầy trong bệnh viêm mũi, bệnh lý hô hấp có đờm nhầy quánh như trong viêm phế quản cấp và mạn, và làm sạch đường quy trong mờ khí quản.

Được dùng làm thuốc giải độc trong quá liều paracetamol.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG: Hòa tan thuốc bột trong ½ ly nước

- Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: uống mỗi lần 1 gói, ngày 3 lần.

- Trẻ em 2- 6 tuổi: uống mỗi lần 1 gói, ngày 2 lần.

- Dùng làm thuốc giải độc trong quá liều Paracetamol, uống dung dịch acetylcystein 5%

Liều đầu tiên 140 mg/kg, dùng dung dịch 5%; tiếp theo cách 4 giờ uống 1 lần, liều 70 mg/kg thể trọng và uống tổng cộng thêm 17 lần

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

Tiền sử hen.

Phenylceton niệu.

Trẻ em dưới 2 tuổi

THẬN TRỌNG:

Phải giám sát chặt chẽ người bệnh có nguy cơ phát hen, nếu dùng acetylcystein cho người có tiền sử dị ứng; nếu có co thắt phế quản, phải dùng thuốc phun mù giãn phế quản như salbutamol hoặc ipratropium và phải ngừng acetylcystein ngay.

Khi điều trị với acetylcystein, có thể xuất hiện nhiều đờm loãng ở phế quản, cần phải hút để lấy ra nếu người bệnh giảm khả năng ho.

THỜI KỲ MANG THAI:

Điều trị quá liều paracetamol bằng acetylcystein ở người mang thai có hiệu quả và an toàn, và có khả năng ngăn chặn được độc tính cho gan ở thai nhi cũng như ở người mẹ.

THỜI KỲ CHO CON BÚ:

Thuốc dùng an toàn cho người cho con bú.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Acetylcystein là một chất khử nên không phù hợp với các chất oxy - hóa.

Không được dùng đồng thời các thuốc ho khác hoặc bất cứ thuốc nào làm giảm bài tiết phế quản trong thời gian điều trị bằng acetylcystein.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Có thể xảy ra: Buồn nôn, nôn, buồn ngủ, nhức đầu, ù tai, viêm miệng, chảy nước mũi nhiều, phát ban, mẩn ngứa, co thắt phế quản kèm phản ứng dạng phản vệ toàn thân. Sốt, rét run.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Quá liều acetylcystein có triệu chứng tương tự như triệu chứng của phản vệ, nhưng nặng hơn nhiều: Đặc biệt là giảm huyết áp. Các triệu chứng khác bao gồm suy hô hấp, tan máu, đông máu rải rác nội mạch và suy thận. Tử vong đã xảy ra ở người bệnh bị quá liều acetylcystein trong khi đang điều trị nhiễm độc paracetamol. Quá liều acetylcystein xảy ra khi tiêm truyền quá nhanh và với liều quá cao. Điều trị quá liều theo triệu chứng.

LỜI KHUYẾN CÁO:

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Gói 3 gam. Hộp 20 gói, Hộp 50 gói.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.



CTCP DƯỢC TW MEDIPHARCO-TENAMYD

8 Nguyễn Trường Tộ - TP. Huế - Việt Nam

ĐT: 054. 3823099 - 3827215 Fax: 054.3826077

Huế, ngày 22 tháng 12 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Phạm Thị Bình